



วารสาร

วิทยาศาสตร์มข.

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2533





วารสาร
วิทยาศาสตร์ปช.
THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ISSN 0125-2364

เจ้าของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน

ตึก 6 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

คำนำรัง ปีละ 40 บาท ข่ายปลีกเล่มละ 12 บาท

การบอกรับเป็นสมาชิก

แจ้งความจำนงค์เป็นจดหมาย หรือกรอกใบสมัครเป็นสมาชิก พร้อมส่งคำนำรังเป็นชนาณัติ หรือเช็คไปรษณีย์ในนามของนางบุญคุ้ม เหลือกลิ่น ฝ่ายจัดการ ส่งจ่ายป.ท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ
บรรณาธิการผู้ช่วย
กองบรรณาธิการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จารุมาลย์ จิตรังษี
สมพงษ์ ธรรมถาวร
ชุดิมา กุคู่สมุทร
ปณัญญา ชีระกุล
สยาม ชูถิ่น
เอกพรรณ สวัสดิ์ชิตัง
พรรณิ ฐิตาภิชิต
รชนี ฉวีราช
สุชัย ดนัยอัชฌาวุฒ
สมจิต ไซตชัยสถิตย์
วิชุดา ชุนหาติประเสริฐ
สุพรรณิ อร่ามวัฒนกุล

ฝ่ายศิลป์และภาพ

ฝ่ายเหรียญฉึก
ฝ่ายจัดการ

กิลเลน ตินนรเศรษฐ์
ทรงเวทย์ เบ้าชัย
ลักขณา สุขาบาง
สงวน พงศ์กิจวิฑูร
บุญคุ้ม เหลือกลิ่น
บุษราภรณ์ ดวงคำน้อย
อวน มหามูล
สมศักดิ์ อุ่นจันทิ
พยอม เดชพลมาตย์




บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารนี้เป็นของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับทัศนะของกองบรรณาธิการ

วิทยาศาสตร์ชุมชน

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1



คอลัมน์ประจำ

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการ 1

แฟ้มวิทยาศาสตร์

เอกภพ 4

สารคดี-วิชาการ

ว่าด้วยเรื่องรูปทรงของสารประกอบทองแดง

สุจิตรา อุดมเดชา 7

สารพิษอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง : สาเหตุและแนวทางแก้ไข

สนั่น จอกลอย 13

อภิปรายญาฬีสกีส-เอกภพทัศน์ใหม่

สุพล บริพันธ์ 16

การเปรียบเทียบ Orthogonal Contrasts ใน

Fixed Effects ONE-WAY ANOVA

เอนก พชรินทร์ศักดิ์ 20

อิทธิพลของความชื้นในเมล็ดต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

เตือนใจ ไก่สกุล 26

งานวิจัย

การศึกษาภาวะฮีโมโกลบิน อี ในประชากรเขตทุรกันดารของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ถาวร สุภาพรมและคณะ 31

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวิตามินซี

กับความเปรี้ยวของผลไม้และผักพื้นเมือง

ดาวัลย์ บุญยะรัตน์ 39

การเปรียบเทียบความสามารถในการทนต่อความเค็ม

ระหว่างออสซิลลาทอเรีย (Oscillatoria sp.) และสไปรูลีนา

(Spirulina sp.)

สุนนทพิช บุนนาค และคณะ 45

เบ็ดเตล็ด

เกร็ดความรู้

หญ้าปล้อง 56

คอลัมน์นี้มีรางวัล

ช็อกโกแลต 58



0251872
ISSN 0251-8724
วิทยาจารย์
THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

Publisher

Faculty of Science, Khon Kaen University,
Thailand.

Office

Faculty of Science Library, Building 6, Khon
Kaen University.

Objectives

1. To promote and propagate knowledge in all fields of science.
2. To publish results from research and studies by academic staff and students.
3. To be a medium for the exchange of knowledge and ideas among staff, students and those interested from both inside and outside the institute.

Publishing terms

four issues per annual volume
Issue no. 1 January - March
Issue no. 2 April - June
Issue no. 3 July - September
Issue no. 4 October - December

Subscription rate

40 baht per annum. Single issue price 12 baht.

Membership

Membership request can be made by letter or by completing the membership form, with the fee paid in the form of a postal order or postal cheque sent to Mrs. Boonkoom Lualon, Managing Committee, Khon Kaen University Post Office, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002.

Advisory Committee

Editor

Associate Editor

Editorial Board

Dean, Faculty of Science


Associate Dean for Academic Affairs

Charumal	Jitrangsri
Sompong	Thammathaworn
Chutima	Kukusamude
Panadda	Chirakul
Siam	Choothin
Ekapahan	Sawadcitang
Panee	Dhitaphichit
Rachanee	Chaveerach
Suchai	Tanaicdchawoot
Somchit	Chotchaisthit
Wichuda	Chunchatprasert
Supanee	Aramwattanakul
Kilen	Tinnoraset
Songwate	Bousechai
Luckana	Sukbang
Sanguan	Pongkitwitoon
Boonkoom	Lualon
Bussaraporn	Duangkomnoi
Oan	Mahamool
Somsak	Unjantee
Payom	Dejpolmataya

Artist

Treasurer

Managing Committee



The views and opinions expressed in this journal are those of the authors, and do not necessarily reflect the views and opinions of the editorial board.

บรรณาธิการ **แสง**




กาลเวลาผ่านไป ขณะที่กองล้อแห่งวิทยาการก็หมุนตามไปอย่างไม่ยอมหยุดนิ่ง วิทยาศาสตร์ พยายามที่จะนำเสนอบทความที่เป็นสาระประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านในหลายสาขา กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความสนใจและกำลังใจแก่ผู้จัดทำ พวกเรายินดีรับคำติชม และพร้อมที่จะปรับปรุงเสมอ โดยถือคติที่ว่า ผู้ที่ไม่ได้ทำผิด คือผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 18 นี้ ท่านผู้อ่านซึ่งคงจะรู้จักทองแดง โลหะสำคัญกันดีอยู่แล้ว จะได้รู้จักกับสารประกอบเชิงซ้อนต่าง ๆ ของทองแดงมากขึ้นใน **ว่าด้วยเรื่องรูปทรงของสารประกอบทองแดง** เช่นเดียวกับความเข้าใจที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุการเกิด**สารพิษอะพลาท็อกซินในถั่วลิสง** และการแก้ไข นักปรัชญาหลายท่านจะได้สัมผัสกับแนวคิดเกี่ยวกับ**อภิปรัชญาฟิสิกส์-เอกภพทัศน์ะใหม่** ซึ่งเผอิญ ๆ ก็อาจจะเป็นแนวคิดร่วมตรงกับของท่านอยู่แล้วก็ได้ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในฉบับ เป็นที่น่าเสียดายว่า น.ส.TINA ต้องอำลาพวกเราไปศึกษาต่อ แต่กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนมีฝีมือฉันใด วิทยาศาสตร์ของเราก็ได้คุณ “ซ็อกโกแลต” ผู้มีวิทยายุทธเข้ามารับผิชอบ **คอลัมน์นี้มีรางวัลแทน** และที่ขาดไม่ได้คือ **เพิ่มวิทยาศาสตร์กับ เกร็ดความรู้** ประจำฉบับของเรา อย่าลืมหันกลับไปเยี่ยมชมดูนะคะ

จารุมาลัย จิตรังษี

๑ กำบรรยายภาพปกหน้าและปกหลัง ๑

“ปกหน้า”



ทิวลิป (Tulip) เป็นไม้ล้มลุกเมืองหนาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Tulipa hybrida* จัดอยู่ในวงศ์ Liliaceae มีลำต้นใต้ดินเรียกว่า bulb ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวที่มีก้านดอกยาว มีหลายสี เช่น ขาว, ครีม, ชมพู, แดง, เหลือง, ม่วง-น้ำเงิน ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ (spring) ประเทศที่ปลูกเป็นสินค้าออกคือ ฮอลแลนด์

ภาพ : อ.ประนอม จันทรโณทัย

บรรยายภาพ : อ.รัชณี นวีราช

ด้กแตน เป็นชื่อเรียกแมลงหลายชนิดหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ พวกที่มีปีกจะมี 2 คู่ ปีกคู่แรกค่อนข้างหนา แฉกยาว และมีเส้นปีกชัดเจน ปีกหลังบางและกว้างใหญ่กว่า พับได้ แบบพัดเข้าไปอยู่ใต้ปีกคู่หน้าเมื่อเวลาเกาะนิ่งอยู่กับที่ ปากเป็นชนิดกัดกิน สันหลังออกอาจกว้างใหญ่หรือแคบยาว หรือสั้นก็ได้ ขาอาจจะเหมือนกันหมดหรือมีขาหน้าใหญ่หรือขาหลังใหญ่ได้ ส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหาร มีหลายชนิดเป็นศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจ เช่น ด้กแตนปาทังก้า ด้กแตนผีทำลายมะพร้าว กลัวยสน และพืชอื่นๆ บางชนิดเป็นศัตรูในบ้านเรือน แต่บางชนิดมีประโยชน์เช่น ด้กแตนตำข้าว ซึ่งช่วยในการทำลายแมลงอื่นๆ



ด้กแตนอยู่ในอันดับ ออร์โทบเทรา (Order Orthoptera) ชั้นเฮกซาโปดา (Class Hexapoda) และไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda)

ปกหลัง : ภาพ : อ.ประนอม จันทรโณทัย

บรรยาย : ดร.ณัฐวุฒิ ธานี



ญี่ปุ่นไปดวงจันทร์

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศ เพื่อปล่อยยานสำรวจ Muses-A เข้าสู่โคจรของดวงจันทร์ ในอดีตกาลที่ผ่านมา มีเพียงสองประเทศมหาอำนาจ คือ สหรัฐอเมริกาและรัสเซียเท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จในการส่งยานลงดวงจันทร์ หากญี่ปุ่นทำได้ตามแผนที่วางไว้ในครั้งนี้ ญี่ปุ่นก็จะเป็นประเทศที่สามในประวัติศาสตร์ ที่ไปถึงเพื่อนบ้านที่ไกลที่สุดของโลก

TIME, FEBRUARY 5, 1990


คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมการทำงานด้วยแสง (ความฝันอันเรืองรอง)

เราๆ ท่านๆ รู้กันดีอยู่แล้วว่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้ๆ กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ล้วนแล้วแต่ มีระบบควบคุมการทำงานที่มีอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวถ่ายทอดสัญญาณ นอกจากนี้เรายังอาจจะได้ยินคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ นั่นก็คือ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณรวดเร็วยิ่งขึ้น เหนือฟ้ายังมีฟ้า คำโบราณว่าทำอะไรจริง เพราะขณะนี้คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมการทำงานด้วยแสง ได้ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว

ลองจินตนาการที่เร็วกว่าอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิบเท่า และเคลื่อนได้ใน free space ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องเคลื่อนที่ในลวดตัวนำ ในขณะที่อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ก็จะมีการชนกับอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆ แต่สำหรับแสงไม่มีมวลไม่มีประจุ ลำของแสงจึงเคลื่อนที่ตัดผ่านกันได้ โดยไม่มีการแทรกสอดว่ากันไปแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบควบคุมการทำงานด้วยแสงได้เริ่มมาตั้งแต่ราวๆ พ.ศ.2503 ล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อย และมาประสบผลเบื้องต้น เมื่อปลายปี พ.ศ.2532 โดยรูปร่างหน้าตาดูไม่ได้ แต่มันยังทำงานได้แค่บนเลเซอร์ๆ แต่อย่าเพิ่งดูถูก เพราะผู้ประดิษฐ์คิดค้น คือ คุณ Alan Huang และพรรคพวก แห่ง AT & T Bell Laboratories ยืนยันว่า บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์จะหันมาใช้แสงวงจรควบคุมโดยแสงมากขึ้นแน่ๆ ส่วนการผลิตคอมพิวเตอร์ระบบควบคุมการทำงานด้วยแสง เพื่อออกสู่ท้องตลาด ในเชิงการค้ามันมีผู้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปได้ในปี พ.ศ.2543 ก็อีก 10 ปีข้างหน้า หรือไม่ก็ในปี พ.ศ.อนันต์ คือ ชั่วกับชั่วกลับ ก็ทำไม่ได้ แต่อย่าเพิ่งตกใจว่าจะไม่ได้ใช้ เพราะขณะนี้ 13 บริษัทยักษ์ใหญ่ ของญี่ปุ่น (เจ้าเก่า) เช่น Mitsubishi, Nippon Electric เป็นต้น ได้ตั้งโครงการระยะยาว 10 ปี สำหรับงานวิจัยขึ้นนี้ ลองญี่ปุ่นได้ทุ่มเทเช่นนั้นแล้ว คุณ

Huang และพวกมันใจได้เลยว่างานที่คุณทำอยู่นี้ ไม่ได้เป็นเรื่องล้อชาวบ้านเล่นแน่ ๆ

TIME, FEBRUARY 12, 1990



Huang กับงานประดิษฐ์ที่ทำของเขา

รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 1989

ช่วงเวลาที่ผ่านมา นักชีววิทยาทราบกันว่า ภายในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน นั่นคือ กรดนิวคลีอิก DNA และ RNA จะเป็นแหล่งสะสมข้อมูลทางพันธุกรรม ส่วน เอ็นไซม์ซึ่งเป็นโปรตีนอย่างหนึ่งจะเป็นผู้ทำงานทั้งหมด

แต่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา Sidney Altman แห่งมหาวิทยาลัยเยล และ Thomas Cech แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด ได้เปลี่ยนความคิดของนักวิทยาศาสตร์เก่า ๆ โดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่ความคิดที่ว่าเซลล์ทำหน้าที่อย่างไร แต่รวมทั้งชีวิตในโลกนี้เริ่มต้นอย่างไรด้วย

เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านต่างทำงานของตนแต่ได้ผลมาพ้องกัน ทั้ง Altman และ Cech พบว่า RNA สามารถทำหน้าที่เป็นเอ็นไซม์ชนิดหนึ่งด้วย ซึ่งสามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีเป็นล้าน ๆ เท่า และทำให้ชีวิต

สามารถดำรงอยู่ได้ ซึ่งก่อนจะพบเอ็นไซม์นี้ เชื่อกันว่าเอ็นไซม์ทั้งหมดต้องเป็นโปรตีน นอกจากนี้ Cech ยังค้นพบว่า RNA สามารถสร้างแบบตัวเองได้ แสดงว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับ DNA ทั้งหมดซึ่งเดิมถือกันว่า DNA เป็นแม่แบบหลักของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในพืชสัตว์และแบคทีเรีย

“ปัจจุบันเราทราบว่า RNA สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นตัวถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และดูเหมือนว่าเป็นไปได้ที่มันจะเป็นโมเลกุลที่เป็นกุญแจไขไปสู่กำเนิดของชีวิต”

ทั้ง Altman และ Cech ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 1989



1 ใน 100 ประดิษฐกรรมยอดเยี่ยม แห่งปี 1989

ภาพที่เห็นทางด้านซ้ายมือของผู้อ่าน เป็นภาพแสดงลักษณะโครงสร้างอะตอมของผิวกราฟไฟท์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใหม่ที่เรียกว่า "Atomic Force Microscope (AFM)" สร้างโดย กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย เมืองซานตา บาร์บารา นำทีมโดย Paul Hansma



AFM เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีหลักการคล้ายกับ "Scanning Tunneling Microscope (STM)" ต่างกันเพียงว่า AFM ใช้ผลของแรงระหว่างอะตอม (interatomic force) ระหว่างหัวบันทึกกับผิวของสารที่จะตรวจสอบ แทนที่จะเป็นการใช้ผลของ tunneling Current อย่างเช่นกรณีของ STM

จุดเด่นของ AFM ก็คือ ผิวที่ตรวจสอบไม่จำเป็นต้องเป็นผิวของสารตัวนำไฟฟ้า ทำให้ขยายขอบเขตการใช้งานไปได้กว้างขวางมาก ทั้งในด้านการผลิตชิ้นส่วนไมโครคอมพิวเตอร์งานทางด้าน Molecular Biology และการผลิตยาฆ่าเชื้อโรค อาจเป็นเพราะเหตุนี้ ทำให้วารสาร Popular Science ฉบับเดือนธันวาคม 1989 จึงจัดให้ AFM เป็น 1 ใน 100 ประดิษฐกรรมยอดเยี่ยม แห่งปี 1989

ครับจะมีบ้างไหมสักปี ใน 50 ปีข้างหน้า ที่หนึ่งในประดิษฐกรรมยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นฝีมือของคนไทย.....?

[จาก Popular Science, December 1989 P. 69.]

In this world there is nothing great but man;

In man there is nothing great but mind.....



แพ้นวิทยาศาสตร์ เป็นคอลัมน์ที่เปิดกว้างในการนำเสนอสาระทางวิชาการ ในแนววิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์, ความเข้าใจ หรือแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สนใจวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป

คุณเคยนึกถึงฉันท้างไหม ?*

ไม่ ผมไม่เคยนึกถึงคุณเลย ผมใช้เวลาเรียน เรียน เรียนและก็เรียนเท่านั้น ผมรู้จักคุณอย่างผิวเผินและไม่พยายามจะเข้าใจคุณด้วย ไม่ต้องมาถามผมอีกนะ ผมเบื่อคำถามน้ำเน่าแบบนี้

แหม! ถ้าเป็นละครก็คงจะมันส์น่าดูสำหรับบทพูดเช่นนี้ เขียนต่อก็คงจะถึงขั้นแยกทางกันเดินหรือไม่ก็คงจะต้องมีงานเลี้ยงข้าวต้มของใครคนใดคนหนึ่งเป็นแน่ แต่สำหรับแพ้นวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ จากประโยคคำถามที่เป็นหัวเรื่อง “ฉัน” ในที่นี้ หมายถึง ปริมาณต่างๆ ในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือหรือตำราเรียน เช่น ค่าคงที่ต่างๆ และปริมาณที่อยู่ในสูตร สมการทุกชนิด ส่วน “ผม” ก็หมายถึง นักเรียน นักศึกษานั้นแหละ เพราะเวลาเรียนหนังสือมักจะเรียนแบบท่องจำ ขอเพียงเพื่อสอบให้ผ่าน ให้ได้คะแนนดี ๆ แต่ทำไมไม่เคยคิดหรือมองภาพของสิ่งที่เราเรียนให้ลึกลงไป ก็เลยทำให้ขาดความเข้าใจและความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาที่เรียน เมื่อไม่เข้าใจก็พาลเกร่ เกลียด แล้วก็ไม่ชอบ ไม่อยากเรียน ไม่อยากติดตามวิชานั้น ๆ ผลเสียทั้งนั้นที่ตามมา

เราลองมาฝึกมองภาพของปริมาณต่างๆ ดูบ้างเป็นไร มันจะได้ไม่น้อยใจ ที่คุณยังเข้าใจมันบ้างสำหรับปริมาณที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ลองนึกภาพหรือมองมันให้ลึกซึ้งขึ้นนั้น ได้แก่ ตัวเลขอวกาโดร (Avogadro's number) และขนาดของนิวเคลียสกับอะตอม

1. ขนาดของตัวเลขอวกาโดร (Avogadro's number)

ในวิชาเคมี มีตัวเลขแสดงปริมาณอยู่จำนวนหนึ่งที่คุ้นเคยและรู้จักเป็นอันดี คือ ตัวเลขอวกาโดร ซึ่งบอกจำนวนอนุภาคในหนึ่งโมล และมีขนาดเท่ากับ 6×10^{23} เรารู้ว่าตัวเลขนี้ ถ้าคิดเป็นเงินละก็มากมายมหาศาลแน่ เศรษฐีน้ำมันซาอุด์อันดับหนึ่งของโลกก็เถอะ ชิดซ้ายไปเลย เราลองมาพิจารณาค่าตัวเลขนี้ด้วยแบบจำลองต่อไปนี้ ที่อาจจะทำให้เรานึกภาพขนาดของมันได้ดีขึ้น

แบบจำลองเงินบาท 1 โมล

สมมติว่าสมปอง (น้องของสมชาย) มีเงินบาทจำนวน 1 โมลในธนาคาร นั่นก็หมายความว่า

เขามีเงินอยู่เป็นจำนวน 6×10^{23} บาท คิดเป็นกี่ ล้านเอ๋ย

คำตอบ 600,000,000,000,000,000,000,000.- บาท (อ่านว่า หกแสนล้านล้านล้านบาท)

ว้าว! ถ้าคุณมีเงินขนาดนี้คุณคิดอยากจะทำอะไรบ้าง แต่อย่าลืมนึกถึงผมนะ

ถ้าเขาได้รับดอกเบี้ย 5% จากธนาคาร

ดังนั้น เมื่อครบปีเขาจะได้ดอกเบี้ยคิดเป็นเงิน

$$= (5/100) (6 \times 10^{23} \text{ บาท})$$

$$= 3 \times 10^{22} \text{ บาท}$$

ลองคิดอีกนิดว่า ในแต่ละวันที่เขาจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

ระยะเวลา 1 ปี มีจำนวนวินาที = (365 วัน/ปี) (24 ชั่วโมง/วัน) (60 นาที/ชั่วโมง) (60 วินาที/นาที)

$$= 3 \times 10^7 \text{ วินาที}$$

∴ ใน 1 วินาทีเขาได้รับดอกเบี้ย

$$= (3 \times 10^{22} \text{ บาท}) / (3 \times 10^7)$$

$$= 1 \times 10^{15} \text{ บาท}$$

ถ้าเขาเอาดอกเบี้ย แบ่งให้คนแต่ละคนบนโลก (แะ ใจดีอีก) ประมาณ 5 พันล้านคน

... ใน 1 วินาที แต่ละคนบนโลกจะได้เงิน = $(1 \times 10^{15} \text{ บาท}) / (5 \times 10^9)$ เท่ากับ 2×10^5 บาท

ก็จะได้คนละ 200,000.- บาท (สองแสนบาท)

ร่ายกันเละเลย วันๆ คงไม่ทำมาหากิน ยิ่งถ้าหากเปลี่ยนสกุลของเงินเป็นดอลลาร์ อเมริกัน หรือปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ ยิ่งจะร่ายแบบอภิมหารวย

2. ขนาดของนิวเคลียส (Nucleus) และ อะตอม (Atom)

ข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันสำหรับนิวเคลียส และอะตอม คือ เป็นทรงกลมมีขนาดรัศมีเท่ากับ

10^{-15} m. และ 10^{-10} m. ตามลำดับ อะตอมนั้นมี นิวเคลียสเป็นแกนกลางประกอบด้วยนิวตรอน (Neutron) กับโปรตอน (Proton) ส่วนอิเล็กตรอน เคลื่อนที่อยู่รอบๆ นิวเคลียส ถ้าเราพิจารณา จากตัวเลขขนาดของนิวเคลียสและอะตอมดัง ที่กล่าวมา จะเห็นว่าอะตอมมันช่างกลวงเสียเหลือเกิน คือมีที่ว่างมากๆ ไม่เชื่อลองพิจารณา ดู

ถ้าให้รัศมีของอะตอม 10^{-10} m. แทนด้วย ระยะ 1000 km.

รัศมีของนิวเคลียส 10^{-15} m. จะแทนได้ด้วยระยะ 0.01 km. หรือ 10 m. ถ้าเราเลือกเอา เส้นตรงหน้าตึกอธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น จุดศูนย์กลาง รัศมี 10 m. รอบเส้นตรงเป็นขนาด ของนิวเคลียสระยะที่ไกลออกไปจากเส้นตรงอีก 1000 km. คือขนาดของอะตอมที่เป็นไปได้ หรือ ถ้านึกภาพไม่ออกก็ขอให้หลับตานึกถึงพื้นที่ทรงกลม ที่มีรัศมีเป็นระยะทางจากขอนแก่นถึงแม่ฮ่องสอนก็แล้วกัน

ดังนั้น จะเห็นว่านิวตรอนกับโปรตอนอยู่ กันแบบที่เรียกว่า ชุมชนแออัดหรือประชาชนชาว แฟลตในนิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนอยู่แบบสบายๆ อย่างเบิรด์ รอบนิวเคลียส มีอาณาบริเวณให้ เคลื่อนที่มากมาย จากแนวความคิดที่ว่าสารทุก อย่างประกอบขึ้นด้วยอะตอมของธาตุต่างๆ อยู่ในสภาวะของแข็ง, ของเหลว และแก๊ส บางคน คงอยากจะแย้งว่า ในของแข็งมันจะมีที่ว่างได้ อย่างไร ลองคิดดูสิ ถ้าเราเป็นอิเล็กตรอนที่กำลัง เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสขนาดรัศมี 10 m. เรามีที่ว่างอีกตั้งเยอะแยะ (เนื้อที่ทรงกลมขนาดรัศมี 1000 km.) ที่จะเคลื่อนที่ไปมารอบนิวเคลียส บางคนก็ชอบอยู่เป็นหลักแหล่ง บางคนก็ชอบอพยพไปเรื่อย ที่กล่าวมานี้ก็เพียงแค่อุปมาอุปไมย เปรียบเทียบเท่านั้นนะ เพราะจริงๆ แล้วในระบบ

ของอะตอมและโมเลกุลอนุภาคต่างๆ จะอยู่กันอย่างมีกฎเกณฑ์แน่นอน (ก็อย่างที่เรียนๆ มานั่นแหละ) นอกจากนี้การมองภาพอย่างทีกล่าวนี้อาจจะช่วยให้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้น เวลาศึกษาการเกิดปฏิกิริยาหรือมีอันตรกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอะตอมและโมเลกุล

จากปริมาณทั้งสองอย่างที่กล่าวมาคือตัวเลขอวกาศและขนาดของนิวเคลียสกับอะตอมคงทำให้เราพอที่จะนึกภาพขนาดของปริมาณอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับปริมาณเหล่านี้ เมื่อศึกษาค้นคว้าในวิชาการแขนงต่างๆ พร้อมทั้งความสมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกันของที่มาแห่ง

สูตร สมการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างงดงามน่าประทับใจ โดยนักวิทยาศาสตร์, ถ้าหากคุณผู้อ่านมีเวลาเหลือเพื่อขอให้ลองนั่งนึกจินตนาการถึงขนาดของปริมาณอื่นๆ ที่มีอยู่มากมายกับความสัมพันธ์ของมันที่มีต่อกันและกัน แล้วคุณจะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าใจวิทยาศาสตร์, เห็นความสวยงามของวิทยาศาสตร์, รักวิทยาศาสตร์ และในที่สุดก็จะมีวิทยาศาสตร์ เป็นเพื่อนที่แสนดี และเข้าใจคุณด้วย

เอกสารประกอบ

1. Henk van Lubeck, J. Chem. Educ. 1989, 66, 762.

The real is imagined in unreality,

While seeing unreal the truly real;

Roaming fields of ill directed thought

Never do they to the real arrive.....

That which is real they see as real,

Knowing unreal to be unreal;

Roaming feilds of well directed thought

They do indeed to the real arrive.....

ว่าด้วยเรื่องรูปทรงของสารประกอบทองแดง

สุจิตรา อุดมเดชา*

เราทราบกันดีว่าทองแดงหรือคอปเปอร์ (Cu) เป็นธาตุแทรนซิชัน หรือโลหะแทรนซิชันที่นำมาใช้ประโยชน์กันมาก ทองแดงจัดว่านำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีที่สุดในอนุกรมแรกของธาตุแทรนซิชัน และเป็นที่สองรองจากเงิน และเนื่องจากเราสามารถดึงทองแดงนี้ให้เป็นเส้นได้ดีมาก จึงใช้ประโยชน์ในการทำลวดนำไฟฟ้า นอกจากนี้โลหะผสมของทองแดงยังมีความสำคัญต่องานประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่น ทองเหลือง (ทองแดง + สังกะสี) ทองสัมฤทธิ์ หรือบรอนซ์ (ทองแดง+ดีบุก) และทองสัมฤทธิ์อีกชนิดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับอะลูมิเนียมใช้ทำทองเทียม และถ้าผสมกับนิกเกิลได้ "nickel silver" (ทองแดง+นิกเกิล+สังกะสี) ใช้ทำเหรียญกษาปณ์ ทองแดงในธรรมชาติมีทั้งที่เป็นโลหะอิสระ และเป็นสารประกอบในรูปของแร่ เช่น ชาลโคไพไรต์ (คอปเปอร์ไฟไรต์), CuFeS_2 คิวไพรต์, Cu_2O มาลาไคต์, $\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$ เป็นต้น

ทองแดงเป็นธาตุแทรนซิชันอนุกรมที่ 1 หมู่ IB มีการจัดอิเล็กตรอนในอะตอมเป็นแบบ $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$ ในสารประกอบ ทองแดงจะมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า ตั้งแต่ 0 +1 +2 +3 และ +4 เลข

ออกซิเดชัน 0 และ +4 เกิดขึ้นน้อยมาก เลขออกซิเดชัน +3 จะพบมากกว่าเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในสารประกอบของทองแดง จะมีเลขออกซิเดชัน +1 และ +2 โดยที่ +2 เป็นเลขออกซิเดชันที่เสถียรและพบมากที่สุด สารประกอบ Cu(I) ไม่ค่อยเสถียรในสารละลาย มักเกิด disproportionation** เป็นโลหะ Cu และ Cu(II) ดังสมการ




สารประกอบ Cu(II) จะเสถียรมากขึ้นถ้าอยู่ในสถานะของแข็งหรือเป็นสารประกอบ ซึ่งส่วนมากมีสีเหลืองหรือสีส้ม ส่วนสารประกอบ Cu(II) ที่พบกันมากมักมีสีน้ำเงิน สีเขียวหรือสีน้ำเงินแกมเขียว ในที่นี้จะกล่าวถึงสเตอริโอเคมี*** (stereochemistry) เฉพาะของสารประกอบ Cu(II) เท่านั้น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในสารประกอบของ Cu(II) นั้น ไอออนของทองแดงจะมีการจัดอิเล็กตรอนเป็นแบบ $[\text{Ar}] 3d^9$ รูปร่างของโมเลกุลส่วนใหญ่จะบิดเบี้ยวไปจากสมมาตรเดิมเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Jahn Teller⁽¹⁾ ทำให้มีสเตอริโอเคมีได้หลายแบบ และมีสารประกอบเชิงซ้อน Cu(II) เพียงไม่กี่ตัวที่มีรูปทรงปกติ (regular geometry) จากเหตุผลนี้ทำให้สเตอริโอเคมีของ

* อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



** การที่อะตอมหรือไอออนของธาตุหนึ่งสลายตัวเป็นธาตุที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นและลดลงในขณะเดียวกัน

*** การศึกษาการจัดเรียงของอะตอมในโมเลกุลและผลของการจัดเรียงนี้ต่อสมบัติของโมเลกุล


สารประกอบเชิงซ้อน Cu(II) แตกต่างจากสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชันตัวอื่นๆ Cu(II) นอกจากจะเกิดเป็นสารประกอบธรรมดา เช่น CuO Cu(OH)₂ และ CuCl₂ แล้ว ยังเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งมีรูปทรงและสเทอริโอเคมีแบบต่างๆ ได้มากมาย ที่พบบ่อยๆ ได้แก่




1. เส้นตรง (linear) ตัวอย่างเช่น CuCl₂ (สถานะแก๊ส) [1]







2. พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม (trigonal bipyramidal) ดังตัวอย่าง [2]



$$\rho = 0.27$$




3. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (square pyramidal) ดังตัวอย่าง [3]




4. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยวแบบทริโกนัล และเตตระฮีดรัล (trigonal distorted square pyramidal and tetrahedral distorted square pyramidal) ดังตัวอย่าง [4] และ [5] ตามลำดับ






[6] $K_2Pb[Cu(NO_2)_6]$




[9] $[Cu(NH_3)_4(NO_2)_2]$

5. ทรงแปดหน้า (octahedral) : พบว่ามีสารประกอบ

[6] ตัวเดียวเท่านั้นที่มีรูปทรงแปดหน้าปกติ (regular octahedral)




[7] Ba_3CuF_6



[8] $[Cu(dien)_2][NO_3]_2$



6. ทรงแปดหน้า ชนิดเทตระโกนัลที่พันธะหดสั้นแนวแกน Z และทรงแปดหน้าชนิดรอมบิกที่มีพันธะหดสั้นแนวแกน Z (Compressed tetragonal octahedral and compressed rhombic octahedral) ดังตัวอย่าง [7] และ [8] ตามลำดับ




[10]

$Ba_2[Cu(OH_2)_2(O_2CH)_4][HCO_2]_2 \cdot 2H_2O$


7. ทรงแปดหน้าชนิดเทตระโกนัล ที่มีพันธะยาวออกแนวแกน Z และทรงแปดหน้าชนิดรอมบิกที่มีพันธะยาวออกแนวแกน Z (elongated tetragonal octahedral and elongated rhombic octahedral) เช่นตัวอย่าง [9] และ [10] ตามลำดับ

[11] $[\text{Cu}(\text{phen})_2(\text{O}_2\text{CCH}_3)] [\text{ClO}_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [13] $[\text{Cu}(\text{en})_3] [\text{SO}_4]$


9. ทรงแปดหน้าชนิดทริโกนัล (trigonal octahedral) ดังตัวอย่าง [13]





[12]




8. ทรงแปดหน้าบิดเบี้ยวแบบซีสที่สมมาตร (4+2) และอสมมาตร (4+1+1*) (symmetric cis-distorted octahedral and asymmetric cis-distorted octahedral) เช่นตัวอย่าง [11] และ [2] ตามลำดับ

[14] $\text{Cs}_2[\text{CuCl}_4]$

10. ทรงสี่หน้าชนิดก้ำกึ่งระหว่างสี่เหลี่ยมระนาบและทรงสี่หน้าปกติ (compressed tetrahedral) เป็นชนิดเดียวที่พบสำหรับรูปทรงสี่หน้า ดังตัวอย่าง [14]



11. จตุรัสระนาบและสี่เหลี่ยมระนาบชนิตรอมบิก (square coplanar and rhombic coplanar) เช่นตัวอย่าง [15] และ [16] ตามลำดับ



13. เจ็ด-โอออร์ติเนตและแปด-โอออร์ติเนต (seven-coordinate and eight-coordinate) ตัวอย่างเช่น $[\text{Cu}(\text{py})_3(\text{O}_2\text{NO})_2]$ และ $\text{Ca}[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_4] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [17] ตามลำดับ

เท่าที่ยกตัวอย่างมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสารประกอบ $\text{Cu}(\text{II})$ ที่พบกันบ่อยๆ เท่านั้น การที่มศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบของทองแดงกันมาก ก็เพราะว่าทองแดงเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อชีวิต เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่าง แต่ทองแดงจะไม่อยู่ในสภาพเป็นอิสระในร่างกายของคนเรา เพราะจะก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ ทองแดงในร่างกายของเราจึงอยู่ในสภาพเป็นสารประกอบทั้งสิ้น ตามปกติทองแดงจะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับโปรตีน (คอปเปอร์โปรตีน) หรือเอนไซม์ (คอปเปอร์เอนไซม์) และปฏิกิริยารีดอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้เป็นตัวที่มีบทบาทมากตัวหนึ่งในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในกระบวนการชีวภาพ พลาสโตไซยานินเป็นคอปเปอร์โปรตีนตัวหนึ่งที่มีสเตอริโอเคมีเป็นทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวแบบโครงสร้างก้ำกึ่งระหว่างสี่เหลี่ยมระนาบและทรงสี่หน้าปกติ ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส ก็เป็นคอปเปอร์เอนไซม์ตัวหนึ่งที่มี Cu และ Zn เป็นองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมของ Cu เป็นแบบพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยว นอกจากนี้สารประกอบเชิงซ้อนของ $\text{Cu}(\text{II})$ กับเพปไทด์สั้นๆ ก็ให้โครงสร้างแบบต่างๆ เช่น คอปเปอร์กลัยซิลกลัยซีน (Cu -glycylglycine) และ คอปเปอร์-กลัยซิลกลัยซิลกลัยซีน มีโครงสร้างแบบพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม คอปเปอร์-กลัยซิล ฮิสทีดิน และคอปเปอร์-กลัยซิลฮิสทีดิลกลัยซีน มีโครงสร้างแบบทรงแปดหน้าบิดเบี้ยว ส่วนคอปเปอร์-กลัยซิลกลัยซิลกลัยซิลกลัยซีน (Cu -GlyGlyGlyGly) และ Cu -6-aminohexanoic acid มีโครงสร้างแบบจตุรัสระนาบ และแปด-โอออร์ติเนตชนิดรูปสิบสองเหลี่ยมบิดเบี้ยว (distorted dodecahedron)

bipy = 2,2'-bipyridyl dien = diethylenetriamine

en = ethylenediamine phen = 1, 10-phenantroline py = pyridine

ตามลำดับ สเทอริโอเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์โปรตีนเหล่านี้เป็นสเทอริโอเคมีที่เหมาะสมของ Cu ที่เลขออกซิเดชันหนึ่งๆ จึงทำให้การถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้รวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าสเทอริโอเคมีมีบทบาทมากในกระบวนการชีวภาพ

ปริมาณทองแดงในระบบต่างๆ ของคนเราจะมีปริมาณไม่เท่ากันเนื่องจากบทบาททางชีวเคมีของทองแดงในอวัยวะต่างๆ แตกต่างกัน ในตับสมอง และหัวใจ จะมีปริมาณทองแดงสูงสุด เมื่อคิดต่อหน่วยน้ำหนัก แต่ถ้าดูปริมาณรวมทั้งหมดกระดูกและกล้ามเนื้อจะมีปริมาณทองแดงสูงที่สุด นอกจากนี้ของเหลวในร่างกายทุกชนิด เช่น เลือด น้ำดี ไซสัณหลัง เหงื่อ จะมีสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงอยู่ด้วย โดยเฉพาะเลือดซึ่งเป็นของเหลวที่สำคัญที่สุดในร่างกาย ทองแดงจะอยู่เป็นสารประกอบเชิงซ้อน คอปเปอร์-เฮโมโกลบิน คอปเปอร์-อัลบูมิน หรือคอปเปอร์-กรดอะมิโน

ดังนั้นจะเห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับสเทอริโอเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดง อาจให้ข้อมูลหลายๆ อย่างที่ทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทและการทำหน้าที่ของทองแดงในระบบชีวภาพได้

บรรณานุกรม

1. F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry", Wiley Interscience, New York, 5th edn., 1988.
2. B.J. Hathaway and D.E. Billing, Coord. Chem. Rev., 1970, 5, 143.
3. B.J. Hathaway, Essays in Chemistry, 1972, 3, 61.
4. B.J. Hathaway in "Comprehensive Coordination Chemistry", Ed. G. Wilkinson, R.D. Gillard and J.A. McCleverty, Pergamon Press, Oxford, 1988, (a) Vol. 5, Sec. 53 (b) Vol. 2, Sec. 15.5.
5. B.J. Hathaway, Struct. Bonding (Berlin), 1984, 57, 55.
6. ดริตาภรณ์ ชูศรี "เคมีอินทรีย์เชิงชีวภาพ" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น. 2532.
7. บุญพฤกษ์ จาญมาะ (บรรณาธิการ), "เคมีเล่ม 2" ทบวงมหาวิทยาลัย, อักษรเจริญทัศน์ กรุงเทพฯ, 2524, บทที่ 15.

Better late than never.....

สารพิษอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข

สนั่น จกกลอย*

อะฟลาท็อกซิน (aflatoxin) เป็นสารอินทรีย์พวก secondary metabolite ประเภท heterocyclic compound ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเชื้อราบางชนิดใน genus *Aspergillus* บนอาหารแห้งหรือเมล็ดพืชบางชนิด เช่น ถั่วลิสง หากมนุษย์บริโภคถั่วลิสงที่มีสารอะฟลาท็อกซินชนิดนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดอันตรายหลายอย่าง เช่น ทำให้เกิดมะเร็ง ในตับไต และ ระบบทางเดินอาหาร เป็นอันตรายต่อหัวใจ และสมอง นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กที่เป็นโรคขาดธาตุอาหาร หากได้รับสารชนิดนี้เข้าไปในปริมาณมาก จะเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง (ธวัชชัย, 2523) จึงจัดได้ว่าอะฟลาท็อกซินเป็นสารพิษที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง มนุษย์ได้ตระหนักถึงภัยอันร้ายแรงนี้ จึงลดปริมาณการบริโภคถั่วลิสงลงเป็นผลให้ความต้องการของตลาดถั่วลิสงทั้งภายในและภายนอกประเทศลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง จึงนับว่าอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคถั่วลิสงโดยตรง

เชื้อสาเหตุและการสร้างสารอะฟลาท็อกซิน

สารพิษชนิดนี้ถูกสร้างโดยเชื้อราบางชนิด เช่น *Aspergillus parasiticus* Speare หรือ *A. flavus* Link. ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาวและมีสปอร์สีเขียวก้ำมะกอกพบขึ้นเจริญทั่วไปในเขตร้อนขึ้นตามโรงเรือนที่อับชื้น ตามไม้ผุ ในดิน และโดยเฉพาะตามเมล็ดพืชที่ตากไม่แห้งสนิท หรือเมล็ดพืชที่เก็บไว้ในที่อับชื้น จะพบราชนิดนี้เจริญอยู่และสร้างสารพิษขึ้น 4 ชนิด เรียกว่า B1, B2, G1 และ G2 ชนิด B1 นับว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดเชื้อราทั้ง 2 ชนิด จะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 10-45°C และมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 75% (Feakin, 1973) แต่พบว่าการสร้างสารอะฟลาท็อกซินของเชื้อราชนิดนี้ได้ดีเมื่อมีอุณหภูมิประมาณ 25-30°C และมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 85% หรือเมล็ดมีความชื้นสูงกว่า 9% (Kolte, 1984 และ Feakin, 1973)

สารอะฟลาท็อกซินปะปนในถั่วลิสงได้อย่างไร?

ถั่วลิสงเมื่อสร้างฝักจะส่งส่วนของฝักเจริญ

* อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

เติบโตลงไปในดิน ซึ่งในระยะนี้อาจจะมีเชื้อรา *A. flavus* หรือ *A. parasiticus* เจริญอยู่ ฉะนั้น โอกาสที่เชื้อราชนิดนี้จะเจริญบนฝักถั่วลิสงจึงมีมาก อย่างไรก็ตามจากการสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วลิสงจากไร่ ในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวจะพบเชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตในเมล็ดน้อยกว่า 1% (Diener และ คณะ, 1982) และเมื่อถั่วลิสงแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้จะพบปริมาณของเชื้อราชนิดนี้สูงขึ้น แต่ยังมี การสร้างอะฟลาท็อกซินในปริมาณต่ำ (อรุณศรี และคณะ, 2526) แต่เชื้อราจะสร้างสารอะฟลาท็อกซินสูงขึ้นตามฝัก และเมล็ดหลังจากการเก็บเกี่ยว ถ้าหากเกษตรกรไม่สามารถลดความชื้นของฝัก และเมล็ดให้ต่ำลง พวงทอง (2527) และ พวงทอง และสนั่น (2526) ได้สุ่มตัวอย่างฝักถั่วลิสงของ เกษตรกรมากกว่า 15 ตัวอย่าง พบว่าถ้าเกษตรกร ตากฝักถั่วลิสงเพียง 2-3 แดดแล้วส่งขายให้กับ พ่อค้าในขณะที่ฝักและเมล็ดยังมีความชื้นสูง และ พบสารอะฟลาท็อกซินเกือบทุกตัวอย่างในปริมาณ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และจาก การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสารพิษชนิดนี้ใน เมล็ดถั่วลิสงกระเพาะเป็ลือกแล้ว ในถั่วป่นและ ในถั่วสำหรับทึบน้ำมัน พบว่า 9 ตัวอย่างใน 15 ตัวอย่าง มีเชื้อราชนิดนี้เจริญอยู่และมีการสร้าง สารอะฟลาท็อกซินในปริมาณที่สูงอีกด้วย (อรุณศรี และคณะ, 2526)

แนวทางแก้ไขปัญหอะฟลาท็อกซิน

จากอันตรายร้ายแรงของสารพิษชนิดนี้ต่อ ผู้บริโภคถั่วลิสง ทำให้ประเทศไทยได้กำหนด ปริมาณของสารนี้ ให้มีปะปนในถั่วลิสงได้ไม่เกิน 20 พีพีบี (1 พีพีบี เท่ากับ 1 ส่วนใน 1,000 ล้านส่วน) แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีมาตรการ ควบคุมได้ตามที่กำหนด (อารันต์, 2528) ดังนั้น

จึงสมควรแก้ไขปัญหาของสารพิษชนิดนี้โดยเร่งด่วน และดำเนินงานเป็นขั้นตอน เพื่อขจัดสารพิษ นี้ให้ลดต่ำลงกว่าระดับที่ทางการกำหนด ซึ่งพอ ที่จะสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้

1. ไม่ควรปลูกถั่วลิสงซ้ำๆ ในที่เดิม ติดต่อกันหลายปี ทั้งนี้พบว่า จะมีเชื้อรา *A. flavus* เข้าทำลายถั่วลิสงในปริมาณที่สูงขึ้น ฉะนั้นจึง ควรปลูกถั่วลิสงหมุนเวียนกับการปลูกพืชตระกูล อื่นๆ (Diener และคณะ 1982) เพื่อลดปริมาณ ของเชื้อราในดินให้น้อยลง

2. เลือกใช้พันธุ์ต้านทานต่อการเข้าทำลาย ของเชื้อรา และการสร้างสารอะฟลาท็อกซินจาก การทดลองในต่างประเทศพบว่า ถั่วลิสงหลาย สายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อเชื้อราชนิดนี้ เช่น PI 387409, PI 337394F, UF 734022, UF 71513, US 26, Asirvia และ J-11 (Kolte, 1984 และ Diener และคณะ, 1982) แต่พันธุ์ถั่วลิสงเหล่านี้ ให้ผลผลิตต่ำ และคุณภาพไม่ดี จึงสมควรที่จะ ได้ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทยต่อไป ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้มีความต้านทานต่อเชื้อรา มีผลผลิตสูงและคุณภาพดี แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่พบ ว่ามีพันธุ์ต้านทานที่อยู่ในขั้นจะส่งเสริมให้กลีกร ปลูกได้ (อารันต์, 2528) ฉะนั้นนักปรับปรุงพันธุ์ ควรจะร่วมมือเร่งปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะให้ กลีกรได้ปลูกต่อไป

3. ควรป้องกันโรคและแมลงบางชนิด เนื่อง จากว่าโรคและแมลงบางชนิดเช่น ไล่เดือนฝอย ปลวก และเสี้ยนดิน เป็นต้น จะทำให้เกิดแผล บนฝักของถั่วลิสง ทำให้เชื้อรา *A. flavus* เข้าทำลาย ฝักและเมล็ดถั่วลิสงได้ง่ายขึ้น ทำให้มีอะฟลา- ท็อกซินในปริมาณที่สูงขึ้น ดังนั้นหากมีการ

ป้องกันกำจัดศัตรูเหล่านี้ ก็จะช่วยลดปัญหาอะฟลาท็อกซินได้อีกประการหนึ่ง

4. เก็บเกี่ยว และปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม โดยการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงในระยะที่เหมาะสม อย่าปล่อยให้ฝักแก่มากเกินไป ขณะเก็บเกี่ยวไม่ควรทำให้ฝักถั่วลิสงเป็นแผล หลังจากนำถั่วลิสงขึ้นจากดินแล้ว ควรรีบปลิดฝักและนำฝักไปตากแห้งโดยเร็ว ให้ความชื้นเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 8% ก็จะช่วยให้เชื้อราเจริญเติบโต และสร้างสารอะฟลาท็อกซินได้

5. คัดฝักและเมล็ดที่เสียออกทิ้ง ก่อนการกะเทาะเปลือกควรทำการคัดฝักที่มีเชื้อราขึ้นออกทิ้ง และหลังจากการกะเทาะเปลือกแล้ว ก็ทำการคัดเมล็ดที่มีเชื้อราและเมล็ดที่แตกหักทิ้งไป ก็จะช่วยลดปัญหาอะฟลาท็อกซินได้มาก

6. ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง เช่น ถั่วลิสงป่นที่ทำจากถั่วลิสงที่แตกหักไม่แห้งสนิท และป่นไว้นานหลายวัน เพราะอาจจะมีสารอะฟลาท็อกซินสร้างจากเชื้อราที่เจริญอยู่ตามถั่วลิสงเหล่านั้น

นอกจากการปฏิบัติดังกล่าว แล้วยังสามารถจะทำลายสารอะฟลาท็อกซิน (detoxifying) ที่เชื้อราสร้างขึ้นได้โดยใช้ความร้อน ที่อุณหภูมิสูงกว่า 260°C หรือการใช้สารละลายอัมโมเนีย 1% ทำปฏิกิริยากับเมล็ดถั่วลิสงก็จะลดสารพิษชนิดนี้เหลือต่ำกว่า 20 พีพีบี หากแต่ทั้งสองวิธีนี้จะทำให้คุณภาพของถั่วลิสงเสียไปด้วย จึงไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่จะขจัดสารพิษชนิดนี้ (เกศรา, 2527) แต่น่าจะเหมาะสมต่อการขจัดสารพิษในถั่วลิสงที่จะนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นในการป้องกันกำจัดเชื้อราไม่ให้สร้างสารพิษชนิดนี้ขึ้น จึงน่าจะเป็นวิธีการ

แก้ไขปัญหาระบาดของสารพิษชนิดนี้ได้โดยแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้ผลิตถั่วลิสงและผู้บริโภคถั่วลิสงโดยทั่วไป

เอกสารอ้างอิง

- เกศรา นุตาลัย 2527. งานวิจัยเกี่ยวกับอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง. รายงานการสัมมนาในงานวิจัยเรื่องถั่วลิสงครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 19-21 เมษายน 2527.
- พวงทอง ยืนอัศวพรณ. 2527. การสำรวจการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงของกลีกร. รายงานการสัมมนาเรื่องงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 19-21 เมษายน 2527.
- พวงทอง ยืนอัศวพรณ และสนั่น จอกลอย. 2526. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของกลีกรหลังการเก็บเกี่ยวถั่วลิสง รายงานการสัมมนาเรื่องงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ นครสวรรค์ 11-13 กุมภาพันธ์ 2526.
- ธวัชชัย ที่มขุนทดเถียร. 2523. ถั่วลิสง. โครงการพืชสำหรับเขตค่อนข้างแห้งแล้ง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 92 หน้า.
- อรุณศรี วงษ์อุไร, ปรีศนา เหมสุจิ, ประวัติ ตันบุญเอก และดารา พวงสุวรรณ. 2526. งานวิจัยอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง. รายงานการสัมมนาเรื่องงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ นครสวรรค์ 11-13 กุมภาพันธ์ 2526.
- อาร์นัต พัฒนัย. 2528. อะฟลาท็อกซินปัญหาของถั่วลิสง แก่นเกษตร 13(1). 45-48.
- Diener, U. L., R. E. Petti and R. J. Cole. 1982. Aflatoxin and other mycotoxins in peanuts. In Pattee, H. E and C. T. Yong (eds.) *Peanut science and technology. American Peanut Research and Education Society, Inc., Yoakum, Texas.*
- Feakin, S.D. 1973. Pest control in groundnuts. *PANS Manual No.2 Centre for overseas pest research.*
- Kolte, S.J. 1984. *Disease of annual edible oilseed crops-peanut diseases.* CRC Press, Inc. Florida.

อภิปรัชญาฟิสิกส์-เอกภพทัศนะใหม่

สุพล บริพันธ์*

เอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไร? มีขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร? คำถามนี้คงถือได้ว่าเป็นสุดยอดของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ แม้มนุษย์จะอยากรู้อย่างยิ่งยวดว่าตนเอง หรือชีวิตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ชีวิตเกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร? ถ้าสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเอกภพดังกล่าวได้แล้ว คำถามเกี่ยวกับชีวิตนี้คงสามารถหาคำตอบได้ง่ายเข้า ความพยายามในการค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้จะมีมานานเพียงใดก็ไม่อาจทราบ คาดว่าคงจะมีมานานเท่าๆ กับการวิวัฒนาการทางสติปัญญาในสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เรานี้เกิดขึ้นมาแล้ว การแสวงหาคำตอบมีกันมากมายหลากหลายวิธี ผลพวงของการค้นหาคำตอบเหล่านี้บางส่วนได้เปลี่ยนแปลงพัฒนามาเป็นศาสนาต่างๆ หรืออภิปรัชญา (metaphysics) ที่เข้าถึงได้ยากที่รู้ๆ กันนั่นเอง

การค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้เข้ามาถึงข้อสรุป (ในปัจจุบันนี้) ว่าเอกภพทั้งหมดประกอบด้วยสิ่งที่อาจถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สุด คือ อวกาศ-กาล และมวล-พลังงาน การเข้ามาประกอบกันของเหตุและปัจจัยจากการมีอยู่ของ 2 อย่างนี้ ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จนเป็นเอกภพที่เรารู้จักอยู่ในทุกวันนี้ ความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัยที่ทำ

ให้เกิดปฏิกิริยาวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นเอกภพเช่นทุกวันนี้ได้เป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็น กฎธรรมชาติ (Natural law) เชื่อว่าจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีผู้ค้นพบกฎธรรมชาตินี้ในแง่มุมและระดับต่างๆ กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างเช่นกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน กฎของแรงทางไฟฟ้า หรือแม้แต่กฎแห่งกรรมในศาสนาเป็นต้น กฎต่างๆ เหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกว่า ธรรมชาติมีกฎมากมาย นั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ปลีกย่อยในระดับต่างๆ เท่านั้น ในระดับสุดยอดที่ควบคุมความเป็นไปของเอกภพทั้งหมดนั้น มีผู้เชื่อว่ามีเพียงกฎเกณฑ์ง่าย ๆ เพียงข้อเดียวเท่านั้น อย่างเช่น ไอน์สไตน์ เชื่อว่าเอกภพจะสามารถอธิบายได้ด้วยสมการคณิตศาสตร์เพียงสมการเดียว เขาได้พยายามค้นหาสมการดังกล่าวตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ในช่วงตอนปลายของชีวิต โดยพยายามรวมเอาทฤษฎีเกี่ยวกับสนามของแรงต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่โครงสร้างของฟิสิกส์ทั้งหมดตั้งอยู่บนเข้าด้วยกันเป็น “ทฤษฎีสานามรวม” (Unified field theory) ซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังมีผู้พยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ต่อมาก็ตาม

นักฟิสิกส์เชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเอกภพ 2 อย่างคือ อวกาศ-กาล และมวล-พลังงาน นั้น อวกาศ-กาล มีสภาพต่อเนื่องเป็น

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อเดียวกันโดยตลอด ส่วนมวล-พลังงาน นั้น มีการอธิบายด้วยทฤษฎีที่ขัดแย้งกันโดยคุณลักษณะ พื้นฐานแต่ร่วมเข้าด้วยกัน คือ ทฤษฎีคลื่น-อนุภาค ดังนั้น การที่จะเข้าใจว่าวัตถุ เช่น ก้อนหิน หรือ ตัวเราเองนี้มีสภาพเป็นคลื่นที่มีความต่อเนื่อง ไปในอวกาศ-กาล ของเอกภพเท่ากับที่มีสภาพ เป็นตัวตนเป็นก้อนๆ อย่างที่เห็นๆ กันอยู่นี้จึง เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากเย็นอยู่ไม่น้อยแม้ว่า ฟิสิกส์จะสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้โดยตรรกของ คณิตศาสตร์ และการทดลองสังเกตปรากฏการณ์ ได้ก็ตาม สภาพของมันจริง ๆ จะเป็นอย่างไรยัง ไม่มีใครทราบ ทราบแต่คุณสมบัติที่เป็นทั้งคลื่น และอนุภาคที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่างเท่านั้น ต่อความเข้าใจในสภาพจริง ๆ ของสิ่งนี้จึงยังเป็น ถึงอภิปรัชญา ที่ต้องอาศัยสัญชาตญาณ (Intuition) ซึ่งเป็นระดับความรู้ความเข้าใจที่ปรากฏกับใจ ที่ กล่าวได้ว่าเป็นปัจเจก ตั้ง รู้ชัดเฉพาะใจตนยากที่ จะให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยการอธิบายเรื่องปัจเจกตั้ง นี้เคยมีผู้ถามศาสตราจารย์ Brian McCusker นัก นิวเคลียร์ฟิสิกส์ชาวออสเตรเลียที่ได้รับการ ยกย่องอย่างสูงท่านหนึ่งว่า ภาวะสมาธินั้นเป็น อย่างไร? [ศาสตราจารย์ท่านนี้เป็นผู้อุทิศตนฝึกฝน ในการทำสมาธิแบบ Transcendental Meditation (TM) ซึ่งเป็นวิธีการทำสมาธิแบบหนึ่งที่เผยแพร่ อย่างกว้างขวาง ในยุโรปและอเมริกา โดยโยคีชาว อินเดีย] ท่านได้ตอบว่า ท่านสามารถที่จะอธิบาย ได้ แต่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้เหมือนกับการที่เรา พยายามอธิบายการเล่นหมากรุกให้สุนัขฟัง ซึ่ง ไม่ว่าเราจะอธิบายได้ชัดเจนละเอียดเพียงไรก็ตาม สุนัขก็คงจะเข้าใจได้เพียงบางๆ อย่างมาก ๆ เท่านั้นเอง ท่านหมายถึงให้ไปมีประสบการณ์เอง เท่านั้นจึงจะรู้ได้

ปัจจุบันนี้ วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ได้

ก้าวหน้าไปมาก คอมพิวเตอร์ทำงานได้โดยอาศัย หลักการมีหรือไม่มีสภาพทางไฟฟ้า ที่สามารถ อธิบายได้โดยวิธีการของคณิตศาสตร์เลขฐาน 2 กล่าวได้ว่าการค้นพบเรื่อง บิท (BIT = Binary digit) ในทางคอมพิวเตอร์เป็นก้าวสำคัญยิ่งใหญ่ ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ บิท เป็นหน่วย ข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบการทำงานของคอม-พิวเตอร์ แต่สำคัญที่สุดต่อการทำงานของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง หรือ ข้อมูลข่าวสาร (information) ที่กำหนดอยู่ใน บิทเรียงตามลำดับ ข้อมูลข่าวสารในบิทนี้จะ สามารถอธิบายได้โดยระบบเลขฐาน 2

ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารในรูปของบิท ได้เข้ามามีบทบาทต่อความคิดในเรื่องเอกภพที่ น่าสนใจขึ้น โดยแนวความคิดของ Edward Fred-kin ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นถึงศาสตราจารย์ทาง ด้านคอมพิวเตอร์ในสถาบัน M.I.T. สหรัฐอเมริกา เมื่ออายุได้เพียง 34 ปี (ราว ค.ศ.1968 นี้เอง) โดย ที่ตนเองไม่เคยศึกษาจบปริญญาใดจากสถาบัน ไทไหนมาก่อนเลย Fredkin เป็นผู้ริเริ่มและสอนวิชา Digital Physics ในสถาบันแห่งนี้

Fredkin เชื่อว่าสิ่งที่พื้นฐานของเอกภพ นั้นนอกจาก อวกาศ-กาล และมวล-พลังงาน แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเสียยิ่งกว่า 2 อย่าง แรก คือ ข้อมูลข่าวสาร (information) สิ่งนี้เป็น พื้นฐานกำหนดความเป็นไปของเอกภพเช่นเดียวกับที่ บิท กำหนดการทำงานของคอมพิวเตอร์ เขา เชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น อะตอม โปรตอน อิเล็กตรอน หรือควาร์ก (Quarks) ก็ตาม เป็นเพียง "บิท" ที่ประกอบกันเข้าเท่านั้น เป็น เพียงกลุ่มรูปแบบของหน่วยข้อมูลแบบเลขฐาน 2

(binary units) ของข้อมูลข่าวสารแบบเดียวกับในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ข้อมูลข่าวสารนี้แฝงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ของมวลพลังงาน ในทำนองเดียวกับที่กระแสอิเล็กตรอนที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในสายใยเซลล์ประสาทสมองของคนเราที่เป็นตัวทำให้เกิดการทำงานขึ้นมาได้

Fredkin เชื่อว่าเอกภพไม่ได้มีสภาพต่อเนื่องอย่างที่เข้าใจกันมา จากสาระสำคัญพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเอกภพตามแนวทฤษฎีของเขา คือ สภาพบิต ข้อมูลข่าวสารของเอกภพ ทำให้อวกาศ-กาลมีสภาพเป็นเม็ด ๆ หรือหน่วยเล็ก ๆ (grain) และสภาพเป็นหน่วยเล็ก ๆ หรือเม็ด ๆ ของอวกาศ-กาล นี้ไม่อาจแบ่งให้เล็กลงไปอีก ความเป็นไปทั้งหมดในเอกภพจึงเปรียบได้กับการทำงานของคอมพิวเตอร์มหึมาเครื่องหนึ่ง Fredkin ได้ยกตัวอย่างความมีอยู่ของสภาพบิต ข้อมูลที่เห็นได้ง่าย ๆ เช่น รหัสชีวิตที่มีอยู่ในจีนส์ (genes) ของสิ่งมีชีวิต ที่ควบคุมความเป็นไปในการสร้างสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ และความเป็นไปของปฏิกิริยาต่าง ๆ ของชีวิตนั้น ๆ ที่ทำให้กระบวนการดำเนินไป การโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของอะตอม หรือการเกิดขึ้นของดวงดาว หรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ ในเอกภพนั้น Fredkin ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญ แต่เป็นไปตามข้อมูลข่าวสาร (Information) พื้นฐานเอกภพเป็นตัวกำหนดมา และควบคุมความเป็นไปในระบบข้อมูลแบบตัวเลข (digital information)

แนวความคิดดังกล่าวนี้ของ Fredkin แทบจะกล่าวได้ว่าทำให้เขาต้อง "โดดเดี่ยว" หาผู้สนับสนุนความคิดเห็นด้วยยากมาก ความคิดที่ล้ำสมัยสืบเนื่องมาจากการค้นพบทฤษฎี Cellular automaton ที่กำลังได้รับการศึกษาและพัฒนา นำมาใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีระดับสูงโดยห้อง

ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของสถาบัน M.I.T. ทำให้ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางคนที่ไม่มองข้ามความมีอัจฉริยะของเขาถึงกับกล่าวว่า แนวความคิดของ Fredkin อาจเปรียบได้กับเมื่อครั้งที่เซอร์ไอแซค นิวตัน เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าวัตถุสามารถส่งแรงไปกระทำกับวัตถุอื่นในระยะไกลได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกัน (ทฤษฎีสนามของแรงความโน้มถ่วง) ได้นั้น ยกที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ยินยอมรับได้ พวกเขาบอกว่า นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะมุ่งหน้าเจาะทะลวงค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติไปในอุโมงค์แห่งทัศนะ (tunnel vision) ที่ล้อมรอบอยู่ด้วยกฎของธรรมชาติ (natural law) เชื่อมันต่อกฎในทางฟิสิกส์โดยไม่ได้สนใจที่จะสอบสวนว่าทำไมสิ่งทั้งหลายจึงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่จึงไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างทฤษฎีใหม่ ๆ แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปทางความคิดอย่างเช่นที่ Fredkin กระทำอยู่ จุดที่จะเป็นเรื่องในการสนทนากันต้องเป็นนักฟิสิกส์อย่างเช่น Feynman หรือ Einstein หรือ Pauli เท่านั้น ส่วนที่เหลือคงต้องคุยกันในหัวข้อใครจะได้เป็น ส.ส. หรือพรรคไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลอย่าง Richard Feynman เคยได้กล่าวถึง Fredkin ว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดและมีความคิดริเริ่ม แม้ว่าแนวความคิดจะ "แปลก" ในบางครั้ง แต่ Fredkin ก็เป็นผู้ที่มองฟิสิกส์ด้วยแนวทางอย่างใหม่ ๆ ที่มีอยู่น้อยคน บางคนก็ว่า Fredkin นั้น "เพี้ยน" ออกนอกแนวทางแต่ที่แน่ ๆ คือ โดยอาศัยความสามารถของสติปัญญาของเขาเอง ทำให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองจนได้รับเชิญเป็นศาสตราจารย์ในสถาบัน M.I.T. และผลงานสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำให้เขากลายจาก

ฐานะธรรมดาเป็นเศรษฐกิจมีเงินหลายล้านเหรียญ ตั้งแต่ก่อนเป็นศาสตราจารย์

คำถามมากมายที่เกิดขึ้นติดตามแนวความคิดเรื่องเอกภพของเขาเช่น ใครสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เอกภพนี้ขึ้นมา? ใครหรืออะไรที่เป็นผู้กำหนดข้อมูลคำสั่งให้คอมพิวเตอร์นี้ทำงาน? เพื่ออะไร? มีพระเจ้าเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เอกภพนี้ขึ้นมาใช่หรือไม่? คำตอบของ Fredkin เป็นไปในรูปแบบของปรัชญา เขากล่าวว่าการแสวงหาคำตอบในคำถามเหล่านี้จะทำให้พลาดไปจากจุด เขาให้เหตุผลว่าไม่มีหนทางใดเลยที่จะรู้คำตอบของบางคำถามได้เร็วไปกว่าที่กำลังเป็นอยู่ (ของกระบวนการตอบคำถามนั้น) Fredkin กล่าวว่า เขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าของคริสต์หรือยูดาห์หรือศาสนาใดๆ ก็ตาม เขาไม่ใช่พวกเชื่อในการปฏิเสธความมีอยู่ของพระเจ้า และไม่ใช่พวกที่เชื่อแต่เฉพาะในสิ่งที่เห็นปรากฏการณ์ได้จริงอย่างเดียว นั่นด้วย เขาเป็นเพียงผู้อยู่ในฐานะธรรมดา เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมีจริงหรือไม่ และไม่สนใจว่าจะมีจริงหรือไม่ ไม่สนใจว่าจะมีมิตินาฬิกาเพียงใดก็ตาม เขารู้สึกเพียงว่าเอกภพกำลังเป็นไปคล้ายกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพื่อหาคำตอบอะไรบางอย่าง และคำตอบนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เร็วไปกว่าที่มันกำลังเป็นไปตามขั้นตอนของมัน เช่นเดียวกับที่คอมพิวเตอร์ทำงานหาคำตอบไปที่ละขั้นของบิตข้อมูลคำสั่งตามลำดับ ไม่มีทางลัดข้ามขั้นได้เลย Fredkin เชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นผลของอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่า Intelligent

(ปัญญาสากล?)

ทฤษฎีเอกภพของ Fredkin ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับเอกภพได้เพียงว่า ทำไมสิ่งต่างๆ จึงต้องเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติได้เท่านั้นเอง ซึ่งคำตอบคือ เพราะความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ในเอกภพถูกควบคุมด้วย ข้อมูลข่าวสาร (Information) และกระบวนการทั้งหมดดำเนินไปภายใต้กฎเกณฑ์ง่ายๆ เพียงอย่างเดียวที่ Fredkin เรียกว่า "The prime mover of everything" จากทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับทุกชีวิตที่เกิดมา ข่าวดีคือ เราอาจจะเกิดมาอย่างมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยในการหาคำตอบที่ลึกลับยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่ง อันเป็นความมุ่งหมายที่มีขึ้นมาของเอกภพ และข่าวร้ายคือเราอาจจะเป็นเหมือนส่วนประกอบในอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังไหลไปในตัวนาต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพื่อหาคำตำแหน่งที่เก๋อสงไสยหลังจุดศูนยนิยมของค่า π ของตัวจอมกวนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้

ถ้าจะมีพระเจ้าที่กำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เอกภพหาค่าของ 1 หารด้วย 0 เพื่อความเป็นผู้ถึงที่สุดของความรอบรู้เพื่อทรงมิตินาฬิกาอย่างสุดประมาณได้จริง ๆ?

เอกสารประกอบ

1. Wright, Robert. 1988. Did The Universe Just Happen? The Atlantic Monthly, April 1988.
2. Camm, Mark. 1988. Does The Universe Run on Bits? Sydney Morning Herald, July 25, 1988.

การเปรียบเทียบ Orthogonal Contrasts ใน Fixed Effects ONE-WAY ANOVA*

** เอนก พชรินทร์ศักดิ์

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของการทดลองแบบ Single-Factor และมีการแจกแจงทางเดียว (One-Way Classification) นั้นเป็นการทดสอบรวมโดยใช้ F test (Overall F test) โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่า ผลอันเกิดจาก treatment ทั้งหมดมีค่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร คือ $H_0 : \mu_i = \mu_j, \forall i \neq j$ หรืออาจจะเป็นการทดสอบผลรวมของแต่ละ treatment คือ $H_0 : t_i = t_j \forall i=j$ ทั้งนี้เพราะเรา define ว่า $t_i = \mu_i - \mu$ ใน model $Y_{ij} = \mu + t_i + \epsilon_{ij}$

$i = 1, 2, \dots, p$ (จำนวนทรีทเมนต์)

$j = 1, 2, \dots, r$ (จำนวนซ้ำ)

$$Y_{i.} = \sum_{j=1}^r Y_{ij} = \frac{y_{i.}}{r}$$

และค่าประมาณของ $\hat{\mu}_i = \bar{y}_{i.}$

เมื่อการทดสอบ overall F test ในตาราง ANOVA มีนัยสำคัญ ปัญหาที่จะต้องพิจารณามี 2 กรณี คือ การทดสอบขั้นต่อไปจะเป็นแบบ priori (หรือ planned comparisons) หรือเป็นแบบ posteriori (หรือ post hoc comparisons) ทั้งนี้เพื่อต้องการทดสอบว่ามี treatment คู่ใดบ้างที่ให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

หากการทดสอบระหว่างคู่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการทดลอง เราเรียกว่าเป็น priori comparisons และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ระดับนัยสำคัญ α ที่กำหนดไว้เดิมใน overall F test มีค่าเปลี่ยนไปเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า Orthogonal Contrasts ส่วนการทดสอบแบบ posteriori มีหลายวิธี เช่น วิธีของ Tukey, Duncan, Scheffé, LSD และ SNK เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ Orthogonal Contrasts

ถ้าให้ $Y_{i.}$ เป็น treatment total ของ treatment ที่ i

r เป็นจำนวนซ้ำ (ให้มีค่าเท่ากัน) ของแต่ละทรีทเมนต์

* พิมพ์เรียบเรียงใหม่จากวารสารสถิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2525 โดยผู้เขียนคนเดียว

** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นต้นว่า ถ้าการทดลองมี 3 ทรีทเมนต์ เราอาจต้องการเปรียบเทียบ $Y_1 - Y_2, Y_1 + Y_2 - 2Y_3$ ซึ่งหมายถึง $H_0: \mu_1 = \mu_2$ และ $H_0: \mu_1 + \mu_2 = 2\mu_3$ ตามลำดับ การเปรียบเทียบระหว่างคู่ที่จะเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบแบบ contrast หมายความว่า การเปรียบเทียบแต่ละชุดเป็นอิสระกัน กล่าวคือ จะไม่มีการเปรียบเทียบชุดใดชุดหนึ่ง เข้าไปรวมอยู่ในการเปรียบเทียบชุดอื่น ตามตัวอย่างข้างต้นจะเป็น contrast 2 ชุด ซึ่งเป็นอิสระกันมีข้อสังเกตว่าการเปรียบเทียบดังกล่าว มีลักษณะเป็น linear combination ของทรีทเมนต์และผลรวมของสัมประสิทธิ์เป็น 0

นิยาม linear function ใดๆ เช่น

$$Z_w = l_{w1} Y_1 + l_{w2} Y_2 + \dots + l_{wk} Y_k$$

จะเรียกว่าเป็น contrast ระหว่าง t_i 's ถ้า

$$l_{w1} + l_{w2} + \dots + l_{wk} = 0$$

นิยาม Contrasts Z_1 และ Z_2 จะเป็น orthogonal contrast ถ้า

$$l_{11} l_{21} + l_{12} l_{22} + \dots + l_{1k} l_{2k} = 0$$

ตัวอย่างเช่น จาก model $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$ การทดลองมี 4 ทรีทเมนต์ (d.f. = 3) เราจัด contrast ได้ 3 ชุด คือ

$Z_1 = Y_1 - Y_4$	เป็นการเปรียบเทียบ	ของทรีทเมนต์ 1 กับ 4
$Z_2 = Y_2 - Y_3$	" "	" " 2 กับ 3
$Z_3 = Y_1 - Y_2 - Y_3 + Y_4$	" "	" " 1 และ 4 กับ 2 และ 3

แต่ละ orthogonal จะมีสัมประสิทธิ์ดังตาราง

สัมประสิทธิ์	ผลรวมของสัมประสิทธิ์
Z_1 +1 0 0 -1	$(+1) + (-1) = 0$
Z_2 0 +1 -1 0	$(+1) + (-1) = 0$
Z_3 +1 -1 -1 +1	$(+1) + (-1) + (-1) + (+1) = 0$
Z_1 และ Z_2 orthogonal กันเพราะ	$(+1)(0) + (0)(+1) + (0)(-1) + (-1)(0) = 0$
Z_1 และ Z_3 orthogonal กันเพราะ	$(+1)(+1) + (0)(-1) + (0)(-1) + (-1)(+1) = 0$
Z_2 และ Z_3 orthogonal กันเพราะ	$(0)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(-1) + (0)(+1) = 0$

เราพบว่า Z_1, Z_2 , และ Z_3 ต่างก็ตั้งฉากซึ่งกันและกัน (mutually orthogonal contrast) กฎ ถ้า Z_w เป็น contrast ระหว่าง τ_i 's แล้ว

$$\frac{Z_w^2}{D_w} \text{ เมื่อ } D_w = r(l_{w1}^2 + l_{w2}^2 + \dots + l_{wk}^2)$$

จะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง (a component) ของ Treatment sum of squares (SSTr) โดยมี d.f. = 1

หากกล่าวโดยทั่วไป ถ้ามีจำนวนทรีทเมนต์ = p เราจะได้

$$\text{ผลบวกของกำลังสองของ contrast } Z_k' SS_{Z_k} = \frac{Z_k^2}{\frac{P}{r \sum_{i=1}^p l_{ki}^2}}$$

2. ทฤษฎีของ Orthogonal contrast

ผลบวกของกำลังสองของ mutually orthogonal contrast ของ treatment ย่อมเท่ากับ Treatment sum of squares (SSTr)

การพิสูจน์ ให้ p = จำนวนทรีทเมนต์ (จะได้จำนวน contrast = $p-1$ ชุด)

r = จำนวนซ้ำในแต่ละทรีทเมนต์

Y_i = ผลรวมของ treatment effect ที่ i , $i = 1, 2, \dots, p$

จากการคำนวณในตาราง ANOVA

$$\text{Treatment sum of squares คือ } SSTr = \sum_{i=1}^p \frac{y_i^2}{r} - \frac{G^2}{rp} \text{ เมื่อ } G = \text{grand total} = y_{..}$$

$$\text{ให้ contrast } k \text{ คือ } Z_k = \sum_{i=1}^p c_{ki} y_i \text{ โดยที่ } \sum_{i=1}^p c_{ki} = 0$$

$$\text{และ contrast } l \text{ คือ } Z_l = \sum_{i=1}^p c_{li} y_i \text{ โดยที่ } \sum_{i=1}^p c_{li} = 0$$

ถ้า Z_k และ Z_l เป็น mutually orthogonal contrast หมายความว่า

$$Z_k \perp Z_l \iff \sum_{i=1}^p c_{ki} c_{li} = 0$$

ดังนั้นถ้าให้ Z_j ($j=1, 2, \dots, p-1$) เป็น contrast ใดๆ ของการทดลองที่มี p ทรีทเมนต์เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า

$$\frac{\sum_{i=1}^p Y_i^2}{r} - \frac{G^2}{rp} = \sum_{j=1}^{p-1} \frac{Z_j^2}{r \sum_{i=1}^p c_{ji}^2}$$

หรือ $SSTr = \text{ผลบวกของ } SS_{Z_j}; j=1, 2, \dots, p-1$ เมื่อ Z_j คือ contrast

$$\text{ให้ } Z_p = \sum_{i=1}^p Y_i = G = \text{ผลรวมของ treatment total} = y_{..}$$

โดยการ transformation $Z_k \rightarrow W_k$ และ $Z_\ell \rightarrow W_\ell$ โดยให้

$$W_k = \frac{\sum_{i=1}^p C_{ki} Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^p C_{ki}^2}} = \frac{\sum_{i=1}^p b_{ki} Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^p b_{ki}^2}} \quad \text{เมื่อ } b_{ki} = \frac{C_{ki}}{\sqrt{\sum_{i=1}^p C_{ki}^2}}$$

$$\text{และ } W_\ell = \frac{Z_\ell}{\sqrt{\sum_{i=1}^p C_{\ell i}^2}} = \frac{\sum_{i=1}^p b_{\ell i} Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^p b_{\ell i}^2}} \quad \text{เมื่อ } b_{\ell i} = \frac{C_{\ell i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^p C_{\ell i}^2}}$$

W_k และ W_ℓ ต่างก็เป็น mutually orthogonal contrast เพราะ $\sum b_{ki} = 0$, $\sum b_{\ell i} = 0$ และ

$$\sum_i b_{ki} b_{\ell i} = 0$$

$$\text{ให้ } W_p = \frac{Z_p}{\sqrt{p}} = \frac{\sum_{i=1}^p Y_i}{\sqrt{p}} = \frac{G}{\sqrt{p}}$$

พิจารณาเมตริกซ์ $\underline{W} = \underline{B} \underline{Y}$

$$\begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p-1,1} & b_{p-1,2} & \dots & b_{p-1,p} \\ \frac{1}{\sqrt{p}} & \frac{1}{\sqrt{p}} & \dots & \frac{1}{\sqrt{p}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_p \end{bmatrix}$$

จะได้ $\underline{B}$ เป็น orthogonal matrix กล่าวคือ $\underline{B}^{-1} = \underline{B}$ (หรือ $\underline{B}'\underline{B} = \underline{I} = \underline{B}\underline{B}'$)

$$\text{จากข้างต้น } b_{ki} = \frac{C_{ki}}{\sqrt{\sum_{i=1}^p C_{ki}^2}}$$

$$\text{Squaring, } b_{ki}^2 = \frac{C_{ki}^2}{\sum_{i=1}^p C_{ki}^2}$$

$$\text{หาผลรวม, } \sum_{i=1}^p b_{ki}^2 = \sum_{i=1}^p \left[\frac{c_{ki}^2}{\sum_{i=1}^p c_{ki}^2} \right] = \frac{\sum_{i=1}^p c_{ki}^2}{\sum_{i=1}^p c_{ki}^2} = 1$$

เช่นเดียวกันสำหรับ b_{ii} จะได้

$$b_{ii}^2 = \frac{c_{ii}^2}{\sum_{i=1}^p c_{ii}^2} \text{ และ } \sum_{i=1}^p b_{ii}^2 = 1$$

$$\text{และ } \sum_{i=1}^p b_{ki} b_{ii} = \frac{\sum_i c_{ki} c_{ii}}{\sqrt{\sum c_{ki}^2} \sqrt{\sum c_{ii}^2}} = \frac{0}{\sqrt{\sum c_{ki}^2} \sqrt{\sum c_{ii}^2}} = 0$$

ดังนั้น

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ & & \dots & \\ b_{p-1,1} & b_{p-1,2} & \dots & b_{p-1,p} \\ \frac{1}{\sqrt{p}} & \frac{1}{\sqrt{p}} & \dots & \frac{1}{\sqrt{p}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{p-1,1} & \frac{1}{\sqrt{p}} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{p-1,2} & \frac{1}{\sqrt{p}} \\ & & \dots & & \\ b_{1,p-1} & b_{2,p-1} & \dots & b_{p-1,p-1} & \frac{1}{\sqrt{p}} \\ b_{1p} & b_{2p} & \dots & b_{p-1,p} & \frac{1}{\sqrt{p}} \end{bmatrix} = \underline{B} \underline{B}'$$

นั่นคือ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = \underline{B} \underline{B}' = \underline{I}$$

$$\therefore \underline{B} \underline{B}' = \underline{B}' \underline{B} = \underline{I}$$

$$\text{และ } \underline{B} \underline{B}' \underline{B} \underline{B}' = \underline{I}$$

$$\text{จาก } \underline{W} = \underline{B} \underline{Y} \text{ จะได้ } \underline{Y} = \underline{B}' \underline{W}$$

แสดงว่าเมื่อกำหนดค่าเฉพาะของ Y_i เราจะได้

$$Y_i = \sum_{j=1}^{p-1} b_{ij} W_j + \frac{W_p}{\sqrt{p}}$$

$$\text{squaring, } Y_{i.}^2 = \left[\sum_{j=1}^{p-1} b_{ij} W_j \right]^2 + \frac{2W_p}{\sqrt{p}} \sum_{j=1}^{p-1} b_{ij} W_j + \frac{W_p^2}{p}$$

$$= \sum_{j=1}^{p-1} b_{ij}^2 W_j^2 + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{p-1} W_j + \frac{2W_p}{\sqrt{p}} \sum_{j=1}^{p-1} b_{ij} W_j + \frac{W_p^2}{p}$$

หาผลบวกทั้งสองข้าง

$$\sum_{i=1}^p Y_{i.} = \sum_{i=1}^p \left[\sum_{j=1}^{p-1} b_{ij}^2 W_j^2 \right] + \sum_{i=1}^p \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{p-1} W_j + \frac{2W_p}{\sqrt{p}} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{p-1} b_{ij} W_j + \sum_{i=1}^p \frac{W_p^2}{p}$$

เนื่องจากการหาผลรวมชนิด finite เราสามารถเปลี่ยน $\sum_i$ และ $\sum_j$ สลับที่กันได้

$$\sum_{i=1}^p Y_{i.} = \sum_{j=1}^{p-1} W_j^2 \underbrace{\sum_{i=1}^p b_{ij}^2}_{=1} + \sum_{j=1}^{p-1} W_j \underbrace{\sum_{i=1}^p b_{ij}}_{=0} + \frac{2W_p}{\sqrt{p}} \sum_{j=1}^{p-1} W_j \underbrace{\sum_{i=1}^p b_{ij}}_{=0} + W_p^2$$

$$= \sum_{j=1}^{p-1} W_j^2 + \frac{G^2}{p} \quad \left[\because W_p = \frac{G}{\sqrt{p}} \right]$$

$$= \sum_{j=1}^{p-1} \left[\frac{Z_j^2}{p} \right] + \frac{G^2}{p}$$

$$\text{เอา } r \text{ ทารตลอด, } \frac{1}{r} \sum_{i=1}^p Y_{i.} = \frac{1}{r} \sum_{j=1}^{p-1} \left[\frac{Z_j^2}{p} \right] + \frac{G^2}{rp}$$

$$\text{ย้ายข้าง, } \frac{\sum_{i=1}^p Y_{i.}^2}{r} - \frac{G^2}{rp} = \sum_{j=1}^{p-1} \frac{Z_j^2}{r \sum_{i=1}^p c_{ji}^2}$$

นั่นคือ SSTr = ผลบวกของกำลังสองของ contrasts ทั้งหมด (ซึ่งมีจำนวน $p-1$ ชุด).

อิทธิพลของความชื้นในเมล็ดต่อ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์

เตือนใจ ไก่สกุล*

เมล็ดที่เก็บไว้นาน ๆ มักจะมีปัญหาเมื่อนำเมล็ดไปปลูก มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ จนบางครั้งเมล็ดอาจไม่งอกเลย ซึ่งแสดงว่าเมล็ดไม่มีความมีชีวิต โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวเมล็ดมาจากแปลง ควรดำเนินการปลูกในทันที ทั้งนี้เมล็ดเหล่านี้จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถนำเมล็ดมาปลูกได้ทันที ทั้งนี้ต้องนำเมล็ดไปเก็บรักษาไว้ก่อนจนกว่าจะถึงฤดูกาลที่เหมาะสม จึงนำออกมาปลูกได้ เมล็ดที่จัดเป็นพวกเมล็ดออโธดอกซ์ (orthodox seed) ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ให้มีชีวิตได้ยาวนานเป็นปี เช่น ข้าวโพด ข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ถั่วเขียว ถั่วดำ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง บวบ มะเขือเทศ เมล็ดไม้ป่าบางชนิด คือ เมล็ดกระถิน กระถินเทพา เลี่ยน ยูคาลิปตัส และเมล็ดสนสามใบ ส่วนเมล็ดที่จัดเป็นพวกเมล็ดรีแคลซิเทรนต์ (recalcitrant seed) ไม่สามารถเก็บรักษาให้คงความมีชีวิตได้ยาวนาน เพราะเมล็ดเหล่านี้ไม่อาจลดความชื้นในเมล็ดลงให้ต่ำ (8-20%) ได้ เพราะจะทำให้เมล็ดได้รับอันตรายและตายไปในที่สุด เช่น เมล็ดส้มพันธุ์ต่าง ๆ ขนุน เงาะ ทุเรียน เมล็ดไม้ป่าบางชนิดคือ

เมล็ดพืชในตระกูลยาง ประดู่ ยมปา และเมล็ดสัก นอกจากนี้เมล็ดที่ส่วนประกอบมีน้ำมันสูง (เมล็ดถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง) ก็ไม่สามารถเก็บรักษาให้คงความมีชีวิตได้เป็นเวลานานเช่นกัน

หลังจากที่ดอกเริ่มบาน (anthesis) ละอองเรณูก็จะตกที่ยอดเกสรตัวเมีย แล้วเข้าไปผสมกับไข่ที่อยู่ในโอวูล (ovule) และพัฒนาการต่อไปจนเกิดเป็นเมล็ดขึ้น ช่วงระยะเวลาที่ดอกเริ่มบานจนเกิดการถ่ายละอองเรณู (pollination) และการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์ม (fertilization) ใช้เวลาต่างกันในพืชต่างชนิด ในข้าวโพดใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน ส่วนใหญ่ในสนเขา (*Pinus*) ใช้เวลาเป็นเดือน หลังจากไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว โอวูลจะเจริญเป็นเมล็ดที่ใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิดซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรม (A) จนได้เมล็ดที่สุกแก่เต็มที่ (physiological maturity) ที่ X_1 ซึ่งในขณะนี้เมล็ดยังคงมีความชื้นสูง (18-40%) ปกติแล้วความชื้นมีมากที่สุดในขณะที่เริ่มมีการสร้างเมล็ด (ไข่ผสมกับสเปิร์ม) กล่าวคือ ความชื้นจะสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เกิดการปฏิสนธิซ้อน (double fertilization) มีความชื้นใน

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มากกว่า ซึ่งจะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาอย่างเต็มที่แล้ว ทั้งช่วงระยะเวลาไปเรื่อย ๆ เมล็ดจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ (seed deterioration) จากจุดนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่เมล็ดเสื่อมคุณภาพ 100% ช่วงระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่เมล็ดสุกแก่เต็มที่จนถึงเสื่อมคุณภาพ 100% นี้ (B) ใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

จากลักษณะภายนอกของเมล็ด เช่น ขนาด สี ของเมล็ดรวมตลอดไปถึงสีของผล สามารถบ่งบอกถึงเมล็ดมีความสุกแก่เต็มที่ได้อย่างไร โดยอาจเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล หรืออาจสังเกตจากลักษณะรูปร่างภายนอกของเมล็ดเอง กล่าวคือ เมล็ดเมื่อแก่เต็มที่ ส่วนเนื้อเยื่อที่เรียกว่า เนื้อเยื่อลำเลียง (vascular tissue) ที่ยื่นมาจากส่วนของโอวูล เพื่อรับอาหารที่ส่งมาจากเนื้อเยื่อฝ่ายแม่ หรือส่วนที่เป็นรก (funiculus) นี้เกิดแถบของการร่วง (abscission layers) ขึ้น โดยมีสารประกอบลิกนินมาอุดตันไว้เกิดหยุดส่งอาหาร ซึ่งสังเกตการเกิดแถบของการร่วงนี้ได้ เช่นในข้าวโพดเห็นเป็นบริเวณสีดำ (black layer) ที่ส่วนปลายของข้าวเมล็ด ในเมล็ดถั่วเห็นส่วนที่เป็นฮิลลัม (hillum) ที่อยู่บริเวณด้านข้าง หรือในเมล็ดแตงโมเห็นเส้นใยสีขาวซึ่งเป็นส่วนของรก หรือเมล็ดถั่วที่อยู่ในฝักเมื่อเขย่าฝักจะมีเสียงดังแสดงว่าส่วนของรกรหายไป ทำให้เมล็ดหลุดออกจากฝักซึ่งหมายความว่าเมล็ดแก่เต็มที่แล้ว

เมล็ดที่เก็บรักษาไว้นาน ๆ จำเป็นต้องมีการทดสอบความงอกตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดยังคงมีชีวิตอยู่ ในโอกาสที่เมล็ดจะเสื่อม

คุณภาพเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดในระหว่างที่เก็บรักษา คือความชื้นในเมล็ดหลังจากที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาแล้วเก็บเกี่ยวในทันทีโดยที่ความชื้นในเมล็ดยังสูงอยู่ (ประมาณ 18-40%) แล้วนำเมล็ดมากองสุมไว้ ส่วนของเมล็ดที่อยู่ตรงกลางแทบจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับอากาศภายนอก เมล็ดยังคงมีความชื้นสูงอยู่ทำให้เกิดอัตราการหายใจสูง ผลสุดท้ายจากการเกิดการหายใจขึ้น ทำให้ได้พลังงานออกมามากมาย ดังสมการ




พลังงาน (ATP) พลังงานที่ปลดปล่อยออกมานี้ทำให้เกิดความร้อน ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้เชื้อราและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย ทั้งยังไม่เหมาะต่อการนำเมล็ดมาแยก ขัดสีกระเทาะเปลือก หรือนวด* (shilling หรือ threshing) ผลสุดท้ายเมล็ดเสื่อมคุณภาพลง จึงควรลดความชื้นในเมล็ดลงเหลือ 13-18% ซึ่งจะทำให้อัตราการหายใจน้อยลง ลดความร้อนลง และเมล็ดยังมีความต้านทานต่อเชื้อรา แมลงและอันตรายจากเครื่องจักร (mechanical damage) ถ้าต้องการเก็บรักษามะล็ดโดยยังไม่นำไปปลูกทันที ควรให้เมล็ดมีความชื้นลดลงอีก เมื่อต้องการเก็บรักษามะล็ดไม่ให้เสื่อมคุณภาพ เช่น เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องในที่ภาชนะไม่มีฝาปิดนาน 6-18 เดือน ก็ควรลดความชื้นในเมล็ดลงเหลือ 10-13% แต่ถ้าต้องการเก็บรักษามะล็ดไว้เป็นปี (1-3 ปี) ในภาชนะเช่นเดียวกับอันแรกก็ควรลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 8-10% และถ้าต้องการเก็บไว้ในที่ภาชนะมีฝาปิดสนิท (sealed storage) เพื่อป้องกันความชื้นในเมล็ดไม่ให้สูญเสียไปก็ควรลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 4-8% ซึ่ง จะเก็บเมล็ดไม่ให้เสื่อมคุณภาพได้เป็นสิบ ๆ ปี

*การนำเมล็ดมาแยก ขัดสีกระเทาะเปลือก หรือนวด โดยใช้เครื่องจักร เป็นขั้นตอนหนึ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเมล็ด (seed condition) ซึ่งพยายามขจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกจากเมล็ด

แต่ถ้าลดความชื้นในเมล็ดลงไปอีกเหลือเพียง 0-4% จะไม่มีผลดีเลย เพราะทำให้เมล็ดมีสภาพแข็งขึ้น (hardseededness) เนื่องจากน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์และภายในของเมล็ดเกิดแข็งตัว (freezing) ซึ่งมีผลทำให้เมล็ดได้รับอันตราย (water damage) และตายไปในที่สุด และเมื่อต้องการให้เมล็ดงอกก็ควรให้เมล็ดได้ดูดรับความชื้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง (rehydration) จนถึง 33-60% เมล็ดก็จะงอกได้ (ดังแสดงในรูปที่ 2)

อย่างไรก็ตามในสภาวะปกติ เมล็ดดูดและคายความชื้นในตัวเองให้แก่บรรยากาศรอบข้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความดันไอน้ำ (vapour pressure) ที่แตกต่างกัน ถ้าความดันไอน้ำในเมล็ดสูงกว่าความดันไอน้ำในบรรยากาศ เมล็ดก็จะคายความชื้นแก่บรรยากาศ ในทำนองเดียวกันถ้าความดันไอน้ำของบรรยากาศสูงกว่าเมล็ดก็จะดูดความชื้นจากบรรยากาศเข้าเก็บรักษาไว้ในตัวของเมล็ดเอง จนกว่าจะถึงระดับที่มีความดันไอน้ำเท่ากัน ซึ่ง



รูปที่ 2 ไคอะแกรมแสดงบทบาทและความสำคัญของ ความชื้นในเมล็ดต่อช่วงชีวิตที่เกิดขึ้นในเมล็ด

เป็นความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content) ระดับความชื้นที่สมดุลในเมล็ดนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามอากาศรอบข้าง กล่าวคือ อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) สูงมีผลทำให้เมล็ดมีความชื้นสมดุลสูงตามไปด้วย แต่ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ทำให้ความชื้นสมดุลในเมล็ดลดต่ำลง ดังนั้น ในขณะที่เก็บเกี่ยวเมล็ดมากองสุ่มไว้ หากปล่อยให้ เกิดสมดุลเองโดยเมล็ดที่อยู่กองกลางไม่มีโอกาสสัมผัสกับอากาศภายนอก ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก ทำให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพ จึงควรลดความชื้นในเมล็ดให้เร็วที่สุดก่อนจะเกิดความเสียหายต่อความมีชีวิตและคุณภาพของเมล็ด

นอกจากนั้นเมล็ดที่ตากหรืออบจนแห้งดีแล้วจะมีความชื้นอยู่ประมาณ 8% สามารถเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาฟาเรนไฮต์หรือที่อุณหภูมิห้องได้อย่างปลอดภัย ในทางตรงข้าม เมล็ดที่มีความชื้นสูง จะเก็บรักษาไว้ให้มีชีวิตโดยไม่เสื่อมคุณภาพได้เฉพาะในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาฟาเรนไฮต์เท่านั้น จึงควรเก็บไว้ในห้องเย็นหรือตู้เย็น

เอกสารอ้างอิง

1. Asean-Canada Forest Tree Seed Centre. 1984. *Training Course on Forest Tree Seed Testing*. 17 Sep.-1 Oct. 1984. Muak Lek, Saraburi. Thailand.
2. Copeland, L.O. 1976. *Principles of Seed Science and Technology*. Burgess Publishing Comp. Minneapolis, Minnesota. U.S.A.

แก้คำผิด

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2532

คำผิด ว.วิทย์. มข.17(14) แก้เป็น ว.วิทย์. มข.17(4) ในหน้าชื่อเรื่อง

- ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- แพ้มหาวิทยาลัย
- สุริยุปราคา และจันทรุปราคาในปี พ.ศ.2533
- การดูแลสุขภาพแบบไม่มีลบลมคมใน
- โรคพิษสุราภัยกับปัจจัยทางพันธุกรรม
- การรวมตัวแบบเย็น

การศึกษาภาวะฮีโมโกลบิน อี ในประชากรเขต ทุรกันดารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

Study on Haemoglobin E in Poor Area Population of Northeast Thailand

* พรรณี ชโนรักษ์

** ถาวร สุภาพรม

*** กุลนภา ฟูเจริญ

**** สมพิศ โตตระกูล

บทคัดย่อ

ผลจากการตรวจสอบชนิดของฮีโมโกลบินในกลุ่มของประชากรไทยอีสาน ในถิ่นทุรกันดารในเขต 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 348 คน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2530 โดยวิธีการสุ่มเลือก ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มของประชากรในเขตจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนร้อยละของผู้มีฮีโมโกลบิน อี (ทั้งแบบ AE และ EE) เท่ากับ 23.603, 37.08 และ 36.84 ตามลำดับ และมีค่าความถี่ของตัวนำลักษณะ Hb E (gene frequency) เท่ากับ 0.139, 0.197 และ 0.214 ตามลำดับ การกระจายตัวของชนิดฮีโมโกลบินในประชากรที่ศึกษาอยู่ในภาวะสมดุล โดยความแปรปรวนของชนิดฮีโมโกลบินไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มประชากรทั้ง 3 จังหวัด

Abstract

Haemoglobin variants (haemoglobin E; Hb E) were determined in three poor area population groups from 348 persons of Northeast Thailand between May to June, 1987. Haemoglobin E comprised 23.60 percent in Khon Kaen, 37.08 percent in Mahasarakam and 36.84 percent in Roiet. Gene frequencies of Hb E in three provinces corresponded with 0.139, 0.197 and 0.214 respectively. The distribution of Hb E were in equilibrium, no statistically significant among the haemoglobin of three poor area population groups.

* รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** อาจารย์ ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**** พยาบาล กองโสตถกรรมแผนกทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ

บทนำ

ฮีโมโกลบิน (haemoglobin) เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเม็ดเลือดแดง (erythrocyte; red blood cell) ของคนและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูงทุกชนิด มีหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย โมเลกุลของฮีโมโกลบินประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนฮีม (haeme; heme) และส่วนที่เป็นโปรตีนโกลบิน (globin) ส่วนที่เป็นฮีมนั้น ประกอบไปด้วยโมเลกุลของเหล็ก และ porphyrin รวมกันเป็น ferroprotoporphyrin complex ส่วนโกลบินเป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน (amino acid) มาต่อกันเป็นสายโพลีเปปไทด์ (polypeptide) 1 โมเลกุลหรืออนุของฮีโมโกลบินประกอบด้วย globin chain ที่เหมือนกัน 2 คู่ เช่น Hb A ประกอบด้วย α -globin chain 2 เส้นและ β -globin chain 2 เส้นแต่ละเส้นจะมีฮีมจับอยู่ 1 ตัว การสร้างฮีโมโกลบินในคนนั้น จะสัมพันธ์กับขั้นตอนของการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นตัวอ่อน (embryo) ทารก (foetus) และวัยผู้ใหญ่ (adult)

ยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินในคนมีอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่ม α -like globin gene cluster มีตำแหน่งอยู่บนแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 16 ประกอบด้วยยีน α (α)-globin และ Zeta (ζ)-globin ซึ่งจะควบคุมการสร้าง α -globin chain และ ζ -globin chain ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 141 ตัว กลุ่มที่ 2 เป็น β -like globin gene cluster มีตำแหน่งอยู่บนแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 11 ประกอบด้วยยีน beta (β)-globin, delta (δ)-globin, gamma (γ)-globin และ epsilon (ϵ)-globin จะควบคุมการสร้างโปรตีนโกลบินชนิดเบต้า, เดลต้า, แกมมาและเอปซิลอนตามลำดับที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 146 ตัว

ในเม็ดเลือดแดงของผู้ใหญ่ปกติจะพบฮีโมโกลบินอยู่ 3 ชนิดดังนี้ Hb A ($\alpha_2\beta_2$) มีประมาณ 97%, Hb A₂ ($\alpha_2\delta_2$) ประมาณ 2.5%, และ Hb F ($\alpha_2\gamma_2$) ประมาณน้อยกว่า 1% ซึ่งจะเห็นว่าฮีโมโกลบินที่สังเคราะห์ขึ้นส่วนใหญ่เป็น Hb A ดังนั้นโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่สำคัญในวัยผู้ใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการสังเคราะห์สาย α -และ β -globin chain.

ฮีโมโกลบินผิดปกติตัวแรกที่ถูกค้นพบและรายงานไว้คือ Hb S (S ย่อมาจาก sickle) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 โดยคณะวิจัยของ Pauling ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า Hb S นั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์แตกต่างไปจาก Hb A ต่อมาในปี ค.ศ.1957 Ingram ก็ค้นพบว่า Hb S มีกรดอะมิโนตัวที่ 6 ของสายเบต้าโกลบินเปลี่ยนจาก glutamic acid เป็น valine (Hb S; $\alpha_2\beta_2^{6\text{Glu} \rightarrow \text{Val}}$) จึงทำให้โครงสร้างของอนุพันธ์เปลี่ยนไปโดยเม็ดเลือดแดงของคนไข้พวกนี้จะมีลักษณะคล้ายรูปเคียว (sickle cell) นับตั้งแต่นั้นมาก็มีการค้นพบฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย จนปัจจุบันนี้มีรายงานไว้ถึง 420 ชนิด (สัทศน์และปราณี, 2528) เป็นความผิดปกติที่พบที่สาย α -globin chain 126 ชนิด, สาย β -globin chain 215 ชนิด และที่เหลือนอกนั้นก็พบที่สายโกลบินชนิดอื่น ๆ ฮีโมโกลบินผิดปกติจะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพราะความผิดปกติดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตัวนำลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีน (gene) ที่ได้รับมาจากพ่อแม่ ดังนั้นอุบัติการณ์การเกิดหรือโอกาสที่จะพบฮีโมโกลบินผิดปกติเหล่านี้จึงแตกต่างกันในประชากรที่มีเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันเช่น Hb S พบมากในเผ่าพันธุ์ของนิโกรแถบอาฟริกากลาง Hb C;

$\alpha_2\beta_2^{6\text{Glu} \rightarrow \text{Lys}}$ พบมากในแถบประเทศ west coast of Africa, Hb D-punjab; $\alpha_2\beta_2^{121\text{Glu} \rightarrow \text{Gln}}$ พบมากในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและ Hb E; $\alpha_2\beta_2^{26\text{Glu} \rightarrow \text{Lys}}$ พบมากในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Na-Nakorn, 1956) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตบริเวณชายแดนที่ติดต่อกันระหว่างประเทศไทย-ลาว -เขมร ที่เราเรียกว่า Hb E Triangle จะพบอุบัติการณ์ของฮีโมโกลบินอีสูงมาก (Na-Nakorn and Wasi, 1979) ความผิดปกติในอนุของฮีโมโกลบินที่ทำให้เกิด Hb E ก็คือ ในสายเบต้าโกลบิน (beta globin) กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 26 เปลี่ยนจากการดกลูตามิก (glutamic acid) ไปเป็นไลซีน (lysine) โดยปกติคนที่ เป็น Hb E ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายแต่อย่างใด ยกเว้น Hb E ไปเกิดเป็น heterozygote ร่วมกับ β -thalassemia เป็น β -thalassemia/Hb E ถึงจะเกิดเป็นโรคที่มีอาการรุนแรง

ประเทศไทยนับเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของโลกที่พบอุบัติการณ์ฮีโมโกลบิน อี (haemoglobin E; Hb E) และโรคธาลัสซีเมีย (thalassemia) สูง มีคนไทยประมาณ 20 ล้านคนเป็น "พาหะ" (carrier) ของโรคธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้พบมากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิจารณ์, 2524) ดังนั้นการศึกษาภาวะฮีโมโกลบินอีในประชากรเขตทูลเกล้าของ ไทยครั้งนี้จึงมีความสำคัญในแง่ของการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างทางกรรมพันธุ์ของประชากรดังกล่าว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทางด้านสาธารณสุขมูลฐานต่อไปในอนาคต

ในการรายงานครั้งนี้ คณะวิจัยขอเสนอภาวะการฮีโมโกลบินอี ในกลุ่มประชากรเขตทูลเกล้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 348 คน ทำการศึกษาในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2530

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

ผู้ถูกทดสอบทั้งหมดเป็นนักเรียนและชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตทูลเกล้าของ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คือ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 348 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนและชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านโนนเขาว, บ้านบึงสว่าง บ้านหนองบัว ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จำนวน 126 คน

กลุ่มที่ 2 เป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านโนนเหลื่อม ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 89 คน

กลุ่มที่ 3 เป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านโนนจาน ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 133 คน

เลือดที่ได้จากการเจาะจะถูกเก็บไว้ใน EDTA (ethylene diamine tetra acetate) bottle (5 ml) ที่ปิดฝาให้แน่นและแช่อยู่ในภาชนะที่มีอุณหภูมิ 2-8 °C จากนั้นนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาชนิดของฮีโมโกลบินที่ผิดปกติได้ใช้เทคนิค starch gel electrophoresis tris-EDTA-borate buffer pH 8.6 (กุลณภา, 2529)

ผลการศึกษา

การกระจายของชนิดฮีโมโกลบินที่พบในประชากรถิ่นทุรกันดารของ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของฮีโมโกลบินและเปอร์เซ็นต์ที่พบในประชากรทั้ง 3 กลุ่ม

ประชากรที่ใช้ศึกษา	ชนิดของฮีโมโกลบิน					
	AA		AE		EE	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
กลุ่มที่ 1	95	75.397	27	21.428	4	3.175
กลุ่มที่ 2	56	62.92	31	34.83	2	2.247
กลุ่มที่ 3	84	63.41	41	30.83	8	6.01

ตารางที่ 2 แสดงการกระจายของชนิดฮีโมโกลบินและการเบี่ยงเบนออกจากอัตราส่วนคาดคะเนเมื่อประชากรสมดุล

ประชากรที่ใช้ศึกษา		จำนวนชนิดของฮีโมโกลบิน			ค่าความถี่ของ ยีน Hb E	χ^2 (2,0.05) P	
		AA	AE	EE			
กลุ่มที่ 1	ค่าสังเกต	95	27	4	0.139	1.364	$P > 0.500^{2/}$
	(ค่าคาดคะเน) ^{1/}	93.45	30.16	2.44			
กลุ่มที่ 2	ค่าสังเกต	56	31	2	0.197	1.309	$P > 0.500^{2/}$
	(ค่าคาดคะเน) ^{1/}	59.12	26.84	3.05			
กลุ่มที่ 3	ค่าสังเกต	84	41	8	0.214	0.952	$P > 0.500^{2/}$
	(ค่าคาดคะเน) ^{1/}	82.17	44.47	6.09			

หมายเหตุ

1/ คาดคะเนความถี่ของ AA, AE และ EE ตามกฎของ Hardy & Weinberg เมื่อ P เป็นความถี่ของ A และ q เป็นความถี่ของ E ความถี่ของคู่แสดงลักษณะ AA, AE และ EE เท่ากับ p^2 , $2pq$ และ q^2 ตามลำดับ

2/ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ


สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา

จากการศึกษาครั้งนี้พบฮีโมโกลบินที่ผิดปกติเพียงชนิดเดียวคือ Hb E ซึ่งพบเพียง 2 รูปแบบ คือ สภาวะที่เป็น heterozygote ร่วมกับ Hb A(AE), สภาวะ homozygote (EE) คิดเป็นร้อยละของผู้มี Hb E (ทั้งที่เป็นแบบ AE และ EE) ในกลุ่มประชากรไทยอีสานในถิ่นทุรกันดารที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัด

ขอนแก่นเท่ากับ 23.603, ในเขตจังหวัดมหาสารคามเท่ากับ 37.08 และในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเท่ากับ 36.84 และค่าความถี่ของตัวนำลักษณะ Hb E ที่คาดคะเนตามกฎของ Hardy & Weinberg เท่ากับ 0.139 ในกลุ่มประชากรที่ 1, เท่ากับ 0.197 ในกลุ่มประชากรที่ 2, เท่ากับ 0.214 ในกลุ่มประชากรที่ 3 และจากการทดสอบโดยใช้ "ไคสแควร์" ของชนิดฮีโมโกลบินในประชากรกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 พบว่าค่าที่เบี่ยงเบนไปจากสัดส่วนที่คาดคะเนนั้นเป็นไปได้โดยโอกาสเท่านั้น ความแตกต่างดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวอย่างของประชากรที่สุ่มมานั้นเป็นตัวแทนของประชากรที่อยู่ในสมดุล

จากผลการศึกษาครั้งนี้ฐานะทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการกระจายตัวของยีน Hb E เมื่อเปรียบเทียบกับที่มีผู้รายงานไว้แล้ว (Wasi และคณะ, 1967; นเรศร์ และคณะ, 2526) อุบัติการณ์ของฮีโมโกลบิน อี ในประชากรไทยมีสูงมาก มีผู้คาดคะเนว่ามีคนไทยประมาณ 7 ล้านคนที่เป็น "พาหะ" ของยีน Hb E (วิจารณ์, 2524) ซึ่งข้อดีหรือข้อได้เปรียบ (fitness) ของยีน Hb E ที่ทำให้มีการกระจายที่สูงนี้ยังไม่มีใครทราบหรืออธิบายได้ จากการรายงานของ Na-Nakorn และคณะในปี ค.ศ.1956 ที่ศึกษาการต่อต้านมาลาเรียของฮีโมโกลบิน อี ก็พบว่า ไม่แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงการต่อต้านมาลาเรียเหมือนเช่นใน Hb S และมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มี Hb E อาจจะมีข้อได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มี Hb E ในบางเรื่องอย่างเช่น ความอดทน, ความขยันขันแข็ง หรือการมีอายุยืนยาวก็ได้ (วิจารณ์, 2524) อย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน

ในการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยได้ศึกษาแบบแผน (pattern) ของลักษณะการถ่ายทอดยีน Hb E ในครอบครัวหนึ่งที่เป็น Hb E ทั้งตระกูล ดังได้อะแกรมที่ 1



รูปที่ 1 แสดง Genetic representation ในครอบครัวที่มีฮีนของฮีโมโกลบิน อี

ตารางที่ 3 แสดงการกระจายของ Hb E ในประชากรไทยแหล่งต่างๆ (ดัดแปลงจาก นเรศร์ และคณะ (2525))

ประชากร	จำนวนที่ศึกษา	ร้อยละของผู้มี Hb E	คณะผู้ศึกษา
ไทย			
อุบลราชธานี	565	44.60	Wasi et al (1967)
ขอนแก่น	150	43.33	" "
อุดรธานี	315	36.83	" "
เชื้อชาติจีนแท้	213	0	Na-Nakorn et al (1956)
เชื้อชาติไทยหรือไทย-จีน	1,006	13.6	" "
ภาคกลาง	554	13.3	" "
ภาคเหนือ	99	8.0	" "
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	49	32.7	" "
ภาคตะวันออกเฉียงใต้	48	18.7	" "
ภาคใต้	126	12.7	" "
สุรินทร์	-	53*	อ้างตาม Na-Nakorn & Wasi (1978)
ไทยอีสาน	38	26.3	นเรศร์ และคณะ (2525)
ไทยดำ	132	20.5	นเรศร์ และคณะ (2525)
ไทยโซ่แท้	402	72.14*	นเรศร์ และคณะ (2527)
ลูกครึ่งไทยโซ่	52	51.92*	นเรศร์ และคณะ (2527)
ผู้ไทย	388	42.78	Sriboonlue et al (1983)
คนป่า เผ่าผิวดองเหลือง	16	18.75	พรรณี และคณะ (2527)
ขอนแก่น	126	23.61	รายงานปัจจุบัน
มหาสารคาม	88	37.08	รายงานปัจจุบัน
ร้อยเอ็ด	133	36.84	รายงานปัจจุบัน
ลาว			
หลวงพระบาง-เวียงจันทน์	-	17-27	อ้างตาม Na-Nakorn & Wasi (1978)
โกลีเขมร	-	48*	" "
เขมร			
กำปงธม	-	6-9	อ้างตาม Na-Nakorn & Wasi (1978)
สดรงเตรง (โกลีลาว)	-	44-61*	" "
อินโดนีเซีย	500	3.6	Eng (1955)
ศรีลังกา	9	22.6	Graff et al (1955)

*บริเวณที่พบอุบัติการณ์ของฮีโมโกลบิน อี สูง

จากตารางที่ 3 เมื่อนำข้อมูลที่ศึกษาในประชากรที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่รายงานโดย Wasi และคณะ 1967 มาเปรียบเทียบกับรายงานของคณะวิจัยครั้งนี้พบว่าค่าร้อยละของ Hb E ที่ได้แตกต่างกัน ความแตกต่างนี้น่าจะเกิดจากการสุ่มตัวอย่างและจำนวนประชากรที่ใช้ศึกษามากกว่ามาจาก

สาเหตุอื่น และเมื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์ของฮีโมโกลบิน อี ที่พบในประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นว่าบริเวณที่มีอุบัติการณ์ของฮีโมโกลบิน อี สูง (*) จะเป็นบริเวณชายแดนที่เป็นรอยต่อระหว่างไทย, ลาว และเขมร ซึ่งเราเรียกว่า "Hb E Triangle" บริเวณนี้มีผู้ตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะเป็นจุดหรือแหล่งกำเนิดของฮีโมโกลบิน อี อย่างไรก็ตามสมมุติฐานนี้ยังต้องอาศัยข้อมูลและหลักฐานมาสนับสนุนอีกมาก นเรศร์และคณะในปี พ.ศ.2525 ได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนสมมุติฐานนี้เมื่อศึกษาอุบัติการณ์ของฮีโมโกลบินอีในชาวไทยดำ และนอกจากนั้นในปี พ.ศ.2527 นเรศร์และคณะก็ได้รายงานอุบัติการณ์ของฮีโมโกลบินอี ในชนกลุ่มน้อยชาวไทยโซ่ได้ถึงร้อยละ 72.14 นับเป็นรายงานที่พบอุบัติการณ์ฮีโมโกลบิน อี ที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานไว้

ความสำคัญของความถี่ของฮีโมโกลบิน อี ที่พบสูงในประชากรไทยนี้ ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการกระจายตัวของโรคธาลัสซีเมียค่อนข้างสูงดังได้กล่าวมาในข้างต้น เมื่อความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมียมาเกิดร่วมกับความผิดปกติที่ทำให้เกิดฮีโมโกลบิน อี แล้วจะก่อให้เกิดอาการของโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหลาย ๆ อย่างและส่งผลต่อไปในแง่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้อันหนึ่งก็คือ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ครอบครัวที่เราพบว่าเป็นโรคโลหิตจางอันเนื่องมาจากภาวะทุโภชนาการ ซึ่งเราพบอยู่เป็นจำนวนมากขอแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่คณะวิจัยได้ให้คำแนะนำจึงคิดว่ามีประโยชน์มากต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มที่เราศึกษาในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ โครงการวิจัย TOBAN N.E. THAI PROJECT ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยวิเคราะห์ผลหาชนิดของฮีโมโกลบินผิดปกติ ขอขอบคุณ คุณสุนันท์ อินท่าไม้ เจ้าหน้าที่พยาบาล ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ (กทม.) ที่ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างเลือด และคุณสัมพันธ์ คุณสุข, คุณอารีย์ วัฒนพงศ์ชาติ, คุณสุรพล เกษะเรียนอุดม, คุณพีระพงษ์ วัฒนนะ, คุณนิสภัทร์ พุทธผลที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุก ๆ คน ที่ให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

กุลณา พุเจริญ (2529). **คู่มือทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการวินิจฉัย ธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติ**. ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-35.
นเรศร์ มุลาลี, สมทรง ทรงศิลป์, เบดดี เอ. สอลาเดย์, กฤตยา กองสุวรรณ และศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ (2525). **โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร**

ย่อยในไทย. ภาค 1 ไทยดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1-63 หน้า.

นเรศร์ มุลาลี พจน์ บุญลือ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, อุดมศักดิ์ มหาวีระวัฒน์, สิ้นทร ศีลา และศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ (2527). "อุบัติการณ์ของ Hb E ในกลุ่มประชากรไทยใต้ในประเทศไทย" **รายงานวิจัยเรื่อง ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ภาค 3 : ใต้** คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 59-66.

- พรรณี ชีโนรักษ์, มุกดา ญัฐสมบูรณ์ และสมิตรา คงชื่นสิน (2527). "การสำรวจลักษณะพันธุกรรมบางอย่างในคนป่าเผ่าผิวดองเหลือง" **จุลสารพันธุศาสตร์**. 3(2):18-22.
- วิจารณ์ พานิช (2524). ธาลัสซีเมียโรคพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย. **ใกล้หมอ**. 5:5-7:23-34.
- สุทัศน์ ฟูเจริญและปราณี ฟูเจริญ (วินิจจะกุล) (2528). กลุ่มโรค Thalassaemia และ Haemoglobin ที่สังเคราะห์ผิดปกติ. ใน: ถนอมศรี ศรีชัยกุล, วิชัย อติชาติการ, และแสงสุรีย์ จูหา **คู่มือโลหิตวิทยา เล่ม 1 การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย**. สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร. 130-176 หน้า.
- Chernoff A. I., Minnich S., Na-Nakorn S., Tuchinds S., Kashemant C. and R. chernoff (1956). Studies on Haemoglobin E I. Clinical, Haematological and Genetic Characteristics of the Hb E Syndromes, *J. Lab. & Clin. Med.* 47(3):455-489.
- Eng L. i. (1955). Haemoglobin E in Indonesia. *Nature*. 176:469-470.
- Fucharoen (Winichagoon) P. and S. Fucharoen (1986). Molecular Mechanism of Thalassemia in Thailand. *J. Sci. Soc. Thailand*. 12:9-21.
- Graff J. A. E., Ikin E.W., Lehmann H., Mourant A. E., Parkin D.M., and Wickremasinghe R.L. (1955). Haemoglobin E and Blood Groups in the Veddas. *J. Physio*. 127:41p.
- Ingram V., M. (1957). Gene Mutation in Human Haemoglobin : The Chemical difference between normal and Sickle cell anemia. *Nature* 130: 326-328.
- Na-Nakorn S., Minnich V., and A.I. Chernoff (1956). Studies on Haemoglobin E II. The Incidence of Haemoglobin E in Thailand. *J. Lab. & Clin. Med.* 47(3):490-498.
- Na-Nakorn S., and P. Wasi (1978). Distribution of Haemoglobin E Triangle in Southeast Asia. *J. Med. Ass. Thailand*. 61(1):65.
- Sriboonlue, P., Mularlee, N., Prasongwatana, V., Prasong-watana, J., Sanchaisuriya, P., Moonamard, S, and S. Sao wakon tha (1983) Haemoglobin E frequencies of the Eth groups in Thailand. รายงานการวิจัย เรื่อง **ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ภาค 2 ผู้ไทย** คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 77-83 หน้า.
- Wasi P. (1978). Thalassemia syndrome in Thailand. *J. Med. Ass. Thailand* 61(1):49.
- Wasi P., Pootrakul P., Pravattmung P., Winichagoon P., and S. Fucharoen. (1980). Thalassemia in Thailand. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* 344:352-363.
- Wasi P., Na-Nakorn S. and A. Suingdumrong (1967). Studies on the Distribution of Haemoglobin E, Thalassemias and Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency in Northeastern Thailand. 214:501.

Science is a great help to seeker after Truth.....

Gandhi

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณวิตามินซี กับความเปรี้ยวของผลไม้และผักพื้นเมือง

ดาวัลย์ บุญยะรัตน์*

บทคัดย่อ

การหาปริมาณวิตามินซี ในผลไม้และผักพื้นเมืองอีสาน ทำได้โดยการนำผักหรือผลไม้มาไตเตรตด้วย 1% 2,6-ไดคลอโรฟีนอลอินโดฟีนอล สำหรับการหาจำนวนกรดใช้ 0.2 N NaOH ไตเตรตจน pH เป็นกลาง (=7) จุดประสงค์ ในการทำวิจัยเรื่องนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณวิตามินซี กับจำนวนกรดหรือความเปรี้ยวของผลไม้และผัก และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวิตามินซี กับจำนวนกรดเป็นกรัมต่อ 100 กรัมของกรดซิตริกของผลไม้หรือ ผักจะมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย

Abstract

The determination of vitamin C in local vegetables and fruits was done by titration with 1% 2,6-dichlorophenolindophenol. The determination of acid was done by titration with 0.2 N NaOH.

This study aims to find the correlation between vitamin C and acid in local vegetables and fruits and it is found that the amount of vitamin C and acid are not correlative.

บทนำ

วิตามินซี สิ่งธรรมดาที่เราคุ้นเคยจนบางครั้ง ลืมนึกถึงความสำคัญได้ แท้จริงแล้ววิตามินซีมี บทบาทสำคัญต่อการดำรงชีพอย่างมาก Linus Pauling นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เคยได้รับ รางวัลโนเบล สาขาเคมีถึง 2 ครั้ง ได้กล่าวว่า วิตามินซีนอกจากจะป้องกันโรคโลหิตจางแล้ว ยังสามารถรักษาอาการหวัดได้ Pauling ได้แนะนำ ว่าคนปกติควรจะได้รับวิตามินซีเพื่อป้องกันหวัด

วันละอย่างน้อย 1 กรัม แต่สำหรับคนที่กำลัง เป็นหวัดควรจะได้รับวิตามินซีครั้งละ 1 กรัม ทุกๆ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งอาการหวัดหายไปจึง ค่อยลดปริมาณลงเหลือวันละ 1 กรัม ตามเดิม Dr. Albert S. Turgey นักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับ รางวัลโนเบลจากการค้นพบวิตามินซีในสัตว์ได้ กล่าวว่าวิตามินซีเป็นสารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สำหรับอาการแพ้วิตามินซีปริมาณสูงที่ได้พบแล้ว

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คือ อาการท้องเสีย และยังไม่มีพบอาการที่มากกว่านี้เลย

หลังจากนั้นอีก 3 ปีต่อมา Prof.C.Wilson และนายแพทย์ R.Cathcart ได้สนับสนุนข้อคิดของ Pauling ในการใช้วิตามินซีรักษาโรคหัวใจ

ในปี 1977 A.Hanck และ G.Ritzel ได้เขียนหนังสือรายงานการวิจัยเกี่ยวกับวิตามินซีในการประชุมที่ประเทศบราซิลโดยนักวิจัยทั่วโลก และที่ประชุมได้สรุปว่า วิตามินซีปริมาณสูงจะป้องกันหัวใจได้

ต่อมา Pauling และนายแพทย์ Carmeron ได้ทำการวิจัยร่วมกันและพบว่าปริมาณวิตามินซีสูง (10 กรัมต่อวัน) มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง เขาพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีปริมาณวิตามินซีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ฉะนั้นร่างกายของคนจึงต้องการวิตามินซีมาก ๆ เพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็งและพบว่าวิตามินซี 10 กรัมต่อวัน จะยืดอายุผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ 3 เท่า และ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยนี้ วิตามินซีสามารถยืดอายุได้ถึง 20 เท่า

นอกจากนี้ Ginter นักชีวเคมีชาวเชโกสโลวาเกียและคณะ ได้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับวิตามินซีสามารถลดระดับซีรัมคอเลสเตอรอลได้ทั้งนี้เพราะคอเลสเตอรอลเมื่อรวมกับวิตามินซีสามารถละลายน้ำได้ จากข้อมูลของ Ginter พบว่าในผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 40 ปี ถ้าได้รับวิตามินซีติดต่อกัน 47 วัน จะมีระดับคอเลสเตอรอลลดลง 10 เปอร์เซ็นต์

วิตามินซีกับสารไนโตรซามีนก็ได้รับความสนใจเช่นกันเพราะวิตามินซีสามารถทำปฏิกิริยากับสารไนเตรตแล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบอื่นที่ไม่ใช่ไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดโรคมะเร็งในปอด, ในตับ หรือในกระเพาะปัสสาวะ

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ 1 ซอง จะได้รับไนโตรซามีน 0.8 มิลลิกรัม หรือหมูเบคอน 4 ชิ้น จะมีไนโตรซามีน 5.5 มิลลิกรัม

อย่างไรก็ตามวิตามินซีเป็นที่น่าสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ในการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากไวรัส ฉะนั้นท่านที่เข้าใจความสำคัญของวิตามินซีแล้ว ควรจะได้ทราบแหล่งวิตามินซีบ้าง หลายคนอาจเข้าใจว่า ถ้าต้องการรับประทานวิตามินซีจะต้องรับประทานผลไม้เปรี้ยวเพื่อความกระจ่าง ผู้เขียนได้ทำการหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้และผักพื้นเมืองพร้อมทั้งเปรียบเทียบปริมาณกรดด้วย

จุดประสงค์

- เพื่อหาปริมาณวิตามินซี และจำนวนกรดในผลไม้และผักโดยจะเน้นผลไม้และผักที่ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมบริโภค

- เพื่อศึกษาว่าปริมาณวิตามินซีมีความสัมพันธ์กับจำนวนกรดหรือความเปรี้ยวอย่างไร

วิธีการทดลอง

การหาปริมาณวิตามินซีใช้วิธีของเบสซี (Bessey mothod) โดยการนำผลไม้หรือผัก (บดให้ละเอียดถ้าจำเป็น) ละลายใน 4% metaphosphate กรอง นำน้ำกรองซึ่งเก็บจากช่องเหลวที่ผ่านกระดาษกรอง มาไตเตรตด้วย 1% 2,6-dichlorophenolindophenol จนกระทั่งเกิดเป็นสีชมพูอ่อนอยู่นานอย่างน้อย 15 วินาที คำนวนหาปริมาณวิตามินซีเป็นมิลลิกรัมของวิตามินซีต่อ 100 มิลลิลิตร หรือ 100 กรัมของผักผลไม้ โดยการเปรียบเทียบกับค่าวิตามินซีมาตรฐาน สำหรับการหาปริมาณกรดในผักผลไม้ไตเตรตด้วย 0.2 N NaOH จน pH เป็นกลาง (=7) และจากปริมาตร

ที่ใช้สามารถคำนวณปริมาณของกรดเป็นกรัมเทียบ 10 มิลลิลิตร

กับ % ของกรดซิดริก

$$\text{ปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัม / 100 กรัม)} = \frac{0.02 \times (T-B) \times 100}{S-B}$$

B = ปริมาณ 0.1% 2,6-dichlorophenol-indophenol ที่ใช้ในการไตเตรตกับ 4% metaphosphate

S = ปริมาณ 0.1% 2,6-dichlorophenol-indophenol ที่ใช้ในการไตเตรตกับวิตามินซี

T = ปริมาณ 0.1% ของ 2,6-dichlorophenol-indophenol ที่ใช้ในการไตเตรตกับสารตัวอย่างมาตรฐาน (0.02 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

ผลการทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 1, 2 และ 3

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณวิตามินซีและจำนวนกรดในผลไม้ที่ใช้น้ำหนักเริ่มต้น 5 กรัม

ชนิดของผลไม้	ปริมาณวิตามินซี มิลลิกรัม/100 กรัมของผลไม้	pH	จำนวนกรดเป็นกรัมเทียบกับ % กรดซิดริก
1. มะขามเทศ	436	5.1	0.75
2. มะละกอ	212	6.3	0.10
3. กัลยน้ำว้า	50	4.8	1.00
4. ละมุด	48	5.8	0.20
5. มันแกว	47	6.1	0.08
6. กัลยไข่	36	5.5	0.69
7. พุดทรา	24	5.6	0.26
8. แตงโม	23	5.8	0.12
9. องุ่น	22	4.1	2.36
10. กัลยหอม	11	5.0	1.02
11. ฝรั่งหวาน	9	4.3	1.25
12. สับปะรด	5	4.9	0.77
13. พุดทราไข่	3	5.6	0.26
14. ชมพู	2	4.3	0.74
15. สาลี่	1	4.2	0.68
16. เนื้อมะพร้าว	0	6.9	0.02
17. แอปเปิ้ล	0	4.2	0.96
	$\Sigma x = 927$		$\Sigma y = 11.24$

$$\Sigma x^2 = 245,145$$

$$\Sigma xy = 521.64$$

$$\Sigma y^2 = 12.959$$

$$n = 17$$

$$\text{ค่าความสัมพันธ์ทางสถิติ (w)} = \frac{\Sigma xy - \frac{(\Sigma x)(\Sigma y)}{n}}{\sqrt{[\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}][\Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n}]}}$$

$$= -0.0886$$

ค่าความสัมพันธ์ทางสถิติเข้าใกล้ 0 แสดงว่าปริมาณของวิตามิน ซี มีความสัมพันธ์กับปริมาณกรดน้อยมาก

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณวิตามินซีและจำนวนกรดในผลไม้ที่ใช้ปริมาตร เริ่มต้น 1 มล.

ชนิดของผลไม้	ปริมาณวิตามินซี มิลลิกรัม/100 กรัมของผลไม้	pH	จำนวนกรดเป็นกรัมเทียบกับ % กรดซิตริก
1. ส้มโอ	833	4.6	1.6
2. ส้มเขียว	425	5.9	0.28
3. ส้มเขียวหวาน	213	5.4	0.34
4. มะนาว	213	3.2	22.95
5. น้ำมะพร้าว	0	5.8	0.09
n=5	$\Sigma x = 1,684$ $\Sigma x^2 = 966,133$		$\Sigma y = 25.26$ $\Sigma y^2 = 529.25$

$$\Sigma xy = 6435.78$$

$$w = -0.1643$$

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณวิตามินซีและจำนวนกรดในผักที่ใช้น้ำหนักเริ่มต้น 5 กรัม

ชนิดของผัก	ปริมาณวิตามินซี มิลลิกรัม/100 กรัมของผัก	pH	จำนวนกรดเป็นกรัมเทียบกับ % กรดซิตริก
ผักล่าย	172	5.8	0.44
ผักชีลาว	153	6.1	0.37
ต้นตาลปัตรฤกษี	71	5.4	0.43
ดอกกะหล่ำ	68	6.4	0.17
ผักปิง	59	5.7	0.33
ผักกั้นฉ่าย	48	6.0	0.20
มะกอก	46	2.9	10.14
ถั่วลิสงเตา	39	6.0	0.28
มะเขือเทศ	23.7	12.6	0.97
ถั่วฝักยาว	20.7	5.5	0.33
ผักชี	20.7	5.8	0.35
ผักตั้งโอ้	12.3	6.1	0.18
ดอกหอม	10.3	5.8	0.24
ขี้หว่า	8.5	5.9	0.42
ต้นหอม	8.0	5.8	0.12
ผักเม็ก	0	3.4	3.07
กระชาย	0	6.2	0.32
ผักบุ้ง	0	6.9	0.03
ผักแมงลัก	0	6.1	0.44
ใบบัวบก	0	5.6	0.55
ผักสะระแหน่	0	6.6	0.24
โหระพา	0	6.3	0.35
หอมแดง	0	5.6	0.24
ใบมะกรูด	0	5.8	0.44
ผักกระโดน	0	5.7	0.8
ใบกระเพรา	0	6.4	0.30
ต้นกระสังข์	0	5.7	1.2
ผักต้ว	0	3.5	6.5

n	= 28
Σx	= 760
Σx^2	= 73,984
Σy	= 29.5
Σy^2	= 100.227
Σxy	= 724.33
W	= -0.0294

ค่า w หรือค่าความสัมพันธ์ทางสถิติของผัก ก็เช่นเดียวกับผลไม้ พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณวิตามินซี มีความสัมพันธ์น้อยมากกับ ปริมาณกรด

สรุป

หากดูความสัมพันธ์ทางสถิติจะพบว่าค่า ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวิตามินซีกับจำนวน กรดเป็นกรัมต่อ 100 กรัมของกรดซิตริกของ ผลไม้หรือผักจะมีความสัมพันธ์กันน้อยมากหรือ อาจไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

กล่าวโดยสรุป ผักหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ไม่จำเป็นต้องมีปริมาณวิตามินซีมาก เช่น มะนาว เปรี้ยวมากแต่มีปริมาณวิตามินซีน้อยกว่าส้มโอ

หรือผลไม้ที่มีวิตามินซีมาก เช่น มะขามเทศจะมี จำนวนกรดน้อยกว่าองุ่นซึ่งมีปริมาณวิตามินซี น้อย

และการที่ใช้กรดซิตริกเป็นหน่วยเปรียบ เทียบก็เพราะผลไม้ส่วนใหญ่มีปริมาณของกรด ซิตริกเป็นองค์ประกอบอยู่มาก แต่ทั้งนี้ผลไม้ บางชนิดอาจไม่มีกรดซิตริกเป็นองค์ประกอบก็ได้

บรรณานุกรม

- Cameron, E. and L. Pauling, 1973. Ascorbic acid and the glycosaminoglycan, *Oncology* 27:181.
Cameron, E., Pauling, L. and B. Leibowitz, 1979. *Cancer Research*, 39:663-668.
Cathcart, R. 1978. *Chem. Tech.* 8:76.
Ginter, E. 1973. *Science*. 179:702.



"I see you adding calcium nitrate. . . I see you adding sodium sulfate. . .
And, ka-boom. . . I see it blowing up in your face."

การเปรียบเทียบความสามารถในการทน ต่อความเค็มระหว่างออสซิลลาทอเรีย (*Oscillatoria* sp.) และสไปรูลีนา (*Spirulina* sp.)

Comparison of Salt Tolerance Between *Oscillatoria* sp. and *Spirulina* sp.

สมนทิพย์ บุนนาค*
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์*

บทคัดย่อ

จากการศึกษาความสามารถในการทนต่อความเค็มของออสซิลลาทอเรีย (*Oscillatoria* sp.) และ สไปรูลีนา (*Spirulina* sp.) โดยเลี้ยงสาหร่ายทั้งสองชนิดในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 และ 40 ppt. ผลการทดลองพบว่าระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่สูงที่สุดที่ออสซิลลาทอเรียสามารถทนได้เท่ากับ 28 ppt. (ค่าการนำไฟฟ้า 29.0 mmho./cm.) จัดเป็นความเค็มระดับเค็มจัดและความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของออสซิลลาทอเรียเท่ากับ 2 ppt. (ค่าการนำไฟฟ้า 2.2 mmho./cm.) จัดเป็นความเค็มระดับเค็มน้อย สำหรับสไปรูลีนา นั้น จากการทดลองพบว่าระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ที่สูงที่สุดที่สไปรูลีนาสามารถทนได้เท่ากับ 16 ppt. (ค่าการนำไฟฟ้า 17.0 mmho./cm.) จัดเป็นความเค็มระดับเค็มจัดและความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสไปรูลีนาเท่ากับ 2. ppt. เช่นเดียวกัน

Abstract

The experiments were carried out by culturing *Oscillatoria* sp. and *Spirulina* sp. on Modified Allen's medium consisting sodium chloride concentrations : 0,2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 and 40 ppt. (W/V.). The results showed that *Oscillatoria* sp. could tolerate the maximal salt concentration at 28 ppt. (electrical conductivity was 29.0 mmho./cm.) and the optimal salt concentration was 2 ppt. (electrical conductivity was 2.2 mmho./cm.) For those of *Spirulina* sp. the maximal salt concentration was 16 ppt. (electrical conductivity was 17.0 mmho./cm.) and the optimal salt concentration was 2 ppt. either.

คำนำ

เมื่อพูดถึงอีสาน คนส่วนใหญ่จะนึกถึงความแห้งแล้งและสภาพของดินเค็มที่เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ จากการสำรวจพื้นที่ดินเค็มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณหนึ่ง

* อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ประมาณ 106 ล้านไร่และพบว่าประมาณ 17.8 ล้านไร่ มีสภาพดินเค็ม และมีความเค็มอยู่ระหว่าง 2-16 มิลลิโมล/ชม. (เพิ่มพูน กิรติกสิกร, 2527, กองบริรักษ์ที่ดิน, 2527, ชัยทัศน์ ไพรินทร์, 2526) ในขณะที่พืชหลายชนิดมีปัญหา คือ ไม่สามารถขึ้นได้หรือขึ้นได้แต่ไม่ค่อยเจริญเติบโต แต่พบว่าสาหร่ายสไปรูลินา (*Spirulina* sp.) มักเรียกกันว่าสาหร่ายเกลียวทองและออสซิลลาทอเรีย (*Oscillatoria* sp.) สามารถเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความเค็มได้ แสดงว่าสาหร่ายทั้งสองตัวนี้สามารถทนต่อความเค็มของเกลือในแหล่งน้ำนั้นๆ ได้ แต่ก็ยังเป็นที่ยสงสัยว่าสาหร่ายตัวใดจะสามารถทนต่อความเค็มได้ดีกว่ากันและการเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้งสองในความเค็มระดับต่างๆ กัน จะแตกต่างกันหรือไม่

ในปัจจุบันการนำสาหร่ายมาผลิตเป็นโปรตีนเซลล์เดี่ยว (SCP) ได้รับความสนใจมาก เมื่อองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Protein Advisory Group ขึ้นในปี ค.ศ.1955 (Kumnuanta, 1978) เพื่อหาโปรตีนแหล่งใหม่สำหรับมนุษย์

สไปรูลินาเป็นสาหร่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาทำเป็น single cell protein เนื่องจากมีปริมาณนิวคลีอิกและเซลล์ลอสต่ำ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือมีค่าโปรตีนอยู่ประมาณ 55-68% (Venkataraman, 1983) สำหรับออสซิลลาทอเรีย คณะผู้วิจัยในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำการศึกษเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้ว่า จะมีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันหรือไม่ และเหมาะสมเพียงใดในการที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารเสริมให้ชาวชนบทที่ประสบปัญหาขาดแคลนโปรตีน ทั้งนี้เนื่องจากว่าสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้ เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อยู่ใน Family Oscillatoriaceae. Class Cyanophyceae และ Division Cyanophyta เช่นเดียวกัน ต่างกันตรงรูปร่าง คือสาหร่ายสไปรูลินาจะมีสายเซลล์ (trichome) บิดตัวเป็นเกลียว ส่วนออสซิลลาทอเรีย สายเซลล์ไม่แตกแขนง เรามักพบสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเค็ม โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยกันเสมอ จึงทำให้คณะผู้วิจัยมองเห็นปัญหาและความสำคัญที่จะทำการวิจัยครั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการทนต่อความเค็มของสาหร่ายทั้งสองชนิด สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานว่าสาหร่ายตัวใด จะสามารถทนต่อความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์ได้มากกว่ากัน เพื่อจะได้แนะนำให้ชาวชนบทได้ทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทั้งสอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการทนต่อความเค็มของสาหร่ายออสซิลลาทอเรียและสไปรูลินา ว่าสาหร่ายตัวใดจะสามารถทนทานต่อระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ได้ดีกว่ากัน และที่ระดับความเค็มใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการทดลอง

1. วัสดุอุปกรณ์

1.1 พืชทดลอง (Plant material)

สำหรับเลี้ยงเชื้อรา 2 ชนิด คือ ออสซิลลาทอเรีย และสไปรูโลน่า

1.2 สารเคมีที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายทั้งสองชนิด

สูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสาหร่าย ใช้ตามสูตรอาหารของ Modified Allen's Medium

1.3 เครื่องมือและเครื่องแก้วที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทั้งสองชนิด

2. วิธีดำเนินการทดลอง

2.1 เก็บตัวอย่างสาหร่ายออสซิลลาทอเรียและสไปรูโลน่า

เก็บตัวอย่างสาหร่ายออสซิลลาทอเรียและสไปรูโลน่า จากแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.2 การเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากเก็บสาหร่ายแล้วนำมาทำ Single Cell Isolation และเลี้ยงในหลอดทดลองประมาณ 10-15 วัน ก็นำมาเลี้ยงต่อในขวดแก้วรูปชมพู่ โดยให้แสงตลอดเวลา พร้อมกับใช้เครื่องบ่มอากาศด้วยหลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ นำมาเลี้ยงในขวดโหลแก้วขนาดสูง 19 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ซม. เลี้ยงในอาหารสูตร Allen's Medium ปริมาตร 4 ลิตร

2.3 การเลี้ยงสาหร่ายในระดับความเค็มต่างๆ กัน เพื่อหาความสามารถในการทนต่อความเค็มของออสซิลลาทอเรีย และสไปรูโลน่า

นำสาหร่ายที่ได้มาเลี้ยงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มล. บรรจุอาหารสูตร Modified Allen's Medium ที่มีความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ตั้งแต่ความเข้มข้น 0,2,4,...,40 ppt. ทั้งหมด 4 ข้าง แล้วนำไปวัดค่าการนำไฟฟ้า หลังจากนั้นนำออสซิลลาทอเรีย และสไปรูโลนามาเลี้ยงในอาหารที่เตรียมไว้ โดยใช้ค่า OD เริ่มต้น 0.05 ให้ได้รับแสงตลอดเวลาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 60 W. และใช้เครื่องบ่มอากาศช่วยเพิ่มออกซิเจนเลี้ยงไว้ 16 วัน และทำการวัดค่า OD และ ชั่งน้ำหนักแห้งของสาหร่ายทั้งสองชนิดทุก 4 วัน

ผลการทดลอง

ผลการทดลองตามวิธีดำเนินการทดลองแจกแจงเป็นตารางตามตารางที่ 1,2,3,4 และ 5 และกราฟรูปที่ 1,2,3,4 ดังนี้


ตารางที่ 1 แสดงค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของสารละลายสูตร Modified Allen's Medium ที่ใช้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่เติมโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความเค็ม 0-40 ppt.

ระดับความเข้มข้นของเกลือ โซเดียมคลอไรด์ (ppt.)	ค่าการนำไฟฟ้า (mmho/cm.)	จัดอยู่ในระดับความเค็ม
0	0.5	ไม่เค็ม
2	2.2	เค็มน้อย
4	4.5	เค็มปานกลาง
6	6.8	เค็มปานกลาง
8	8.8	เค็มมาก
10	11.0	เค็มมาก
12	13.0	เค็มมาก
14	14.5	เค็มมาก
16	17.0	เค็มจัด
18	18.5	เค็มจัด
20	21.5	เค็มจัด
22	23	เค็มจัด
24	25	เค็มจัด
26	27.5	เค็มจัด
28	29.0	เค็มจัด
30	30.5	เค็มจัด
32	32.5	เค็มจัด
34	34.8	เค็มจัด
36	37.0	เค็มจัด
38	39.0	เค็มจัด
40	41.5	เค็มจัด

ตารางที่ 2 แสดงค่า OD เฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ซึ่งมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt. นาน 4,8,12 และ 16 วัน (ค่า OD เริ่มต้นการทดลองเท่ากับ 0.15)

ความเข้มข้นของเกลือ โซเดียมคลอไรด์ (ppt.)	ค่า OD เฉลี่ย			
	วันที่ 4	วันที่ 8	วันที่ 12	วันที่ 16
0	.35 ± 0	.38 ± 0	.39 ± .006	.42 ± .006
2	.37 ± .006	.41 ± .006	.43 ± .006	.45 ± .006
4	.35 ± .006	.37 ± .006	.38 ± .006	.41 ± .006
6	.34 ± .006	.37 ± .006	.37 ± .006	.40 ± .006
8	.30 ± .006	.32 ± .01	.36 ± .01	.40 ± .006
10	.30 ± .01	.31 ± .01	.35 ± .006	.38 ± .006
12	.28 ± .006	.30 ± .01	.32 ± .006	.33 ± .006
14	.28 ± .006	.30 ± .006	.32 ± .006	.33 ± .01
16	.27 ± .01	.29 ± .006	.30 ± .01	.31 ± .01
18	.24 ± .006	.27 ± .01	.29 ± .006	.30 ± .006
20	.22 ± .006	.14 ± .006	.27 ± .01	.29 ± .01
22	.21 ± .01	.24 ± .01	.26 ± .01	.28 ± .006
24	.19 ± .006	.19 ± .006	.23 ± .006	.25 ± .006
26	.18 ± .006	.19 ± .006	.20 ± .01	.23 ± .006
28	.15 ± .006	.18 ± .006	.20 ± .0	.20 ± .0
30	.08 ± .01	.10 ± .006	.11 ± .006	.09 ± .006
32	.07 ± .0	.06 ± .006	.06 ± .006	.05 ± .0
34	.06 ± .006	.05 ± .006	.04 ± .0	.03 ± .0
36	.03 ± .006	.02 ± .006	.02 ± .006	.01 ± .0
38	0	0	0	0
40	0	0	0	0

หมายเหตุ : ที่ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ 30-40 ppt. เชื้อจุลินทรีย์เป็นสีเหลือง




รูปที่ 1 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า OD ในวันที่ 4, 8, 12 และ 16 ของออสซิลลาทอเรีย เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร Modified Allen's Medium โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt.

ตารางที่ 2 แสดงค่า OD เฉลี่ยของออสซิลลาทอเรีย เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ซึ่งมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt. 4, 8, 12 และ 16 วัน
(ค่า OD เริ่มต้นการทดลองเท่ากับ 0.15)

ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (ppt.)	ค่า OD เฉลี่ย			
	วันที่ 4	วันที่ 8	วันที่ 12	วันที่ 16
0	.38 ± .006	.41 ± .006	.43 ± .006	.46 ± .0
2	.41 ± .01	.43 ± .006	.45 ± .0	.49 ± .006
4	.37 ± .006	.40 ± .006	.42 ± .006	.45 ± .006
6	.35 ± .0	.37 ± .006	.40 ± .006	.42 ± .01
8	.35 ± .006	.36 ± .006	.39 ± .006	.40 ± .006
10	.35 ± .01	.36 ± .006	.38 ± .006	.38 ± .006
12	.33 ± .01	.34 ± .006	.37 ± .01	.37 ± .01
14	.26 ± .006	.27 ± .006	.29 ± .0	.32 ± .006
16	.20 ± .006	.23 ± .006	.24 ± .006	.24 ± .006
18	.12 ± .006	.12 ± .006	.11 ± .006	.10 ± .0
20	.11 ± .006	.11 ± .006	.10 ± .006	.10 ± .0
22	.10 ± .006	.10 ± .006	.09 ± .0	.08 ± .0
24	.09 ± .0	.08 ± .0	.06 ± .006	.05 ± .0
26	.07 ± .01	.06 ± .006	.05 ± .0	.04 ± .0
28	.05 ± .006	.04 ± .0	.03 ± .0	.03 ± .006
30	.04 ± .006	.03 ± .0	.02 ± .0	.02 ± .0
32	.03 ± .0	.02 ± .006	.02 ± .0	.01 ± .006
34	0	0	0	0
36	0	0	0	0
38	0	0	0	0
40	0	0	0	0

หมายเหตุ : ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ 18-40 ppt. ลักษณะของออสซิลลาทอเรียเป็นสีเหลือง



รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า OD ในวันที่ 0, 4, 8, 12 และ 16 ของสไปรูลิน่า เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt.

ตารางที่ 4 แสดงค่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ยเป็นมิลลิกรัมของออสซิลลาทอรี เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ซึ่งมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt. นาน 16 วัน

ความเข้มข้นของเกลือ โซเดียมคลอไรด์ (ppt.)	ค่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของออสซิลลาทอรี (มิลลิกรัม)	
	เมื่อเริ่มการทดลอง	เมื่อเลี้ยงนาน 16 วัน
0	20.1 ± 0.1	80.3 ± .29
2	20.4 ± 0.1	88.8 ± .29
4	20.8 ± 0.1	80.6 ± .32
6	20.8 ± 0.06	78.5 ± .50
8	20.6 ± 0.1	77.2 ± .29
10	20.7 ± 0.3	76.4 ± .40
12	20.3 ± .26	74.5 ± .25
14	20.5 ± .45	73.2 ± .29
16	20.3 ± .25	72.3 ± .26
18	20.7 ± .10	70.3 ± .26
20	20.6 ± .25	68.5 ± .50
22	20.7 ± .10	67.3 ± .26
24	20.8 ± .10	49.3 ± .58
26	20.6 ± .10	38.7 ± .58
28	20.7 ± .06	24.1 ± .32
30	20.8 ± .06	10.5 ± .50
32	20.5 ± .5	8.6 ± .32
34	20.4 ± .10	4.2 ± .29
36	20.7 ± .10	3.5 ± .50
38	20.9 ± .10	1.7 ± .29
40	20.8 ± .29	0.1 ± .06


หมายเหตุ : เกลื่อน้ำหนักเริ่มต้นของออสซิลลาทอรีเท่ากับ 20.60 มิลลิกรัม


ตารางที่ 5 แสดงค่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ยเป็นมิลลิกรัมของสไปรูลิน่า เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ซึ่งมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt. นาน 16 วัน

ความเข้มข้นของเกลือ โซเดียมคลอไรด์ (ppt.)	ค่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของสไปรูลิน่า (มิลลิกรัม)	
	เมื่อเริ่มการทดลอง	เมื่อเลี้ยงนาน 16 วัน
0	19.5 ± .25	95.5 ± .50
2	19.2 ± .29	99.0 ± .50
4	19.2 ± .29	83.3 ± .29
6	19.8 ± .25	80.2 ± .29
8	19.5 ± .50	76.2 ± .29
10	19.5 ± .50	71.0 ± 1.0
12	19.7 ± .26	59.8 ± .29
14	19.2 ± .29	49.2 ± .29
16	19.8 ± .29	30.5 ± .50
18	19.8 ± .29	15.2 ± .29
20	19.2 ± .29	12.0 ± .29
22	19.3 ± .58	10.7 ± .58
24	19.8 ± .50	10.0 ± .0
26	19.5 ± .29	9.2 ± .29
28	19.3 ± .58	7.8 ± .29
30	19.5 ± .50	7.0 ± .0
32	19.3 ± .58	6.2 ± .29
34	19.5 ± .29	2.5 ± .50
36	19.5 ± .50	2.2 ± .29
38	19.5 ± .50	0.1 ± .0
40	19.2 ± .29	0.1 ± .0

หมายเหตุ : เกลื่อน้ำหนักเริ่มต้นของสไปรูลิน่าเท่ากับ 19.47 มิลลิกรัม.

รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแห้ง (มิลลิกรัม) ของออสซิลลาทอเรียที่เลี้ยงไว้ในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt. เป็นเวลานาน 16 วัน





รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักรวม (มิลลิกรัม) ของสปอร์ไลนาร์ที่เลี้ยงไว้ในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0-40 ppt. เป็นเวลานาน 16 วัน

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการทนต่อความเค็มของออสซิลลาทอเรียและสไปรูไลน่า โดยเลี้ยงสาหร่ายทั้งสองชนิดในอาหารสูตร Modified Allen's Medium ที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 และ 40 ppt. วัดผลการทดลองโดยวิธีการวัดการเจริญเติบโตโดยดูจากค่า OD และน้ำหนักแห้งของสาหร่ายทั้งสองชนิดค่า OD ทำการวัดในวันที่ 4,8,12 และ 16 ส่วนน้ำหนักแห้งวัดเมื่อเริ่มต้นการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการทดลองคือในวันที่ 16

ผลการทดลองพบว่าระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่สูงที่สุดที่ออสซิลลาทอเรียและสไปรูไลน่า สามารถทนได้เท่ากับ 28 ppt. และ 16 ppt. ตามลำดับ (ค่าการนำไฟฟ้า 29.0 mmho./cm. และ 17.0 mmho./cm. ตามลำดับ) จัดเป็นความเค็มระดับเค็มจัด (เพิ่มพูน, 2527) ดังแสดงในตารางที่ 2, ตารางที่ 3,4,5 กราฟที่ 1,2,3 และกราฟที่ 4 ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ได้ค่าใกล้เคียงกันที่ Board on Science and Technology for International Development (1975) ได้รายงานไว้ว่าสไปรูไลน่าสามารถเจริญได้ดีในน้ำที่มีความเค็มถึง 14 ppt. จากการทดลองได้ค่าสูงกว่า อาจเนื่องจากสายพันธุ์ของสไปรูไลน่าที่นำมาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ ที่นำมาจากแหล่งน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำที่มีความเค็ม ดังนั้นสไปรูไลน่าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนี้อาจมีการปรับตัวให้สามารถทนต่อความเค็มได้มากกว่าสไปรูไลน่าสายพันธุ์ที่อยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่มีเค็ม

สำหรับออสซิลลาทอเรีย ยังไม่มีรายงานเรื่องความสามารถในการทนต่อความเค็ม แต่ผลการทดลองค่าที่ได้ใกล้เคียงกันที่ พงศ์เทพและประเสริฐ (2523) ได้รายงานไว้ว่า ระดับความเค็มที่สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสามารถทนอยู่ได้จะอยู่ในช่วง 3-21.8 ppt.

ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของออสซิลลาทอเรียและสไปรูไลน่าเท่ากับ 2 ppt. เช่นเดียวกัน (ค่าการนำไฟฟ้า 2.2 mmho./cm., จัดเป็นความเค็มน้อย) (เพิ่มพูน, 2527) ดังแสดงในตารางที่ 2,3,4 แล้ว และกราฟที่ 1,2,3 และ 4 ผลการทดลองครั้งนี้สนับสนุนการทดลองของ Zasluck (6th UNEP Training Course, 1985) สำหรับออสซิลลาทอเรีย ยังไม่มีรายงานผลการทดลอง

กิตติกรรมประกาศ

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2529 จึงขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาชีววิทยา คุณสุรศักดิ์ เสนคราม คุณปรีชณีย์ ตลอดจนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้วิจัย
กรกฎาคม 2532

พายุหมุน

โดย ญาปล้อง

ชื่อพายุหมุน

กล่าวกันว่า คำที่ไพเราะที่สุดที่ใครๆ ก็อยากได้ยินได้ฟัง ก็คือชื่อของตัวเอง... ครับ เกริ่นนำขึ้นมาดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องเท่าใด เพราะหัวเรื่องเป็นชื่อพายุไม่ใช่ชื่อคน และพายุเองก็คงไม่ยินดียินร้ายกับชื่อของตัวเองเท่าใดนัก แต่ประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ที่แนบสนิระหว่างชื่อพายุและชื่อคนนั้น น่าติดตามพอสมควร..... ครับ ลองตามไปดู!

ชื่อพายุหมุนนั้นมีการกำหนดตามบริเวณที่เกิด ตามตารางที่ 1 และกำหนดตามอัตราเร็วลมบริเวณใกล้ๆ ศูนย์กลาง (กำหนดตามความรุนแรง) ตามตารางที่ 2

ชื่อพายุ	บริเวณที่เกิด
พายุเฮอริเคน (Hurricane)	มหาสมุทรแอตแลนติก, ทะเลแคริบเบียน, อ่าวเม็กซิโก และภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
พายุไซโคลน (cyclone)	มหาสมุทรอินเดีย
พายุไต้ฝุ่น (Typhoon)	บริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ รวมทั้งทะเลญี่ปุ่น ทะเลเหนือ ทะเลจีนตะวันออก และอ่าวไทย
พายุวิลลี-วิลลี (Willy-Willy)	ทวีปออสเตรเลีย

ตารางที่ 1 ชื่อลมพายุหมุนกำหนดตามบริเวณที่เกิด

ชื่อพายุ	อัตราเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่ผิวพื้น
พายุดีเปรสชัน	น้อยกว่า 62 กม./ชม.
พายุโซนร้อน	63-117 กม./ชม.
พายุไต้ฝุ่น	มากกว่า 118 กม./ชม.
Super typhoon	มากกว่า 241 กม./ชม.

ตารางที่ 2 ชื่อลมพายุหมุนกำหนดตามอัตราเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง

ชื่อในตารางทั้งสองนั้นไม่มีปัญหา เป็นที่รู้และเข้าใจเพราะได้รู้ได้เรียนมาในชั้นต้น ๆ

ปัญหาอยู่ที่แต่ละปี ๆ พายุหมุนที่เกิดในแต่ละบริเวณนั้นมีมากมาย มีทั้งแรงมากและแรงน้อย และที่มีความรุนแรงมากไป เช่น พายุเฮเลนที่พัดทำความเสียหายในภาคใต้เมื่อปี 2505 และน้องเกย์เมื่อปีกลาย (2532) เดิมแต่ละประเทศกำหนดการเรียกชื่อกันเอง ทำให้ไม่เป็นระเบียบระบบ ดังนั้นทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก จึงได้จัดประชุมตั้งชื่อพายุหมุนที่เกิดขึ้นในแต่ละบริเวณ ชื่อที่ตั้งตอนแรกเป็นชื่อสตรี (ฝรั่ง) ทั้งหมด! เมื่อประกาศใช้ ทำให้กลุ่มสตรีประท้วงสิทธิสตรีขึ้น โดยอ้างว่า พายุบางลูกทำความเสียหายให้มากมาย ทำให้จึงป้ายความผิดมาให้สตรีทั้งหมด! ผลก็จบลงด้วยการต้องเติมชื่อพายุที่เป็นชื่อผู้ชาย (ฝรั่งอีกเช่นกัน) ลงไปในแต่ละชุด ครับ..... ชื่อผู้ชายที่เติมลงไปใหม่ก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น?

ชื่อพายุหมุนที่เกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยของเรา มี 4 ชุด แต่ละชุดเริ่มจาก A-Z อยู่ในตารางที่ 3 ส่วนชื่อพายุหมุนที่บริเวณอื่นจะไม่กล่าวถึง.... อันนี้ไม่เกี่ยวกับสิทธิสตรี แต่เกี่ยวกับหน้ากระดาษครับผม

ตารางที่ 3 ชื่อพายุหมุนเขตร้อน ที่ใช้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4
ANDY (แอนดี้)	ABBY (แอบบี้)	ALEX (อเล็กซ์)	AGNES (แอกเนส)
BRENDA (เบรนดา)	BEN (เบน)	BETTY (เบตตี้)	BILL (บิล)
CECIL (เซซิล)	CARMEN (คาร์เมน)	CARY (แคร์รี)	CLARA (คลารา)
DOT (ดอต)	DOM (ดอม)	DINAH (ไดนาห์)	DOYLE (ดอยล์)
ELLIS (เอลลิส)	ELLEN (เอลเลน)	ED (เอด)	ELSIE (เอลซี)
FAYE (เฟย์)	FORREST (ฟอร์เรสต์)	FREDA (เฟรดา)	FABIAN (เฟเบียน)
GORDON (กอร์ดอน)	GEORGIA (จอร์เจีย)	GERALD (เจอราร์ด)	GAY (เกย์)
HOPE (โฮป)	HERBERT (เฮร์เบิร์ต)	HOLLY (ฮอลลี)	HAL (ฮาล)
IRVING (อิรวิง)	IDA (ไดา)	IAN (เียน)	IRMA (เออร์มา)
JUDY (จูดี)	JOE (โจ)	JUNE (จูน)	JEFF (เจฟ)
KEN (เคน)	KUM (คิม)	KELLY (เคลลี)	KIT (คิต)
LOLA (โลลา)	LEX (เลกซ์)	LYNN (ลิน)	LEE (ลี)
MAC (แมก)	MARGE (มาร์จ)	MAURY (มอริ)	MAMIE (มามี่)
NANCY (แนนซี)	NORRIS (นอร์ริส)	NINA (นินา)	NELSON (เนลสัน)
OWEN (โอเวน)	ORCHID (ออร์คิด)	OGDEN (ออกเดน)	ODESSA (โอเดสซา)
PEGGY (เพกกี)	PERCY (เพอร์ซี่)	PHYLLIS (ฟิลลิส)	PAT (แพต)
ROGER (ร็อบเจอร์ต)	RUTH (รูธ)	ROY (รอย)	RUBY (รูบี้)
SARAH (ซารา)	SPERRY (สเปร์รี่)	SUSAN (ซูซาน)	SKIP (สคิป)
TIP (ทิพ)	THELMA (เทลมา)	THAD (แทด)	TESS (เทส)
VERA (เวรา)	VERNON (เวอร์นัน)	VANESSA (วานเนสซา)	VAL (วาล)
WAYNE (เวย์น)	WYNNE (วินนี่)	WARREN (วอร์เรน)	WINONA (วินอนา)

ชื่อพายุหมุนเขตร้อนดังกล่าวข้างบน ใช้หมุนเวียนกันไปตามลำดับตัวอักษรและลำดับคอลัมน์เมื่อใช้ถึงตัวสุดท้ายคือ WINONA แล้วจะเริ่มต้นใหม่ที่ ANDY (ตัวอักษร Q, U, X, Y และ Z ไม่ใช้ตั้งชื่อ)

เอกสารอ้างอิง

1. ปัญญา เจริญวงศ์ "รู้จัก" เกย์ "ได้ฝนเหตุโหดเกิดจากอะไรทำไมถึงชื่อนี้" นสพ.ไทยรัฐ ประจำวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2532, หน้า 5.

คอลัมน์นี้มีรางวัล



การแพทย์และการอนามัยของจีนโบราณ
เจ้าแห่งวิทยาการ 7,000 ปี

ท่านทราบหรือไม่ว่า สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ ชาวจีนโบราณสามารถนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ ลองทายดูว่า สิ่งต่อไปนี้ใช้รักษาโรคอะไรบ้าง?

1. เมล็ดขี้หრა (Anis Atellati)
2. โสม (Panax quinquefolia)
3. ม้าน้ำตากแห้ง (Hippocampus)

หากทราบคำตอบโปรดอย่ารีรอ ส่งคำตอบไปยัง

คุณ ช็อกโกแลต

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

40002

“ช็อกโกแลต”

เฉลย....

• โลหะธาตุกับชีวิต •

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2533

1. ในบรรดาโลหะต่อไปนี้ชนิดใดหรือไม่ใช่ที่เป็นโลหะที่มีพิษอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ถ้ามีปริมาณมากจนเกินไป

Zn, Mn, Co, Fe, Cu

ทุกตัว

2. เราจะสูดดมแก๊สพิษชนิดใดต่อไปนี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว ? CO, SO₂, O₃
CO เนื่องจากเป็นแก๊สพิษที่ไม่มีกลิ่น

3. วิตามินชนิดเดียวที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ วิตามินอะไร?

วิตามิน B₁₂ มี Co เป็นองค์ประกอบ

4. สัตว์ทะเลชนิดใดที่สะสมโลหะหนักเป็นพิษ (เช่น Cd) ได้สูงสุด

หอยนางรม

.....ปัญหาฉบับที่ 3 นี้ไม่มีท่านใดตอบถูกเลย โอกาสหน้าร่วมสนุกกับเราใหม่นะคะ.....



ข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความลง วารสาร “วิทยาศาสตร์ มข.”



ใบสมัครเป็นสมาชิก “วารสารวิทยาศาสตร์ มข.”

- ☐ สมาชิกใหม่
- ☐ ต่ออายุ

ชื่อ - นามสกุล _____

ที่อยู่ _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขสมาชิก _____

ตั้งแต่วันที่ _____ ปี _____ ถึงฉบับที่ _____ ปี _____ รวม _____ ฉบับ

พร้อมนี้ได้ส่งเงินจำนวน _____ บาท มาทาง

อัตราค่าบำรุง

- ☐ ฐานาคดีสง่าาย ป.ท. มข.
- ☐ เช็กไปรษณีย์
- ☐ เงินสด

- | | | | | | |
|----------------------------|----|----|------|-----|-----|
| ☐ 1 | ปี | 4 | เล่ม | 40 | บาท |
| ☐ 2 | ปี | 8 | เล่ม | 80 | บาท |
| ☐ 3 | ปี | 12 | เล่ม | 115 | บาท |
| ☐ 4 | ปี | 16 | เล่ม | 150 | บาท |

ลายเซ็นผู้สมัคร

หมายเหตุ ส่งเงินทางธนาคารหรือเช็คไปรษณีย์ ในนามของ นางบุญคุ้ม เหลือถัน ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งจ่าย ป.ท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

อภิปรายงานการสำหรับผู้เขียน

1. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับนั้น 2 เล่ม และสำเนาพิมพ์อีก 15 ชุด

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความลง วารสาร “วิทยาศาสตร์ มข.”



ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. รายงานผลวิจัยและค้นคว้าหรือการสำรวจที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่นมาก่อน
2. บทความปริทัศน์ ได้แก่งานเขียนที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูงานด้านวิชาการระดับต่าง ๆ
3. บทความแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ เรื่องแปล ข่าววิชาการย่อความจากงานวิจัยค้นคว้าหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับ **ต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดปกติ** มีช่วงห่างระยะบรรทัดตามมาตรฐาน พิมพ์ลงในกระดาษขาว A4 (โรเนียวสัน) โดยใช้กระดาษหน้าเดียว **ความยาวไม่เกิน 10 หน้า** **ส่งต้นฉบับ 2 ชุด**
2. ต้นฉบับ จะถูกพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ และจะตอบรับเท่านั้นโดยไม่ส่งคืน ผู้เขียนควรจะทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตัวเอง 1 ฉบับ
3. ต้นฉบับ จะต้องมีความถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา รวมทั้งมีความสมบูรณ์ในรูปแบบพร้อมที่จะนำลงตีพิมพ์ได้
4. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ **ไม่ยาวเกินไป** และหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อโดยไม่จำเป็น
5. ชื่อผู้เขียน เขียนชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพร้อมทั้งบอกสถานที่ทำงานให้ชัดเจน
6. เนื้อเรื่อง ใช้ได้ทั้งภาษาไทยล้วนหรือภาษาอังกฤษล้วน ถ้าใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่ใช้ปนกับภาษาไทยนั้นให้พยายามแปลเป็นไทยเท่าที่จะทำได้และให้เขียนคำเดิมกำกับในวงเล็บ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งการเขียนตัวสะกดการันต์ในภาษาไทยให้ใช้ตามแบบราชบัณฑิตยสถาน
7. ในกรณีของบทความวิจัย **ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ** และแบ่งเนื้อหาของบทความเป็นบทนำ วิธีดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ บทสรุปและวิจารณ์
8. เชิงอรรถ (footnote) ใช้เฉพาะที่จำเป็นเพื่อขยายหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ใจความเฉพาะตอนในบทความ ข้อความที่จำเป็นจะต้องมีเชิงอรรถให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับท้าย
9. ตารางและภาพประกอบ คำบรรยายประกอบตารางหรือภาพประกอบควรจะสั้นและชัดเจน ถ้าจะเป็นภาพถ่ายให้ใช้ภาพขาว-ดำ ขนาดโปสเตอร์การ์ด ภาพเขียนลายเส้นควรเขียนด้วยหมึกดำ ภาพที่เขียนต้องชัดเจนและมีขนาดที่เหมาะสม
10. เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม เขียนตามแบบสากลนิยม
ส่งต้นฉบับมาที่

อภิสิทธิ์สำหรับการตีพิมพ์

1. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับนั้น 2 เล่ม และสำเนาพิมพ์อีก 15 ชุด

: กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

