



วารสาร

วิทยาศาสตร์มข.

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2531



วารสาร

วิทยาศาสตร์ปู.

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ISSN 0125-2224

เจ้าของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานตึก 6 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

คำนำรูป ปีละ 40 บท ขาขปลีกเล่มละ 12 บาท

การบอกรับเป็นสมาชิก

แจ้งความจำนงค์เป็นจดหมาย หรือกรอกใบสมัครเป็นสมาชิก พร้อมส่งคำนำรูปเป็นขนาดนิติ หรือเช็คไปรษณีย์ในนามของนางบุญคุ้ม เหลือล้น ฝ่ายจัดการ ส่งจ่ายป.ท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ที่ปรึกษา

คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทวิศักดิ์ แก้วชม
สุวิน นุศรคำ

บรรณาธิการ

บรรณาธิการผู้ช่วย

กองบรรณาธิการ

พาดิ วรรณนิชกุล
สมศักดิ์ สร้างบิน
ไพบุลย์ มงคลถาวรชัย
ปริญญา ชีรมงคล
อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์
รัชนิ ฉวีราช
เฉลิม เรื่องวิจัยะชัย
อนันท์ย ตรีวานิช
วิทยา อมรกิจบำรุง
สยาม ชูลิ้น
สุชัย ฅนัยอักษณาวต

ฝ่ายจัดหาทุน

วัฒนา นันทสาร
วิจิตร ทุนอินทร์

ฝ่ายศิลป์และภาพ

ทรงเวทย์ เป้าชัย

ฝ่ายเหรียญก

ลักขณา สุขบาง

ฝ่ายจัดการ

สงวน ห่วงจิตร
บุญคุ้ม เหลือล้น
บุษราภรณ์ ดวงคำน้อย
สมศักดิ์ อุ่นจันทร์



วิทยาศาสตร์ปริทัศน์

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4

192



คอลัมน์ประจำ

- ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองบรรณาธิการ 181
- จดหมายข่าว สมาคมวิทยาศาสตร์ อุบลราชธานี
ข่าว เหมือนวงศ์ 184
- ไม่ลองก็ไม่รู้
ดร. เพ็ญ 186
- วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สุวิทย์ วัฒนภักดี 188
- เคมี.....ปริศนาและอุปโลก
เฉลิม เรืองวิริยะชัย 191

สารคดี - วิชาการ

- การเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลา
ศุภกิจย์ รอดทอง 192
- มะละกอ : พืชสารพัดประโยชน์
วิมล วรรณ 195
- พืชปลูกปลอดสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมเพื่ออะไร
เดือนใจ ไชยกุล 200

งานวิจัย

- ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการงอกของสปอร์
Colletotrichum gloeosporioides ที่เป็น
สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสของข้าวสาลี
ถาวร วิมลธำมณี 207
- Preparation and Electrical Properties of CdTe
A. Hebebrand and others 215
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มนมของนักเรียน
และนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์จำแนกประเภท : กรณีศึกษา
วิทยากร เนียมชวีก และคณะ 219
- ผลกระทบของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีต่อ
คุณภาพน้ำในลำน้ำพอง (ต่อ)
จุติมา คู่อุบล และคณะ 227

เบ็ดเตล็ด

- เกร็ดความรู้.....จากสาร 236
- ควรรู้เรื่อง.....กองบรรณาธิการ 238
- คู่มือผู้เขียน.....กองบรรณาธิการ 240
- คอลัมน์ไม่ร้าง.....ดร.ศ. ยืนยง ปักหมุดด้านท้าย

195



200





252875

ISSN 0125-0224

วิทยาศาสตร์
THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY**Publisher**

Faculty of Science, Khon Kaen University,
Thailand.

Office

Faculty of Science Library, Building 6, Khon
Kaen University.

Objectives

1. To promote and propagate knowledge in all fields of science.
2. To **publish** results from research and studies **by** academic staff and students.
3. To be a medium for the exchange of knowledge and ideas among staff, students and those interested from both inside and outside the institute.

Publishing terms

four issues per annual volume
Issue no. 1 January - March
Issue no. 2 April - June
Issue no. 3 July - September
Issue no. 4 October - December

Subscription rate

40 baht per annum. Single issue price 12
baht.

Membership

Membership request can be made by letter or by completing the membership form, with the fee paid in the form of a postal order or postal cheque sent to Mrs. Boonkoom Lualon, Managing Committee, Khon Kaen University Post Office, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002.

Advisory Committee

Dean, Faculty of Science
Associate Dean for Academic Affairs
Thaveesakdi Keawsim

Suwin Busaracome

Editor

Panee Wannitikul

Associate Editor

Somsak Sarangbin

Editorial Board

Paiboon Mongconthawornchai

Parinya Theramongkol

Utith Inprasit

Chatchavan Ruengprapan

Rachanee Chaveerach

Chalem Ruangviriyachai

Anotai Trevanich

Wittaya Amornkijbumroong

Siam Choothin

Suchai Tanaiacdcchawoot

Advertising Committee

Vathana Nantasarn

Wichitra Toon-in

Artist

Songwate Bousechai.

Treasurer

Luckana Sukbang


Managing Committee

Sanguan Wangjit

Boonkoom Lualon

Bussaraporn Duangkornnoi

Somsak Unjantee



The views and opinions expressed in this journal are those of the authors, and do not necessarily reflect the views and opinions of the editorial board.

บรรณาธิการ แด่สง

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับวารสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีที่ 16 นั้นหมายความว่า เวลาที่สมาชิกเก่าหลาย ๆ ท่านจะต้องต่ออายุสมาชิกมาถึงอีกแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านต่ออายุครั้งเดียว 4 ปี 160 บาท ซึ่งนอกจากจะประหยัดค่าเงินค่าครั้งของการส่งนามบัตรแล้ว ท่านยังได้กำไรเท่ากับได้วารสารฟรี 1 ฉบับ อีกด้วย

ส่วนท่านที่ต้องการส่งบทความมาลงในวารสารฉบับต่อไป กรุณาอ่านข้อแนะนำการเขียนบทความในฉบับนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเตรียมต้นฉบับหลายอย่าง และกองบรรณาธิการจะยึดถือตามรูปแบบที่กำหนดให้ใหม่นี้

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับสารานุกรมจากประธานสมาคมวิทยาศาสตร์ สาขากาชาตะวันออกเฉียงเหนือ ในคอลัมน์ใหม่ "จดหมายข่าว สมาคมวิทยาศาสตร์ สาขากาชาตะวันออกเฉียงเหนือ" พร้อมทั้งรายงานการวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่องและคอลัมน์อื่น ๆ อีกครบถ้วน

กองบรรณาธิการชุดนี้ได้ทำงานมาครบ 2 ปีแล้ว.....ตามวาระของคำสั่งแต่งตั้ง..... ผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดีบ้าง ส่งจดหมาย ตี ชม วิจารณ์ หรือแนะนำไปยังกองบรรณาธิการได้เยอะพอสมควร ! ต่ออายุสมาชิกด้วยนะคะ

สวัสดิ์ค่ะ

พณีย์ วรณานิธิกุล

กำบรรยายภาพปกหน้าและปกหลัง

ปกหน้า : ปะการังอ่อน (Soft coral)

จัดเป็นสัตว์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony) อาศัยอยู่ในทะเลบริเวณแนวปะการัง ใช้ส่วนฐานของกลุ่มยึดเกาะกับผิวหิน แล้วชูกลุ่มให้ตั้งขึ้น ลักษณะคล้ายกับบอนไซ แต่ละตัวภายในกลุ่มมีรูปร่างแบบทรงกระบอก (polyp) ขนาดเล็ก ตรงด้านที่เป็นช่องเปิดของปาก มีหนวดเรียงโดยรอบ 8 เส้น



รศ. สุรินทร์ มีจรรย์ท มศว.บางแสน ถ่ายภาพ
* ผศ. ไพรัช ทานสินพร : เนื้อหาภาพและบรรยาย



เจ้าหน้าที่โสตฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ถ่ายภาพ

ปกหลัง : ดอกไม้ทะเล (Sea Anemone)

เป็นสัตว์ที่มีลำตัวทรงกระบอก แขนงออกทางด้านบน ด้านล่างเป็นฐานสำหรับใช้ยึดเกาะกับก้อนหินหรือปะการัง บริเวณด้านบนมีช่องปากอยู่ตรงกลาง และมีหนวดจำนวนมากเรียงรายอยู่โดยรอบ บริเวณหนวดจะมีเข็มพิษที่สามารถปล่อยออกมาทำร้ายเหยื่อ แล้วจับกินเป็นอาหาร พบอาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการัง

ข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความลง วารสาร “วิทยาศาสตร์ มข.”



ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. รายงานผลวิจัยและค้นคว้าหรือการสำรวจที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่นมาก่อน
2. บทความปริทัศน์ ได้แก่งานเขียนที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูงานด้านวิชาการระดับต่าง ๆ
3. บทความแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ เรื่องแปล ข่าววิชาการ ย่อความจากงานวิจัยค้นคว้าหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับ ต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดปกติ มีช่วงห่างระยะบรรทัดตามมาตรฐาน พิมพ์ลงในกระดาษขาว A4 (โรเนียวสั้น) โดยใช้กระดาษหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ส่งต้นฉบับ 2 ชุด
2. ต้นฉบับ จะถูกพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ และจะตอบรับเท่านั้นโดยไม่ส่งคืน ผู้เขียนควรจะทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตัวเอง 1 ฉบับ
3. ต้นฉบับ จะต้องมีความถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา รวมทั้งมีความสมบูรณ์ในรูปแบบพร้อมที่จะนำลงตีพิมพ์ได้
4. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่ยาวเกินไป และหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อโดยไม่จำเป็น
5. ชื่อผู้เขียน เขียนชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพร้อมทั้งบอกสถานที่ทำงานให้ชัดเจน
6. เนื้อเรื่อง ใช้ได้ทั้งภาษาไทยล้วนหรือภาษาอังกฤษล้วน ถ้าใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่ใช้ปนกับภาษาไทยนั้น ให้พยายามแปลเป็นไทยเท่าที่จะทำได้และให้เขียนคำเดิมกำกับในวงเล็บ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งการเขียนตัวสะกดการันต์ในภาษาไทยให้ใช้ตามแบบราชบัณฑิตยสถาน
7. ในกรณีของบทความวิจัย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบ่งเนื้อหาของบทความเป็นบทนำ วิธีดำเนินการ ผลการวิเคราะห์ บทสรุปและวิจารณ์
8. เรียงอรรถ (footnote) ใช้เฉพาะที่จำเป็นเพื่อขยายหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ใจความเฉพาะตอนในบทความ ข้อความที่จำเป็นจะต้องมีเชิงอรรถให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับท้าย
9. ตารางและภาพประกอบ ถ้าบรรยายประกอบตารางหรือภาพประกอบควรจะสั้นและชัดเจน ถ้าจะเป็นภาพถ่าย ให้ใช้ภาพขาว-ดำ ขนาดโปสเตอร์การ์ด ภาพเขียนลายเส้นควรเขียนด้วยหมึกดำ ภาพที่เขียนต้องชัดเจนและมีขนาดที่เหมาะสม
10. เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม เขียนตามแบบสากลนิยม ส่งต้นฉบับมาที่

อภิปรายสำหรับการตีพิมพ์

1. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับนั้น 2 เล่ม และสำเนาพิมพ์อีก 15 ชุด

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



๑ ลูกหนูกับกระเทียม ๑

การเรียนรู้ก่อนคลอด อาจมีความสำคัญ ต่อหนูเล็ก ๆ ในการต่อสู้เพื่อการอยู่รอด นาย Peter Hepper แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์ในเบลฟาสต์ ได้ทดลองเลี้ยงแม่หนูที่ตั้งท้องด้วยกระเทียม ระหว่างระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง เขาพบว่า เมื่อลูกหนูอายุได้ 12 วัน ลูกหนูจะแสดง อาการชอบกระเทียมมากกว่าหัวหอมใหญ่ ตรงข้ามกับลูกหนูที่เกิดจากแม่ที่ไม่ได้กินกระเทียม ระหว่างตั้งท้อง ซึ่งจะไม่แสดงอาการชอบกระเทียม


เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ลูกหนูดังกล่าวไม่ได้ ชอบกระเทียม เพราะได้กลิ่นจากลมหายใจหรือ ขนของแม่ นาย Hepper ได้แยกลูกหนูกลุ่มนี้ ไปให้แม่ที่ไม่กินกระเทียมเลี้ยงดู ผลที่ได้พบว่า ลูกหนูกลุ่มนี้ยังคงชอบกระเทียมมากกว่าหัวหอม ใหญ่เช่นเดิม

นาย Hepper สรุปว่า ฟีตัส (fetus) สามารถ ตมกลิ่นได้ตั้งแต่วัยในมดลูก ถ้าหากสารเคมีที่มี กลิ่นละลายในเลือดแล้วผ่านเข้าหาฟีตัสทางรก

๑ ตัวควัน "ไร้ท่อ" ๑

ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่ว ๆ ไป สิ่งที่จะขาด ไม่ได้สำหรับการป้องกันควัน (พิษ) ที่เกิดจาก ปฏิกริยาเคมีในขณะทำการทดลอง คือ ตัวควัน ลักษณะการทำงานของตัวควันคือดูดควัน (พิษ) ออกไปทางด้านหลังของตัวแล้วส่งผ่านตามท่อออกไปนอกห้องปฏิบัติการ แต่ท่อที่ติดตั้งนี้ไม่ได้ ทำงานหนักเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้อง ปฏิบัติการทางเคมีที่อยู่ในอาคารสูง ๆ

Gelaire นักวิจัยของ Flow laboratories เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ได้ออกแบบตัวควันที่ ไร้ท่อให้ชื่อว่า Airone ส่วนประกอบที่สำคัญของ ตัวควันไร้ท่อนี้ คือ ตัวกรอง (filter) ซึ่งบรรจุไว้ด้วย activated carbon (activated carbon ได้จากการนำ กะลามะพร้าวที่มีปลุกเฉพาะในประเทศศรีลังกา เท่านั้น มาผ่านกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ) George Sacossey ที่ปรึกษาคณหนึ่งของ Flow กล่าวว่า "ด้วย ระบบของเราจะสามารถที่จะทำลายหรือกำจัดควัน (พิษ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งเช่น formaldehyde เป็นต้น" activated carbon นี้ได้มีการ นำไปใช้ในงานกิจการทางทหารเช่น สามารถป้องกัน แกสน้ำตาได้ เนื่องจาก activated carbon นี้สามารถ จับได้ทั้งในสภาวะที่เป็น ไอ ผุ่น และควันได้



รูป ตู้ควันไร้ท่อ Airone

Flow laboratories มีตัวกรองให้เลือกได้ประมาณ 14 ชนิด สำหรับใช้ในตู้ควันไร้ท่อ เช่น C1 - 200 ใช้สำหรับกรอง formaldehyde C1 - 400 ใช้สำหรับกรอง sulfur dioxide sulfuric acid, hydrochloric acid และกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ตัวกรองชนิดต่าง ๆ นี้บางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ราคาของตู้ควันไร้ท่อนี้ประมาณ \$2,500 - \$4,500

(Science, March 1988)

สมศักดิ์ สร้างบิน

๑๑ เส้นใยซูเปอร์คอนดักเตอร์ ๑๑

เมื่อเร็ว ๆ นี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแอสตันฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถผลิตเส้นใยตัวนำยิ่งยวด

(Superconductor Fibers) เส้นใยที่สร้างขึ้นแม้ว่าจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1/4-1 มิลลิเมตรและยาวเพียง 4 เซนติเมตร แต่ความสำเร็จในการสร้างเส้นใยตัวนำยิ่งยวดยาวนี้ก็ถือว่าการเริ่มต้นของการพัฒนารูปร่าง(forms) ของตัวนำยิ่งยวดให้เป็นเส้น(wires)

สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นส่วนประกอบของ bis-muth-strontiumcalcium-copper oxide มีค่าความต้านทานลดลงเป็นศูนย์ที่ 85 องศาเซลเซียส Robert S. Feizelson และทีมงานอ้างว่า เส้นใยนี้สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้อย่างน้อย 30,000 แอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ขบวนการผลิตเส้นใยนี้ เริ่มจากการใช้รังสีอินฟราเรดจากเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์หลอมส่วนปลายของแท่งตัวนำยิ่งยวดเซรามิก ตัวนำยิ่งยวดที่หลอมจะถูกทำให้ตกผลึกบนแกน (Seed) ของการตกผลึก จากนั้นจะถูกยืดออกจนกลายเป็นเส้นใย

New Scientist, 9 June 1988

นายบุญส่ง สุตะพันธ์

๑๒ เครื่องวัดมีชีวิต ๑๒

นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ชิ้นส่วนของพืชหรือสัตว์มาเป็นเครื่องตรวจวัดสารเคมีที่มีปริมาณน้อยมากได้เรียกเครื่องวัดนี้ว่าเครื่องวัดชีวิต แครีเอ วิชนิตซ์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้นำทวนดปูซึ่งตามธรรมชาติปูจะใช้ทวนในการดมกลิ่นเพื่อหาอาหาร ตัดทวนดปูทะเลมาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทวนดปูจะทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดชีวิต บอกปริมาณกรดอะมิโนที่มีปริมาณน้อยมากในสารละลายน้ำเกลือได้ ในทำนองเดียวกันถ้าใช้กล้วยพันเป็นชิ้น

บาง ๆ แล้วต่อกับขั้วไฟฟ้า แทนที่จะสามารถวัดปริมาณ dopamine ที่อยู่ในกล้วยได้และหนดปลาตุกเมื่อต่อกับขั้วไฟฟ้าสามารถใช้วัดปริมาณกรดอะมิโนในน้ำจืดได้ ประโยชน์อันมหัศจรรย์ของเครื่องวัดชีวเคมีนี้สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องวัดกลอื่น ๆ ยิ่งกว่านั้นให้ผลเร็วกว่าการวิเคราะห์ชีวมวลในห้องปฏิบัติการ จึงน่าที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการนำเครื่องวัดชีวเคมีไปใช้ในห้องปฏิบัติการในอนาคต ถ้าได้มีการศึกษาต่อไปอย่างกว้างขวางเช่นการศึกษาเกี่ยวกับการหมัก และโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไปจนถึงการสร้างเครื่องวัดปริมาณน้ำตาลในร่างกายทำหน้าที่เป็นตับอ่อนเทียมในอนาคต

Science News, Vol. 133, 1988

นายวุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์

◎ นักบินกับลูกชาย ◎

และแล้วนิยายเก่าแก่แห่งกองทัพอากาศก็ เป็นจริง กลุ่มบุคคลพวก "นักบิน" มีลูกเป็นชาย จำนวนน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ (เป็นลูกสาว 60%) Dr.Bertis Little นักพันธุศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย Texas Southwestern Medical Center แห่งดัลลัส ได้ค้นพบความผิดปกติในกลุ่มนักบินอากาศและนักบินขับไล่ บุคคลเหล่านี้จะต้องพบกับแรงดึงดูดของโลกที่มีค่าสูงกว่าปกติอยู่ตลอดเวลาขณะทำงาน การศึกษาของ Dr.Little ชี้แนะว่า "มีความสัมพันธ์กันระหว่างการได้รับค่า G ที่สูงมากดังกล่าวกับการลดลงของสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงในลูกของนักบินผู้ชายเหล่านั้น

Popular Science

นายพีระพล ก้อนกระสังข์



สาส์นจากประธานสาขาคณะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคณะ และสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์ มข.

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาคณะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2531-2532 ดังมีรายนามซึ่งได้พิมพ์ประกาศในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2531 คณะกรรมการจะมีวาระการบริหารงานเป็นเวลาสองปี นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นไป

ในการบริหารงานของสาขาคณะ คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาถึงปัญหาการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้มีความเห็นว่า ควรจะต้องทำงานร่วมมือประสานกับสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ของภูมิภาค โดยในขั้นต้นนี้ ควรจะให้การสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นส่วนรวม ซึ่งจะได้ใช้เป็นรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป ในการนี้ทางสาขาคณะต้องแสวงหาทรัพยากรจากแหล่งอื่นมาช่วยสนับสนุนนอกเหนือไปจากการที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ภายในมาเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน ซึ่งทั้งนี้จะประสบความสำเร็จเพียงไรนั้นส่วนหนึ่งอยู่ที่การที่จะได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากท่านทั้งหลายเป็นอย่างมาก ตามที่ได้ปรากฏในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับนี้ สาขาคณะได้จัดทำ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนทางโทรทัศน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ประสงค์ ภูณานวัฒน์ชัยเดช เป็นหัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นอกเหนือจากเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์รอบตัวแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ยังมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งทางเนื้อหาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วย ซึ่งจะ เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเป็นอันมาก สาขาคณะจะทำการสร้างเทปโทรทัศน์ชุดนี้ให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อสำคัญ ๆ ดังนั้น สาขาคณะจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคณะวันออกเฉียงเหนือ และท่านสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์ มข. คือ ขอให้ท่านทำการสำรวจหัวข้อทางวิชาการที่สถานศึกษาของท่านมีความประสงค์ให้ทางสาขาคณะจัดทำเทปโทรทัศน์ โดยใช้วิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อนำไปใช้ประกอบ

การเรียนการสอนในสถานศึกษาของท่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ท่านก็จะมี ส่วนช่วยเหลือในการประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไปด้วย ซึ่งย่อมจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคนี้สมดังความมุ่งหมายของเราทุกคน ในการพัฒนาเช่นนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาบ้างตามสมควร แต่ถ้าเราร่วมผนึกกำลังกัน เวลานั้น ก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากเรา โดยเหตุนี้ สาขาภาคจึงหวังในความร่วมมือสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย เพื่อให้ เราได้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ร่วมกัน และในการนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ก่อประโยชน์ในการสร้างสมศักยภาพทางวิชาการของภูมิภาค เราจึงใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการที่ได้มีสาขาภาคของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยฯ อยู่ที่มข. นี้อย่างเดียวกันกับที่สาขานี้ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ มข. ในที่นี้ คือ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ในการติดต่อสื่อสารถึงท่าน ทางสาขาภาคมีนโยบายที่จะใช้ วารสารฉบับนี้ เป็นเวทีกลางสำหรับท่านสมาชิกสมาคมที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำผลงานของท่านออก เผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัย หรือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท่านก็ตาม ซึ่ง จะส่งผลดีโดยตรงต่อภูมิภาค และเมื่อเราได้มีพัฒนาการไปถึงจุดหนึ่ง ทางสาขาภาคก็จะสามารถขอ อนุมัติจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ของสมาคม 1 ฉบับ สำหรับ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักวิชาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าด้วยผลงานทางวิทยาศาสตร์ของเราโดยเฉพาะ อย่างที่สาขาเคมี หรือฟิสิกส์ได้เคยทำมาแล้ว และนั่นหมายความว่า เราได้พัฒนา สรรพกำลังทางวิชาการของเราไปตามเส้นทางแห่งความฝันอันสูงส่งของพวกเราทุกคน โดยที่สาขาภาค ได้ตระหนักถึงผลดีของการร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทำ เราจึงได้ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับนี้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นบรรณาการพิเศษแก่ท่านสมาชิกสมาคมฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหวังว่า หากท่านได้พิจารณาเห็นชอบกับแผนการดำเนินงานของเรา ก็ขอให้ท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ต่อไป และสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกวารสารนี้ อยู่แล้ว แต่ยังมีได้เป็นสมาชิกของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ใคร่ ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาสมัครเป็นในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดขอให้ท่านได้โปรดติดต่อ สมัครเป็นสมาชิก และ หรือ การจัดทำเทปโทรทัศน์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ที่ อาจารย์พาณิชย์ วรรณนิชกุล เลขานุการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และบรรณาธิการวารสาร วิทยาศาสตร์ มข. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002 จัก ขอบขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านคงจะกรุณาให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการ บริหารสาขาภาคให้บรรลุผลสำเร็จสมดังที่เราปรารถนาาร่วมกัน ขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ขาว เหมือนวงศ์

ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 ตุลาคม 2531



โดย...ดร.เพี้ยน

ไม่ลองก็ไม่รู้

บทความในชุด “ไม่ลองก็ไม่รู้” นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์โดยการทดลอง หรือประดิษฐ์เครื่องมืออย่างง่าย ซึ่งนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วยังคาดหวังว่าประโยชน์ต่อการสอนวิทยาศาสตร์ในแบบแผนปัจจุบันอีกด้วย

อลูมิเนียมกับสนิม

ในบรรดาโลหะที่มีประโยชน์ใช้สอยได้มากในปัจจุบันเห็นจะต้องจัดอลูมิเนียมไว้ในอันดับต้น ๆ แน่แน่นอน ถ้าไม่เชื่อก็ลองสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบ ๆ ตัวดูก็ได้ว่าทำด้วยอลูมิเนียมสักกี่ประเภท ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าโลหะดังกล่าวนี้มีน้ำหนักน้อยแต่แข็งแรงแถมจัดรูปทรงง่ายและที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นสนิมผุกร่อนง่าย ๆ เหมือนเหล็ก แต่ถ้ามองอลูมิเนียมให้ซึ่งด้วยสายตานักเคมีแล้วจะเห็นว่าอลูมิเนียมน่าจะเป็นโลหะที่ว่องไวปฏิกิริยาอย่างยิ่งชนิดหนึ่งทีเดียว (ดูตารางค่าศักดาไฟฟ้ามาตรฐานแบบ reduction ข้างล่างประกอบ)

Standard Reduction Potentials

Reaction ^a	E°, volts
$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{C})$	1.50
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1.23
$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{C})$	0.80
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-(\text{aq})$	0.40
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{C})$	0.34
$2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	0.00
$\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Sn}(\text{C})$	-0.14
$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{C})$	-0.24
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{C})$	-0.47
$\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{C})$	-0.73
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{C})$	-0.76
$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}(\text{C})$	-1.68
$\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{C})$	-2.36
$\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}(\text{C})$	-2.71


^a The state of the species is indicated by (C), crystalline solid ; (l), liquid ; (aq), aquated ion ; (g), gas.

ที่กล่าวไว้ดังนั้นก็เพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเหล็ก (Fe) กับอลูมิเนียม (Al) จะเห็นว่าเหล็กนั้นมีค่าศักดาไฟฟ้าแค่ -0.47 โวลท์ก็ยังเป็นสนิมผุเอา ๆ อย่างง่ายดาย ส่วนอลูมิเนียมมีค่าศักดาไฟฟ้าถึง -1.68 โวลท์ ก็ยิ่งน่าจะผุกร่อนกลายเป็นกองสนิมไปกับตาเลยทีเดียวนะ ลองมานึกภาพตามลำดับต่อไปนี้ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

1. ถ้าหม้อข้าวหม้อแกงอลูมิเนียมที่กำลังตั้งอยู่บนเตาไฟเกิดผุกร่อนขึ้นมาอย่างกระตันทัน ทั้งข้าวและแกงจะเป็นอย่างไร?
2. ซ้อนอลูมิเนียมที่กำลังใช้ตักอาหารราคาประหยัดจะเข้าปากอยู่แล้วเกิดผุกร่อนเป็นผุยผงเสียกลางอากาศราวกับปาฏิหาริย์
3. ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือเครื่องบินลำโต ๆ ที่จอดเอาไว้กลับเหลือแต่โครงวัสดุปนกับฝุ่นสนิมอลูมิเนียมกองพะเนิน และเพื่อไม่ให้หว่าดเสียหายเกินไป จึงของดกล่าวถึงสถานการณ์ที่ผู้โดยสารจะประสบในขณะที่เครื่องบินกำลังแล่นอยู่กลางอากาศในระดับความสูงพอสมควร

ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นอลูมิเนียมไม่ผุกร่อนรวดเร็วอย่างที่คิดและฝันร้ายอย่างที่กล่าวข้างต้นก็ยังไม่เกิดขึ้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? คำตอบก็คงจะเข้าทำนองดังคำโบราณที่ว่า “ในความไม่มีอะไร ย่อมจะมีอะไรอยู่” (ซึ่งถ้าดัดแปลงให้ทันสมัยของรัฐบาลนี้เสียหน่อยก็จะได้ว่า “ในความไม่มีปัญหาย่อมจะมีปัญหา-เยอะเยอะเลย”) นั่นก็คือว่าอลูมิเนียมที่เราเห็นกันอยู่ทุกที่ทุกวันนี้ แท้จริงแล้วเป็นสนิมห่อหุ้มทั้งชิ้น ในสภาพตามธรรมชาติเราจะไม่เห็น “เนื้อใน” ของอลูมิเนียมเลย เพราะมันขึ้นสนิมรวดเร็วจริงตรงตามที่ทำนายจากการพิจารณาค่าศักย์ไฟฟ้าที่กล่าวมาแล้วทุกประการ เหตุที่ไม่ผุกร่อนเหมือนเหล็กก็เพราะสนิมอลูมิเนียม (อลูมิเนียมออกไซด์) นั้นยังเอื้อมีลักษณะเชิงโครงสร้างเหมือนกับของโลหะอลูมิเนียมมากเสียจนชั้นสนิมนี้เชื่อมประสานกับชั้นอะตอมของโลหะอลูมิเนียมส่วนที่เป็นผิวหน้าได้แนบสนิทยิ่งนักจนคล้ายกับว่าเป็นเสมือน “ผิวหนัง” ที่คอยปกคลุมป้องกันเนื้อโลหะนั่นเอง แม้จะนำไปแช่น้ำก็ไม่หลุดลอกออกแต่อย่างใดเพราะสนิมอลูมิเนียมไม่ละลายน้ำ สิ่งที่อลูมิเนียมกลัวที่สุดคือ อีออนคลอไรด์ (chloride ion) อย่างที่อยู่ในน้ำเกลือหรือของที่มีรสเค็มนั่นแหละ ถ้าลองแช่หม้ออลูมิเนียมไว้ในน้ำเกลือสักพักไม่นานนักจะพบว่าหม้อจะเป็นรูพรุนเนื่องจากเชื่อกันว่าอีออนคลอไรด์เข้าไปแทรกตัวอยู่ในชั้นสนิมอลูมิเนียมจนเกิดเป็นจุดอ่อนและทำให้ “ผิวหนัง” แตกร้าวเผยให้เห็นเนื้อโลหะที่ไวปฏิกิริยา การผุกร่อนจึงเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

เรามีวิธีที่จะพิสูจน์ได้ว่าโลหะอลูมิเนียมนี้ไวปฏิกิริยาจริงและชั้นสนิม (อลูมิเนียมออกไซด์) นั้นทำหน้าที่เป็น “ผิวหนัง” ปกคลุมป้องกันภัยได้จริงโดยทำให้ “ผิวหนัง” ของมันไม่สามารถคลุมติดอยู่กับเนื้อโลหะได้อย่างเคยเสียก่อน วิธีทำก็คือนำชิ้นอลูมิเนียมมาขัดด้วยฝอยเหล็กเพื่อให้สิ่งที่คลุมผิวนอกหลุดออกเหลือแต่เนื้อโลหะจริง ๆ แล้วทำด้วยสารละลาย mercuric nitrate ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$) สักครู่เดียวจะเห็นบริเวณที่ทาจะมีผงสีขาวปนเทาผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วร่วงหล่นไปเป็นผง ๆ และชั้นโลหะก็จะร้อนขึ้นจนบางครั้งจับต้องไม่ได้ด้วยซ้ำไป เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเกลือปรอทจะทำปฏิกิริยากับโลหะอลูมิเนียมและถูกรีดิวซ์ (reduce) ไปเป็นโลหะปรอทที่เข้ารวมตัวกับเนื้อโลหะอลูมิเนียมอีกต่อหนึ่งทำให้ได้โลหะผสมแบบที่เรียกกันว่า amalgamated alloy เมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะการเรียงตัวของอะตอมโลหะบนชั้นหน้าจะแตกต่างกับชั้นสนิมจนทำให้ชั้นสนิมไม่สามารถเชื่อมติดอยู่ได้อีกต่อไปจึงหลุดร่วงออกพร้อมทั้งเปิดเนื้อโลหะให้ทำปฏิกิริยากับความชื้นและออกซิเจนในอากาศอย่างต่อเนื่อง เราจึงเห็นผงสนิมหลุดร่วงออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง




วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน

*ยุคดี วัฒนโกศลสิน


๐ สีผสมอาหาร ๐

ปัจจุบันวิธีการดำรงชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหาร เรามักจะพบเสมอว่าอาหารหลายชนิดมีสีสรรสวยงามชวนให้น่ารับประทาน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการรับประทานอาหารเหล่านั้นด้วยว่าสีที่ใช้ในการผสมอาหารจะมีโทษต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร


ในปีค.ศ.1984 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA; Food and Drug Administration) ได้รับรองสีที่ใช้ในการผสมอาหาร ซึ่งจำแนกได้เป็น 7 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 1.




FD&C Red No. 3
Erythrosine




FD&C Red No. 40
Allura Red




FD&C Yellow No. 6
Sunset Yellow




FD&C Yellow No. 5
Tartroazine



FD&C Green No. 3
Fast Green FCF




FD&C Blue No. 1
Brilliant Blue FCF




FD&C Blue No. 2
Indigo Carmine

รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างของสีผสมอาหาร

ตัวอย่างของการใช้สีในการผสมอาหารเช่น การย้อมสีของไข่ไก่ในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter Holiday) วิธีการย้อมทั่วๆ ไปคือ นำไข่ดิบหรือไข่ที่ต้มสุกแล้วมาแช่ในสารละลายซึ่งผสมระหว่างน้ำส้อมสายชูกับสีผสมอาหาร (เลือกใช้สีได้ตามความต้องการ) ดังนั้นเพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการย้อมสีหรือการเกาะติดของสีกับเปลือกไข่ ควรพิจารณาถึงส่วนประกอบทางเคมีของเปลือกไข่และสูตรโครงสร้างของสีย้อม พบว่าเปลือกไข่ประกอบด้วย *calcite* ซึ่งเป็นรูปผลึกชนิดหนึ่งของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีนที่มีลักษณะเป็นชั้นบางๆ เกาะติดอยู่ ส่วนสูตรโครงสร้างของสีผสมอาหารดังที่แสดงในรูปที่ 1 นั้น เป็นสีที่ออกฤทธิ์เป็นกรดคือมีประจุลบ (anion) เนื่องจากมีหมู่ซัลโฟเนต ($-SO_3^-$) อยู่ จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าโมเลกุลเหล่านี้สามารถประพติดตัวเป็นสีย้อมได้โดยตรง และเกิดพันธะเคมีกับเปลือกของไข่ซึ่งมีประจุเป็นบวก (cation) โดยผ่านพันธะเคมีที่เรียกว่า Salt linkage (รูปที่ 2)



เหตุผลในการสนับสนุนการเกิด Salt linkage คือการสังเกตปริมาณของสีที่เกาะติดบนเปลือกไข่เพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณของกรดในสารละลายเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าที่ค่าความเป็นกรดต่าง ๆ (สภาวะเป็นกรด) หมู่อะมิโน ($-NH_2$) จะอยู่ในรูป $-NH_3^+$ เพียงพอในสายโพลีเปปไทด์ของโปรตีนสำหรับการเกิด Salt linkage ส่วนในสภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นด่างนั้น หมู่อะมิโนในสายโพลีเปปไทด์ของโปรตีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็น $-NH_2$ ได้น้อยมาก โดยสังเกตได้จากการเกาะติดของสีบนเปลือกไข่จะจางลง (รูปที่ 3)



รูปที่ 3 แสดงปริมาณของสีที่เกาะติดบนเปลือกไข่ได้โดยกรมแปรเปลี่ยนค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายที่ใช้ในการย้อมสีให้อยู่ในช่วง 1-12 (pH 1-12)

การเติมเกลือแกง (NaCl) ลงในสารละลายที่ใช้ในการย้อมสีนั้นพบว่าจะทำให้การดูดซับของสีกับเปลือกไข่เกิดได้น้อยเป็นเพราะว่า เกลือแกงจะไปลดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสีย้อมกับเปลือกไข่ทำให้สีย้อมตกตะกอนลงมา

หนังสืออ้างอิง

Mebane, R.C. and Rybolt, T.R. "Chemistry in The Dyeing of Eggs" *J. of Chemistry Education*. 64, 291-293, 1987.

• แก้วคำผิดในวารสารฉบับที่ 3 ปีที่ 16 •

หน้า 132 ตารางที่ 1 เรื่อง ยังจะใช้ *Eugenia* กับพืชสกุลชมพูอีกหรือ

คำผิด		<i>Acmena</i>
ชื่อท้องถิ่น	<i>Eugenia sensu stricto</i>	<i>Cleistocalyx</i>
		<i>Eugenia sensu lato</i>
		<i>Syzygium</i>
แก้เป็น		
ชื่อท้องถิ่น	<i>Eugenia sensu lato</i>	<i>Acmena</i>
		<i>Cleistocalyx</i>
		<i>Eugenia sensu stricto</i>
		<i>Syzygium</i>

หน้าที่ บรรทัดที่

132 2 จากข้างล่าง

คำผิด

Syzygium abortivum Merr. & Perry. (Gagnep.)

แก้เป็น

Syzygium abortivum (Gagnep.) Merr. & Perry.

คำผิด

S. attenuatum (Miq) Merr. & Perry.

แก้เป็น

S. attenuatum (Miq.) Merr. & Perry.

คำผิด

S. syzygioides (Miq.) Merr. & Perry.

แก้เป็น

S. syzygioides (Miq.) Merr. & Perry.

132 1 จากข้างล่าง

133 ข้อ 13

เคมี...

บริโภคน และ อุปโภค

*เฉลิม เรื่องวิริยะชัย

๑ ตอน...ไข่นิโกร ๑

ในห้องครัว ขณะนั้นนางเป้งกำลัง...

เจ้าป่อง : แม่ ! แม่ ! กำลังทำอะไรอยู่ครับ

นางเป้ง : กำลังทอดไข่เจียวอยู่ สำหรับมือเช้านี้จ๊ะ

เจ้าป่อง : ไข่เจียวกำลังฟู...ใหญ่ สวยน่าห่ม่าจัง แม่ใช้น้ำมันอะไรหรือครับ

นางเป้งเดินไปหยิบขวดน้ำมันพืชแล้วพูดว่า...

“นี่น้ำมันพืช หาซื้อได้ง่ายและสะดวกคือน้ำมันหมู นอกจากนั้นน้ำมันพืชยังช่วยลดปริมาณสารโคเลสเตอรอล ที่เป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดตีตันอีกด้วย”

เจ้าป่อง : เอ ! แล้วน้ำมันพืชที่มีขายกันอยู่ มีกี่ชนิดครับ

นางเป้ง : ก็มีอยู่หลายชนิด เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วลิสง แล้วก็ยังมีน้ำมันพืชผสม

เจ้าป่อง : มันมีเยอะแบบนี้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า...เป็นน้ำมันพืชที่ดี

นางเป้ง : อ้อ ! น้ำมันพืชที่ดี โดยปกติจะมีลักษณะดังนี้คือ ไม่มีกลิ่นหืน ไม่ปราศจากตะกอน มีสีเหลืองพอประมาณ และมีกลิ่นหอมของเมล็ดพืชที่ใช้ทำด้วย

เจ้าป่อง : เอ ! แล้วกลิ่นหืนที่ว่ามัน เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ

นางเป้ง : ก็อย่างนี้ ปกติแล้วน้ำมันพืชจะมีปฏิกิริยาไวต่ออากาศ จึงทำให้น้ำมันมีคุณภาพเสื่อมลงและมีกลิ่นหืนเร็วขึ้นไง ดังนั้นหลังจากเปิดใช้แล้วทุกครั้ง จึงต้องรีบปิดจุกให้แน่นทันที และถ้าให้ดียิ่งขึ้น ควรเก็บไว้ในที่เย็น ก็จะยิ่งทำให้การเสื่อมคุณภาพของน้ำมันช้าลงด้วย

เจ้าป่อง : อ้อ ! อย่างนี้นั่นเอง ป่องเข้าใจ แต่...เอ๊ะ !

นางเป้ง : มีอะไรหรือลูก

เจ้าป่อง : ป่องรู้สึกจะได้กลิ่นอะไรไหมๆ นะ

นางเป้ง : เออ ! ไร ! ไร...ไร...


เจ้าป่อง : ไข่เจียว ! ไข่เจียวไหม

นางเป้ง : โธ !...กลายเป็นไข่นิโกรไปเสียแล้ว

การเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลา

* สุรลักษณ์ รอดทอง

ปลา จัดได้ว่าเป็นยอดอาหารโปรตีนสำหรับคนส่วนใหญ่ เราสามารถเลือกรับประทานปลาชนิดที่ถูกใจมากที่สุดได้ เนื่องจากปลามีมากมายหลายชนิดที่ให้รสชาติแตกต่างกันตามชนิดและปริมาณมากน้อยของกรดอะมิโนอิสระ (free amino acid) ที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อปลาและราคาของเนื้อปลาก็มีตั้งแต่ราคาต่ำจนถึงราคาสูงกว่าเนื้อหมู วัว หรือสัตว์ปีก สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน สมควรอย่างยิ่งที่จะรับประทานปลาเป็นอาหารโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ชนิดอื่น เนื่องจากส่วนประกอบของเนื้อปลา ซึ่งนอกจากจะมีโปรตีนในปริมาณสูง (ประมาณ 12-26 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย) เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแล้ว ยังมีไขมันในปริมาณต่ำกว่าไขมันที่มีในเนื้อหมู วัวหรือสัตว์ปีก และเป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) ปริมาณสูงกว่าที่พบในเนื้อสัตว์ชนิดอื่นและเป็นปริมาณที่สูงกว่ากรดไขมันที่อิ่มตัว (saturated fatty acid) ที่พบในเนื้อปลานั้น และไม่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบของเนื้อปลาเลย แต่มีข้อควรคำนึงสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อปลาในแง่ที่ว่า เนื้อปลาเกิดการเสียได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเนื้อหมู วัว หรือสัตว์ปีก เนื่องจากเอนไซม์ทำให้เกิดการย่อยตัวเองเร็ว ไขมันเกิดการเหม็นหืนเนื่องจากออกซิเจน



หรือเนื่องจากน้ำได้ง่าย จากนั้นจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่กับเนื้อปลาจะเข้าทำลายเนื้อปลาอย่างรวดเร็วทำให้คุณภาพของเนื้อปลาเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเสียของเนื้อปลาขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลาสดจะเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือคนข้างเคียงที่ชอบรับประทานปลา

หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อเนื้อปลา :

ปลาสดทั้งตัวจะมีสิ่งแสดงให้เห็นคือ เหงือกมีสีแดงสด ซึ่งตามปกติจะปิดสนิทและไม่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ลูกตาจะใสและดำกลมรวมทั้งมีม่านตาใสเกล็ดติดแน่นเป็นระเบียบ หนังจะมีเมือกที่ปราศจากกลิ่นเหม็น เลือดปลามีสีแดงสด เมื่อ

* อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปล่อยปลาลงไปในน้ำปลาจะจม เครื่องในไม่มีกลิ่นที่นำรังเกียจ เมื่อจับดูจะรู้สึกว่เนื้อปลาไม่ฉุน และไม่ยุ่ย มีความเหนียวจากหัวถึงหาง และเนื้อจะติดแน่นถึงกระดูกเมื่อแต่เนื้อออก

ปลาเสียจะมีลักษณะดังนี้ ตัวปลาซีด เหงือกมีสีเทาและมีกลิ่นผิดปกติลูกตาจะขุ่นและไม่เต็มเบ้าตา เกล็ดแห้งแข็งและขุ่นไม่เป็นมัน เมื่อเอานิ้วมือกดลงไปบนเนื้อปลาจะมีรอยบุ๋ม และเนื้อยุ่ยและหลุดออกจากกระดูกได้ง่าย ซึ่งถ้าเป็นปลาที่ชำแหละแล้วให้สังเกตจากลักษณะของเนื้อที่ยุบลงเมื่อใช้นิ้วกด และกลิ่นที่ผิดปกติอาจเป็นกลิ่นเหม็นหืนของไขมัน หรือกลิ่นเหม็นเนื่องจากจุลินทรีย์ย่อยโปรตีนแล้วให้ไตรเมทิลลามีน (trimethylamine) แอมโมเนีย อะมีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมอเคพแทน (mercaptan) และอินโดล

การเก็บรักษาเนื้อปลา :

ในที่นี้จะกล่าวถึงการเก็บรักษาคุณภาพของเนื้อปลาสดโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้บริโภคนิยมใช้กันเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย แต่ใคร่ขอเน้นถึงระดับอุณหภูมิที่ควรใช้เก็บรักษาปลาสดว่า อุณหภูมิระดับใดจะสามารถลดการเสื่อมเสียของเนื้อปลาได้นานที่สุด ซึ่งจากที่กล่าวแล้วว่าปลาเป็นอาหารที่เสียง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น เนื่องจากเอนไซม์ทำให้เกิดการย่อยตัวเองเร็ว ซึ่งโดยปกติจะเกิดภายหลังปลาตายเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ไขมันเกิดการเหม็นหืนง่าย และเกิดการเสียมากขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียของเนื้อปลาสดคือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในปลา ชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในปลาขึ้นอยู่กับ น้ำที่ปลาอาศัยอยู่ คนจับปลา เรือ ภาชนะบรรจุ เครื่องมือที่ใช้ในการชำแหละ กรรมวิธีที่ใช้ในการชำแหละ การล้าง และการขนส่ง


จุลินทรีย์ที่พบว่ามีปนเปื้อนอยู่กับปลาส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย ซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเมือกบนตัวปลา เหงือก และลำไส้ ดังนั้นเมื่อซื้อปลามาควรแช่ตัวปลาในน้ำสะอาดสักครู่ แล้วล้างบริเวณเหงือก และลำตัวให้สะอาด เพื่อลดจำนวนแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในปลา และควรชำแหละแยกเป็นสัดส่วน นำไปเก็บที่อุณหภูมิต่ำเพื่อควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ และยับยั้งการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเนื้อปลา ระดับอุณหภูมิที่สามารถเก็บรักษาเนื้อปลาได้เริ่มตั้งแต่อุณหภูมิระดับต่ำเย็น คือประมาณ 4-12 องศาเซลเซียส ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเก็บเนื้อปลาได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ ยิ่งอุณหภูมิสูงอายุการเก็บจะสั้น เนื่องจากช่วงอุณหภูมิดังกล่าวยังมีการเจริญของแบคทีเรีย ซึ่งสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิที่ต่ำตลอดเวลา ที่พบมากได้แก่แบคทีเรียในสกุล *Achromobacter*, *Alcaligenes*, *Flavobacterium* และ *Pseudomonas* อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเนื้อปลา โดยทั่วไปควรต่ำประมาณ 0-1 องศาเซลเซียส และควรเก็บที่อุณหภูมินี้ทันทีหลังจากทำความสะอาดปลาแล้ว จะสามารถเก็บรักษาคุณภาพของปลาได้นานกว่าที่อุณหภูมิระดับต่ำเย็น ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา ซึ่งถ้าเป็นปลาที่มีไขมันน้อยจะเก็บได้นาน เนื่องจากระดับอุณหภูมิในช่วงดังกล่าวยังพบว่าไขมันเกิดการเหม็นหืนได้เนื่องจากออกซิเจน และถ้าต้องการเก็บรักษาเนื้อปลาสดให้อยู่ได้นานหลายเดือน ควรเก็บแบบแช่แข็งที่ระดับอุณหภูมิ - 18 องศาเซลเซียส สามารถลดการเสียของเนื้อปลาได้เฉลี่ยอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาอีกเช่นกัน ถ้าเป็นปลาที่มีไขมันน้อยจะเก็บได้นาน ที่อุณหภูมิ -34.4 องศาเซลเซียสจึงจะสามารถป้องกันการเหม็นหืนของเนื้อปลาได้

กล่าวโดยสรุปได้ว่าเนื้อปลาสดสามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิต่ำหลายระดับแต่ละระดับอุณหภูมิก็มีอายุการเก็บต่างกัน ผู้บริโภคหรือผู้จำหน่ายเนื้อปลาสามารถกระทำได้ตามความต้องการ



บรรณานุกรม

- พัฒน์ สุจำนงค์. 2526. การสุขาภิบาลอาหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพรววิทยา.
- Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. 1978. **Food Microbiology**. New York : McGraw-Hill Book Company.
- Medved, E. 1986. **Food Preparation and Theory**. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Pearson, D. 1971. **The Chemical Analysis of Foods**. New York : Chemical Publishing Company, Inc.



แก้คำผิดในวารสารฉบับที่ 3 ปีที่ 16

เรื่อง คำบรรยายภาพปกหน้าและปกหลัง

บรรทัดที่	คำผิด	แก้เป็น
10	พ.ศ.2524	พ.ศ.2454
12	ประนอม จันทรโณทัย บรรยาย	ประนอม จันทรโณทัย บรรยาย และถ่ายภาพ

มะละกอ : พืชสารพัดประโยชน์

* รัชณี นวราช

ถ้าเอ่ยถึงคำว่ามะละกอ คงจะไม่มีใครที่จะบอกว่าไม่รู้จัก เพราะเป็นพืชที่เราพบเห็นได้ทั่วไป และผลดิบก็สามารถที่จะนำมาทำส้มตำได้ ดังนั้น จะไม่ขอก้าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะละกอ แต่จะกล่าวถึงเฉพาะประโยชน์และความ เป็นพืชที่จะได้รับจากทั้งต้นและผลของมะละกอ

มะละกามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Carica papaya* L. อยู่ใน Family Caricaceae ถึงแม้ว่ามะละกอจะไม่ใช่พืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทย แต่ก็ถูกนำเข้ามาปลูกนานจนกลายเป็นพืชพื้นเมืองของไทยไปแล้ว ขณะเดียวกันก็จะเกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ ทั้งจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศและการผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นภายในประเทศไทย ปัจจุบันพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลูกผสมจากพันธุ์ต่างประเทศ หาพันธุ์แท้ได้ยาก เพราะโดยธรรมชาติของมะละกอนั้นจะมีการผสมข้ามต้น ข้ามดอกได้ง่าย จึงทำให้กลายพันธุ์ไป และการขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติมากกว่าที่จะใช้วิธีอื่น จึงทำให้มะละกอกลายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการที่จะคัดพันธุ์ปลูกวิธีที่ดีที่สุดคือ คัดจากผลโดยเอาเมล็ดจากผลที่เราต้องการไปเพาะให้ได้ต้นใหม่ ปัจจุบันบ้านเรามีพันธุ์มะละกอมากมาย แต่ละพันธุ์ก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ชื่อเรียกพันธุ์ต่าง ๆ ก็มากทั้งเป็นที่รู้จักกันในท้องถิ่นและทั้งประเทศ ประโยชน์ของมะละกอที่จะขอก้าวถึงคือ

ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ

มะละกอไม่ว่าจะเป็นผลดิบหรือผลสุกก็ตาม มีธาตุอาหารและวิตามินเหล่านี้สูงคือ ธาตุเหล็ก (บำรุงเลือด) ธาตุแคลเซียม (บำรุงกระดูก) วิตามินเอ (บำรุงสายตา) วิตามินบี (บำรุงประสาท) วิตามินซี (รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน) สำหรับมะละกอสุกเรารับประทานเป็นผลไม้ แต่มะละกอดิบจะนำไปประกอบอาหารคือ ทำส้มตำ ซึ่งเป็นอาหารที่ชอบและรู้จักกันดีของคนในภาคอีสานและภาคอื่น ๆ ด้วยนอกจากนี้ยังใช้ประกอบอาหารอย่างอื่นได้อีก เช่น แกงส้ม ใช้ผัดแทนผัก และยังใช้ในอุตสาหกรรมการทำอาหารอื่น ๆ



* อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม

มะละกอนอกจากเรานำมาบริโภคได้ทั้งผลดิบและผลสุกในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยางมะละกอยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อบรรดาแม่บ้านทั้งหลายและต่ออุตสาหกรรมหลายๆ อย่าง เพราะในยางมะละกามีสารปาเปน (papain) เป็นเอนไซม์ที่มีความสมบัติในการช่วยย่อยโปรตีน (proteolytic enzyme) พบสารชนิดนี้อยู่ในยางมะละกอของทุกส่วนมะละกอไม่ว่าจะเป็น ต้น ผล ใบ ส่วนที่พบมากที่สุดคือผลดิบ บรรดาแม่บ้านทั้งหลายจะรู้จักสารปาเปนอยู่ในรูปของผงเปียก ลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้หมักอาหารพวกเนื้อและปลา มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้สารปาเปนยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายๆ อย่าง เช่น



อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ผู้บริโภคทั่วไปนิยมอาหารเนื้อที่นุ่ม ดังนั้นบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องทั้งหลาย จึงนิยมใช้สารปาเปนเป็นส่วนผสมในอาหารจำพวกเนื้อ เนื่องจากว่าสารปาเปนนี้จะไม่เป็นพิษต่อร่างกายเหมือนสารเคมีอื่นๆ แต่จะต้องใส่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้เนื้อยุ่ยเป็นชิ้นเล็ก ๆ

อุตสาหกรรมทำเบียร์ ใช้สารปาเปนเป็นส่วนผสมในการหมักเบียร์ทำให้โปรตีนในเบียร์ตกตะกอน ทำให้เบียร์ใส ถึงแม้ว่าจะเก็บไว้นานก็ยังคงใสเหมือนเดิม

อุตสาหกรรมฟอกหนัง ใช้สารปาเปนในการฟอกหนัง เพื่อช่วยให้หนังอ่อนนุ่ม

อุตสาหกรรมการทำยาสีฟัน ใช้สารปาเปนเป็นส่วนผสม

อุตสาหกรรมการทำขนมปัง นม เนย หมากฝรั่ง ใช้สารปาเปนเป็นส่วนผสม

นอกจากปาเปนจากยางมะละกอแล้ว ส่วนอื่นๆ ของมะละกอได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่างได้แก่

ผลมะละกอดิบ เช่น อุตสาหกรรมการทำผักดอง, อุตสาหกรรมผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ

เปลือกมะละกอ เช่น อุตสาหกรรมทำสีผสมอาหาร, อุตสาหกรรมผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ

ผลมะละกอสุก เช่น อุตสาหกรรมทำน้ำผลไม้, อุตสาหกรรมผลิตแยม ฯลฯ

ประเทศที่ผลิตสารปาเปนเป็นอุตสาหกรรมใหญ่จะมีพันธุ์มะละกอเพื่อผลิตยางโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับพันธุ์กินผลดิบและผลสุก ประเทศที่ผลิตสารปาเปนได้มากได้แก่ ประเทศศรีลังกา อัฟริกาตะวันออก คองโก ประเทศที่ใช้สารปาเปนเพื่ออุตสาหกรรมมากที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

และญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยยังขาดสารปาเปนอย่างมาก เพิ่งจะมีการเริ่มต้นศึกษาหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ยังไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังนัก พันธุ์มะละกอสําหรับผลิตสารปาเปนโดยเฉพาะก็ยังไม่มีความสนใจในปัจจุบันจะใช้พันธุ์แขกดำ การปลูกมะละกอสํานวนใหญ่บ้านเราจะมุ่งใช้ผลเป็นหลัก ดังนั้นในแต่ละปีประเทศไทยจึงต้องสั่งซื้อสารปาเปนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมิใช่น้อย หากได้มีการศึกษาและประสานงานกันระหว่างผู้ปลูก ผู้บริโภคและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์มะละกอให้สามารถใช้ทุกส่วนได้เป็นอย่างดี คาดว่าประเทศไทยก็น่าจะประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ทางเภสัชกรรม

ประโยชน์ที่ทุกคนอาจจะมองข้ามคือประโยชน์ทางเภสัชกรรม ส่วนที่นำมาใช้คือ ยางจากใบ ผล ยอดอ่อน ลำต้น ผลดิบ ผลสุก เมล็ดแก่ สารที่สำคัญคือ ยางจากส่วนต่าง ๆ ของมะละกอก็จะมีสารปาเปนดังกล่าวแล้วนอกจากนี้ในใบยังมี ไกลโคไซด์ (glycoside) ชื่อ คาร์โปไซด์ (Carpoxide) และ อัลคาลอยด์ (alkaloid) คาร์เปอิน (Carpaine) ทั้งผลดิบและผลสุกมีสารพวกเพคติน (pectin) ผลสุกมีสาร คาร์โรทีนอยด์ (Carotenoid) ในเมล็ดมีสารเบนซิล ไอโซไทโอไซเนท (benzyl isothiocyanate) ในรากมีเกลือโพแทสเซียม (Potassium)

ในปัจจุบันมีการศึกษาและค้นพบคุณสมบัติทางเภสัชกรรมของมะละกอมากมายขอนามากล่าวดังนี้

1. อุตสาหกรรมการทำยาใช้สารปาเปนเป็นส่วนผสมในยาระบายและช่วยย่อยอาหารสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะ หรือคนแก่ เพราะคนแก่นั้นร่างกายจะสร้างน้ำย่อยน้อยลง ทำให้อาหาร

ที่รับประทานเข้าไปย่อยไม่หมด เช่น โปรตีน จึงทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะ ทำให้เกิดอาการจุกเสียด สารปาเปนจะทำเป็นยาแผนปัจจุบันช่วยย่อยคือการอยด์ (Caroid) และปาเปส (papase)

2. ในอุตสาหกรรมการทำเครื่องสำอาง ผสมสารปาเปนในเครื่องสำอางช่วยลบรอยฝ้าจุดต่างดําบนใบหน้า

3. รักษาแผลเรื้อรัง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วว่า สารปาเปนรักษาแผลได้ดี เพราะสารปาเปนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ

3.1 ช่วยทำความสะอาดแผลโดยสารปาเปนจะย่อยหนองเนื้อตายได้ดีและเร็ว ย่อยเศษเลือดให้สลายได้ภายใน 5 ชั่วโมง และย่อยหนองให้สลายได้ภายใน 1 วัน

3.2 ยับยั้งเชื้อโรค สารปาเปนในมะละกอยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดทั้งพวกบวมและพวกกลม และยังสมารถทำลายพิษของแบคทีเรียพวกกลมได้ด้วย

3.3 ลดการอักเสบ

วิธีใช้ก็โดยใช้เนื้อมะละกอดิบบดให้ละเอียดพอกที่แผล น้ำคั้นจากผลมะละกอดิบย่อยแต่หนองและเนื้อตายในแผล แต่ไม่ย่อยเนื้อเป็นหรือเนื้อที่ยังดี ๆ แต่ยางมะละกอจะกัดเนื้อเป็นด้วยซึ่งอาจทำให้มีอาการแสบคันได้

4. ห้ามเลือด สารปาเปนทำให้เลือดแข็งตัวขึ้น จึงใช้ห้ามเลือดในบาดแผลสดได้ สารเพคตินที่อยู่ในผลมะละกอช่วยห้ามเลือดเช่นกัน โดยใช้เนื้อผลมะละกอดําพอกแผลช่วยห้ามเลือด

5. ขับพยาธิ ยางและเมล็ดมะละกอบีบพาสีได้หลายชนิดทั้งตัวกลมและตัวแบน แต่ขับพยาธิไส้เดือนได้ดีที่สุด สารที่ออกฤทธิ์ขับพยาธิคือสาร

ปาเปนและสารคาร์ซินที่พบในเมล็ดมะละกอ โดยใช้เมล็ดมะละกอกั่วบดละลายน้ำผึ้งกิน มีรสชาติเหมือนยาหอม นอกจากในเมล็ดและยางแล้ว ในใบมีสารคาร์โบไฮเดรตที่มีฤทธิ์ขับพยาธิได้เช่นเดียวกัน

6. ขับปัสสาวะ รากหรือเหง้ามะละกอมีกาเณอของโปแตสเซียมมาก เกลื่อนี้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแต่อ่อนกว่ากันมากและมีพิษน้อยกว่ามากด้วย (ไดจิติลิส เป็นยาบำรุงหัวใจที่ใช้มาก ช่วยให้หัวใจมีแรงบีบตัวและความคุมหัวใจให้เด่นสม่ำเสมอ) สารคาร์เปอีน มีรสขมมากมีอยู่ในใบแก่มากกว่าใบอ่อนมีเล็กน้อยใน ยาง ผล และ ราก

7. อัลคาลอยด์ คาร์เปอีน ในใบมะละกอมีกฤทธิ์คล้ายยาบำรุงหัวใจไดจิติลิส (digitilis) แต่อ่อนกว่ากันมากและมีพิษน้อยกว่ามากด้วย (ไดจิติลิส เป็นยาบำรุงหัวใจที่ใช้มาก ช่วยให้หัวใจมีแรงบีบตัวและความคุมหัวใจให้เด่นสม่ำเสมอ) สารคาร์เปอีน มีรสขมมากมีอยู่ในใบแก่มากกว่าใบอ่อนมีเล็กน้อยในยาง ผล และราก

8. สารปาเปน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้

9. ยับยั้งเนื้องอก พบว่า สารคาร์เปอีน ที่สกัดได้จากใบมะละกอมีกฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกได้และยับยั้งมะเร็งในต่อมหน้าเหลืองได้ด้วย

เมื่อรู้จักถึงประโยชน์ของมะละกอ ก็ควรจะมารู้จักความเป็นพิษของมะละกอกันบ้าง

ส่วนต่าง ๆ ของมะละกอที่เป็นพิษมีดังนี้

ยางมะละกอ

ยางมะละกอกัดผิวหนังมาก กินแล้วทำให้คันปาก ดังนั้นกรกินยางมะละกอสด ๆ ควรกินแต่น้อยและเติมน้ำให้เจือจาง ตำราต่างประเทศหลายเล่มเห็นว่าการใช้ยางมะละกอสด ๆ กินเป็นยาขับพยาธินั้นไม่เป็นอันตราย พิษของยางมะละกอนั้นอยู่ที่สารปาเปนดังนี้

1. ทำให้ผิวหนังเป็นตุ่มพองและลอกออกมา
2. ทำให้ผิวหนังคัน
3. ทำลายผนังหลอดอาหาร
4. ทำให้แห้ง มีพิษต่อลูกในท้อง
5. ทำให้เกิดอาการแพ้ โดยจะมีอาการหอบหืด หรือผิวหนังเป็นผื่นคัน

6. ถ้ายางมะละกอเข้าตา จะทำให้ตาบวมแดงและอักเสบได้

ผลมะละกอดิบ

1. กินแล้วทำให้แห้ง พิษนี้จะลดลงเมื่อผลสุกมากขึ้น
2. ทำให้คันคอ ผลมะละกอ ถ้าล้างยางออกไม่หมด กินเข้าไปทำให้คันคอได้

ผลมะละกอสุก

มีผลน้อยมาก บางคนถึงแม้จะกินเข้าไปมากก็ไม่เป็นอะไร แต่ก็มีบางคนที่ยากินมะละกอสุกเข้าไปมาก ๆ แล้วทำให้ท้องเสีย

เมล็ดมะละกอ

ในประเทศอินเดีย ใช้เมล็ดมะละกอกินเป็นยาแก้ท้องผูกอย่างแรง

ใบมะละกอ

สารคาร์เปอีน ในใบมะละกอมีพิษน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วทำให้ชีพจรเต้นช้าลงและกดประสาทสมอง

จะเห็นได้ว่ามะละกามีส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก แต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นพิษ ถึงแม้ว่าจะเป็นพิษที่ไม่ค่อยรุนแรงนักก็ตาม ฉะนั้นการนำมาใช้ก็ควรจะมีการระมัดระวังพอสมควร และยังมีข้อห้ามใช้สำหรับบางคนคือยางมะละกอห้ามใช้กินในคนที่แพ้ หูมีมดลูก คนที่กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นแผล ห้ามกินพร้อมกันกับยาละลายเลือด

เอกสารอ้างอิง

1. กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ "ฐานเกษตรกรรม (เฉพาะกิจที่ 15)". 2530. การปลูกมะละกอ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม.
2. กองบรรณาธิการกลุ่มเกษตรอาสา. 2531. **รวมเรื่องเกี่ยวกับมะละกอ**. พิมพ์ครั้งที่ 1.
3. โครงการสมุนไพรเพื่อพึ่งตนเอง. 2530. จุลสารสารอันดับที่ 13. มะละกอ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอตัสัน เพรส โปรดักส์.
4. ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์. 2527. **มะละกอ**. คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
5. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. 2529. **ตำราวิทยาศาสตร์สมุนไพร**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมติคัล มีเดีย. หน้า 23.
6. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. 2530. **คู่มือการใช้สมุนไพร**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมติคัล มีเดีย. หน้า 67 , 121.
7. วิไล ประเสริฐศรี และคณะ 2525 การศึกษาเบื้องต้นโรคใบด่างมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการประชุมสัมมนาการเกษตร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่าพระ ขอนแก่น.
8. วัฒนา สารรายธิปิติ. 2531. **การปลูกมะละกอ**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตกำแพงแสน.
9. Lehane Brendan. **The Power of Plant**. London : McGraw-Hill Book Co. Ltd. 1977.



พืชปลดปล่อยสารเคมีสู่ สิ่งแวดล้อมเพื่ออะไร

* ศศ.เตือนใจ โกสกุล

สิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต้องการอาหารและออกซิเจน เพื่อการอยู่รอดเกิดการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้นอกเหนือไปจากนี้การอยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม (community) ทำให้เกิดการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหรือเกิดกระทบกระทั่งกันทำให้อีกฝ่ายต้องได้รับความเสียหาย หรือได้รับอันตรายจากการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องมีการต่อสู้หรือแข่งขันหรือแก่งแย่ง (competition) เพื่อความอยู่รอดให้มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมนั้น

การแข่งขันที่เกิดขึ้นในพืชคงจะไม่โดดเด่นตื่นเต้นและสังเกตเห็นได้ชัดเจนเหมือนที่เกิดขึ้นในสัตว์ ซึ่งมีผลทำให้ผู้พ่ายแพ้ได้รับบาดเจ็บ บอบช้ำ หรือจนในที่สุดต้องตายไป การแข่งขันที่เกิดขึ้นในพืชค่อย ๆ ดำเนินไปอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนในทันทีทันใดเช่นที่เกิดขึ้นในสัตว์ การแข่งขัน (competition) ที่เกิดขึ้นในพืชเป็นปฏิกริยาสัมพันธ์ (interaction) ใด ๆ ก็ตามระหว่างพืชชนิดเดียวและ/หรือพืชต่างชนิดกัน ซึ่งผลที่ตามมาทำให้แหล่งอาหารหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่พืชอย่างหนึ่งต้องการมีไม่เพียงพอ

หรือถูกนำออกไปจากบรรยากาศที่ล้อมรอบพืชชนิดนั้นอยู่ ทำให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพืชลดน้อยลง แหล่งอาหาร (plant resources) หรือปัจจัยที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพให้ครบวงจรของพืชนั้น ได้แก่ แสงสว่าง ดิน น้ำ อากาศ ธาตุอาหารที่จำเป็นและอื่น ๆ การแข่งขันที่เห็นได้ชัดในพืช เช่นต้นจันทน์ผา (*Dracaena lourieri*) มักชอบขึ้นอยู่ตามภูเขาหินปูน ไม่ใช่ว่าต้นจันทน์ผาชอบขึ้นในพื้นที่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นบนหินปูน ไม่พบว่าต้นจันทน์ผาขึ้นอยู่ตามดินเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า เป็นเพราะว่ามันไม่สามารถแข่งขันกับพืชชนิดอื่นได้ ในทำนองเดียวกันลูกไม้สนเขา (*Pinus sp.*) มักจะพบตามบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลาย จึงมีพืชพรรณชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นน้อย ไม่ต้องไปแก่งแย่งกับพืชชนิดอื่น

มีปรากฏการณ์อีกรูปแบบหนึ่งของการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นในพืช ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ การแก่งแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชอันจะมีผลเชื่อมโยงทำให้เกิดการเคลื่อนที่หรือการลดลงของปัจจัยที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในทางตรงข้ามทำให้มีการเพิ่มสารประกอบเคมีบางชนิดให้กับ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบอันเนื่องมาจาก ความ เป็นพิษของสารเคมีที่พืชปลดปล่อยนี้ สามารถ ยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือ พืชข้างเคียงทั่วๆ ไป โดยที่ความเป็นพิษจะแสดง ผลระหว่างพืชชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้ และความเป็นพิษนี้จะแสดงผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของสารเคมีที่พืชปลดปล่อย และสะสม อยู่ในดินมากน้อยเพียงใด ลักษณะการยับยั้งการ เจริญเติบโตของพืชอีกชนิดหนึ่งนั้น เรียกปรากฏ- การณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่า ผลของแอลลีโลพาธิ (Allelo- pathy Effect) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พืชสกัดหรือ ปลดปล่อยสารเคมีออกมาสู่สภาพแวดล้อมภายนอก จนมีผลทำให้พืชใกล้เคียงได้รับอันตราย สารเคมี ที่ปลดปล่อยออกมานี้อาจมีพิษ (toxic) จนทำให้ พืชข้างเคียงตายได้ หรือไม่สามารถแพร่กระจาย อยู่ในบริเวณนั้นได้อีกต่อไป สารที่พืชปลดปล่อย ออกมาเรียกว่า allelopathic agent หรือ allelopa- thic substances หรือ allelochemicals หรือ toxins

แอลลีโลพาธิ มาจากภาษากรีกแปลว่า เป็น อันตรายซึ่งกันและกัน (mutual harm) มีผู้ศึกษา การเกิด แอลลีโลพาธิมานานแล้ว ตั้งแต่ปีค.ศ. 1832 โดย De Candolle แต่ไม่ได้มีการนำผลการ ศึกษามาตีพิมพ์ จึงไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ จนใน ปีค.ศ.1980 Muller และ Rice ได้ทำการศึกษา ปฏิกริยาสัมพันธ์ทางเคมี (chemical interaction) ของพืช และได้ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ว่า ต้นไม้ มีการสร้างสารเคมีออกมา ซึ่งมีผลต่อพืชข้างเคียง

ปรากฏการณ์ในการปลดปล่อยสารเคมีสู่ บรรยากาศหรือลงสู่ดิน พบแต่เฉพาะในพืชชั้นสูง (vascular plant) เท่านั้น ส่วนพืชชั้นต่ำ (lower plant) เข้ามาเกี่ยวข้องทางอ้อม โดยที่จุลชีพที่อยู่ในดินจะเมตาโบไลซ์สารเคมีที่พืชผลิตออกมา การ


ที่พืชปลดปล่อยสารเคมีนี้เป็นความพยายามของพืช ชนิดหนึ่งที่จะกำจัดพืชชนิดอื่นที่อยู่ใกล้เคียง สารเคมีเหล่านี้จะค่อยๆ ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างช้าๆ ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาทางชีว- เคมีมีผลทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชอื่น หรือ อาจเกิดผลประโยชน์ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว อัลลีโลพาธิลมักจะเป็นคำอธิบายอิทธิพลในด้านการ ทำลายของพืชชนิดหนึ่งที่มีว่าจะเกิดผลโดยตรง หรือทางอ้อมด้วยวิธีการผลิตสารเคมีขึ้นมาแล้ว ปลดปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อม

กลไกป้องกันโดยการสร้างสารเคมี (chemical defense mechanisms) เกิดขึ้นในพืชชนิดเดียว ในพืชต่างชนิดหรือแม้แต่ในพืชที่มีลักษณะนิสัย (habit) ต่างกันเช่น ระหว่างไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น กับไม้ล้มลุกหรือพืชในตระกูลหญ้า สารเคมีที่พืช ปลดปล่อยออกมานั้นเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้าง แบบง่าย ๆ มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเคมี เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปสารระเหยของสารประกอบ พวกเทอร์ปีนอยด์ และฟีนอลิก (volatile terpe- noids และ phenolic substances)

สารประกอบแอลลีโลพาธิ (allelopathic substances) ตัวแรกที่ถูกแยกออกมาคือ 3-acetyl-6-methoxy benzaldehyde โดย R.Gray และ J. Bonner ในปี ค.ศ. 1984 จากส่วนใบของต้น *Eucelia farinosa* ซึ่งเป็นไม้พุ่มเจริญอยู่ในเขตทะเล- ทรายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สารชนิดนี้ถูกชะล้าง ออกจากใบลงสู่ดินในบริเวณใต้พุ่มของเรือนยอด ด้วยเหตุนี้จึงไม่พบลูกไม้ของพืชชนิดอื่นเลย มีพืชอีกชนิดหนึ่งอยู่ในทะเลทรายเช่นกัน คือ *Parthenium argentatum* แต่มีการสร้างสารพิษที่ รากแล้วลงสู่ดินโดยตรง สารพิษที่สร้างคือ trans- cinnamic acid สารชนิดนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ พืชชนิดแรก ที่ช่วยป้องกันไม่ให้พืชชนิดอื่น

หรือพืชชนิดเดียวกัน เข้ามารุกรานได้ การเกิด
แอลลีโลพาธี ในเขตทะเลทรายทำให้พืชนั้นได้รับ
ประโยชน์หรือได้เปรียบกว่าพืชชนิดอื่น กล่าวคือ
ในเขตทะเลทรายมีการแข่งขันแย่งน้ำ และความ
ชื้นสูงมาก การเกิดแอลลีโลพาธีจึงช่วยลด

การแย่งน้ำและความชื้นของพืชที่อยู่ใกล้เคียง
กันได้ โดยป้องกันไม่ให้ต้นพืชมาอยู่ติดกันมาก
เกินไปจนอาจจะเป็นเหตุให้การกระจายของเรื้อน
รากแย่งแย่งกันได้ (ดูรูปที่ 1)




พื้นที่ว่างที่เกิดจากสารเคมีสะสมในดินทำให้
พืชชนิดอื่นขึ้นไม่ได้

รูปที่ 1 การเกิดแอลลีโลพาธีโดยไม้พุ่มสร้างสารเคมีทำให้พืชตระกูลถั่วขึ้นไม่ได้ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเกิดแอลลีโลพาธีระหว่างไม้พุ่ม *Salvia leucophylla* กับพืชตระกูลหญ้า *Artemisia californica* ที่ชายฝั่งด้านเหนือ เมืองลอสแอนเจลิส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการศึกษาของ Cornelius Muller และผู้ร่วมงาน พบว่ามีสารระเหยเทอร์พีนส์ (volatile terpenes) สร้างจากใบถูกชะล้างลงสู่ดินรอบๆ เรือนยอดของต้น สารเทอร์พีนส์นี้ส่วนใหญ่เป็นสารพวก cineole และ comphor ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารเทอร์พีนส์พวกนี้สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชตระกูลหญ้า เช่น ข้าวโอ๊ตและ *Avena fatua* เป็นต้น ผลของการสร้างเคมีจากพืชทำให้เกิดกระบวนการ

ทดแทนในสังคมพืช (plant succession) เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร (cyclical changes) ในทุกๆ 25 ปี กล่าวคือ ในช่วงหน้าแล้งเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ ซึ่งไฟนี้จะทำลายสารระเหยเทอร์พีนส์ที่สะสมอยู่ในดินรอบๆ ต้นไม้พุ่ม (*Salvia leucophylla*) มีผลทำให้พืชตระกูลหญ้าและไม้ล้มลุกเกิดขึ้นมากมาย จนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาต่อมาเริ่มเกิดลูกไม้พุ่มเจริญเติบโตและค่อยๆ ปลดปล่อยสารเทอร์พีนส์ต่อต้านการรุกรานของพืชตระกูลหญ้า จนในที่สุดไม้พุ่มก็เจริญเติบโตขยายเรือนยอดเพิ่มขึ้นเหมือนตอนเริ่มแรก ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 การเกิดแอลลีโลพาธีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรของการเกิดการทดแทนในทางนิเวศวิทยา

การเกิดแอลลีโลพาธิไม่ได้เกิดเฉพาะในเขตทะเลทราย แต่ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนปกติจนถึงเขตที่มีฝนตกชุกก็พบด้วยเช่นกัน ตัวอย่างที่พบในต้นวอลนัท (walnut tree, *Juglans regia*) จะสร้าง quinone pigment juglone เป็นสารสีเหลืองพบอยู่ในเปลือกของเมล็ดวอลนัท เมื่อสารนี้ละลายน้ำลงสู่ดิน จะเปลี่ยนจากสารเริ่มต้น hydrojuglone glucoside เกิดปฏิกิริยาทางเคมี (hydrolysis และ oxidation) จนกลายเป็นสารพิษ juglone ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชใกล้เคียงได้ ส่วนป่าผลัดใบชื้น (Deciduous rain forest) ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีต้นก่อ (*Quercus falcata*) เป็นไม้เด่นก็สร้างสารพิษ salicylic acid ซึ่งเป็นพิษต่อพืชข้างเคียง ส่วนในพืชตระกูล Ho-

pea sp. ในประเทศอินโดนีเซีย (ดังรูปที่ 3) แสดงให้เห็นเรือนยอดของต่างต้นไม้เกยกัน และถ้าดูให้ถี่ระหว่างกิ่งในต้นเดียวกันก็ไม่เกยเช่นกัน

ในต้นยูคาลิปตัส (*Eucalytus oil*) พบว่ามีการสร้างสารเคมีที่ใบเรียกว่า Eucalytus oil เป็นน้ำมันระเหยซึ่งประกอบด้วย menthol thymol และ chlorogenic acid ซึ่งเป็นกรดที่ละลายน้ำได้ดี สารเคมีเหล่านี้ยังคงอยู่ที่ใบ เมื่อเกิดการร่วงหล่นทางใบก็จะสะสมอยู่บนผิวดิน สารเคมีเหล่านี้จะสะสมอยู่ในดิน ซึ่งมีคุณสมบัติทำลายจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ทำให้ซากใบไม้เน่าเปื่อย ดังนั้นการปลูกยูคาลิปตัสจึงควรพิจารณาให้ทองแท่งก่อนที่จะนำไปปลูก ณ ที่ใดเพราะพื้นที่นั้นอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกต่อไป



ส่วนของเรือนยอดจะไม่เกยกัน


รูปที่ 3 การเกิดแอลลีโลพาธิของพืชตระกูล Hopea sp. โดยสารระเหยที่สร้างจากใบ ทำให้เรือนยอดของต้นไม้ต่างต้นไม่สามารถเกยกันได้รวมทั้ง ส่วนของกิ่งที่มีก้นแหวกกระจายของใบก็ไม่เกยกันอีกด้วยภายในดินเดียวกัน (ถ่ายจากประเทศอินโดนีเซีย)

อีกแง่หนึ่งของการเกิดอัลลีโลพาธิ ซึ่งให้ผลตรงข้ามกับที่กล่าวมาแล้วโดยที่สารเคมีแทนที่จะทำลายพืชข้างเคียงแต่กลับสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายตัวต้นพืชที่สร้างขึ้นมาเอง จึงเรียกการเกิดแบบนี้ว่า autotoxicity ซึ่งการเกิดลักษณะนี้ทำให้เกิดกระบวนการทดแทนในทางนิเวศวิทยา (ecological succession) สารพิษนี้ส่วนใหญ่มีการสร้างที่ราก เช่น การเกิด autotoxicity ในต้นทานตะวัน (sunflowers) สร้างสารพิษจากรากเป็นวง (fairy ring) รอบ ๆ พื้นที่ที่ขึ้นอยู่จนมีผลทำให้ต้นทานตะวันต้องตายไปในที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้พืชชนิดอื่นรุกราน (invasion) เข้ามาแทนที่ต่อไป

สารพิษที่พืชปลดปล่อยออกมา ซึ่งมีการศึกษาในการเกิดอัลลีโลพาธิ ดังที่กล่าวมาแล้ว พิสูจน์แล้วว่าสารพิษเหล่านี้เป็นสารประกอบประเภท เทอร์ปีนส์ และฟีนอลิกแต่ยังพบว่ามีสารประกอบอื่นอีก เรียกว่า secondary constituent ที่เป็นสารเคมีที่ปลดปล่อยออกมาจากพืชเพื่อป้องกันการรุกรานของพืชใกล้เคียง อาทิเช่น cyanogenic glycoside prunasin ออกมาจากรากของต้นพีท (peach trees) mustard oil sinigrin จาก

ต้น cabbage และสารแอลคาลอยด์นิโคตินจากรากของต้นยาสูบ จะเห็นได้ว่าการเกิดอัลลีโลพาธิเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป (universal phenomena) ในพืชและในสังคมพืชดูเหมือนว่าสารพิษที่พืชสร้างขึ้นมามีแตกต่างกันไป เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดได้ในสังคมพืชนั้น ซึ่งเป็นผลทำให้พืชมีความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในสังคมพืช

เนื่องจากสารเคมีที่พืชสร้างขึ้นอาจจะอยู่ในรูปสารระเหยหรือสารเคมีที่ปลดปล่อยออกมาแล้วละลายไปกับน้ำ แล้วมีผลต่อพืชข้างเคียงสามารถสร้างขึ้นจากส่วนของราก ใบ และเกิดสะสมในดินหรือเปลี่ยนรูปเป็นพิษโดยปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน หรือมีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์เองก่อนที่จะไปมีผลต่อพืชที่รับสารพิษ พืชที่รับสารพิษ (acceptor plants) ซึ่งเป็นสารเคมีที่พืชชนิดหนึ่งผลิตขึ้นมา (donor plants) อาจมีผลต่อธาตุอาหารที่พืชได้รับสารเคมีไม่สามารถนำธาตุอาหารเอาไปใช้ได้ หรือมีผลโดยตรงทำให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับสารเคมี ดังรูปที่ 4 ที่สรุปขั้นตอนต่างๆ ของการเกิดอัลลีโลพาธิในพืช



รูปที่ 4 โดอะแกรมแสดงขั้นตอนต่างๆ ของการเกิดอัลลีโลพาธิ

เอกสารอ้างอิง

Moore, D.M. 1982, *Green Planet : The Story of Plant Life on Earth*. ed. Cambridge University Press, London, 288p.

ปรับราคาแก่นเกษตร

เรียน สมาชิก และท่านผู้อ่านทุกท่าน

เนื่องจากภาวะราคากะดำ และอุปกรณ์การพิมพ์สูงขึ้นกว่าเดิมมาก เกณฑ์ราคา
จึงจำหน่ายเกณฑ์ในราคาต่ำกว่าทุนอยู่แล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับราคาเกณฑ์
จากฉบับที่ 5 ปีที่ 16 (กันยายน - ตุลาคม 2531) เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

အားပေးခြင်း

ថ្ងៃទី ១២ មិថុនា

คำนำรณรงค์

บุคคลทั่วไป 1 ปี

80 ၂၃၇

24

120 បារាំង

3 13

-170- ၁၁၁၁

4 11

220 1577

นักเรียนนักศึกษา

ປີລະ 30 บาท

จงเรียนมาเพื่อทราบ

กองบรรณาธิการ

ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการงอกของสปอร์

Colletotrichum gloeosporioides

ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสของ ถั่วสัไตโล

* ถาวร วินิจสนันท์

บทคัดย่อ

การศึกษามลของอุณหภูมิต่อการงอกของสปอร์เชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* ชนิด Type A และ Type B ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้อาหารวุ้นเข้มข้น 0.25% อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของสปอร์เชื้อราชนิด Type A คือ 30, 20 และ 25°C ที่ 6, 12 และ 24 ชั่วโมงตามลำดับ ส่วนสปอร์เชื้อราชนิด Type B จะงอกได้ดีที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C ในระยะเวลาต่างกัน สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของ germ-tube ของเชื้อราทั้งสองชนิดจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 20-30°C อุณหภูมิดูเหมือนว่าจะมีผลต่อการสร้างอวัยวะ appressorium โดยที่เชื้อราทั้งสองชนิดสร้างอวัยวะนี้ที่อุณหภูมิต่ำ (5-10°C) และอุณหภูมิสูง (35-40°C) เป็นที่น่าสังเกตว่าเชื้อราชนิด Type B สามารถจะงอกและสร้าง appressorium บนอาหารวุ้น 0.25% ได้ดีกว่าเชื้อราชนิด Type A จึงพอที่จะสรุปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการงอกและสร้าง appressorium ของเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* ชนิด Type A และ Type B อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

In vitro studies were made on the effects of temperature on germination of Type A (22260) and Type B (22269) conidia of *Colletotrichum gloeosporioides* using 0.25% water agar. On this medium, the optimum temperatures for conidium germination for the Type A isolate were 30, 20 and 25°C at 6, 12 and 24 h incubation, respectively, and was 30°C at any incubation time for the Type B isolate. The optimum temperatures for germ-tube growth of both types of isolates were in the same range (20-30°C). Appressorial formation of both types of isolates seemed to be greatest at very low (5-10°C) or high (35-40°C) temperatures. It was to note that the type B isolate showed higher percentages in germination and appressorial formation than that of the type A. It was concluded that temperature had significant effects on conidium germination, germ-tube growth and appressorial formation of both Type A and Type B isolates of *C. gloeosporioides*.

คำนำ

เชื้อรา *C. gloeosporioides* สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส (anthracnose) พบครั้งแรกบนถั่วสัไตโลในแปลงทดลองที่ฟลอริดาในปี ค.ศ. 1973 (Sonada, 1973) เชื้อรานี้ทำให้เกิดอาการ

ของโรคบนส่วนต่าง ๆ ของถั่วสัไตโล เช่น ใบย่อย (leaflet), หูใบ (stipule), ช่อดอก (inflorescence), ก้านดอก (peduncle), กิ่งก้าน (branch) และลำต้น (stem) ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น้ำหนักของต้นถั่วลดลงและการผลิตเมล็ดพันธุ์เสียหายอย่างมากมาย นอกจากจะพบที่ฟลอริดาแล้ว ยังพบโรคนี้ในแหล่งปลูกถั่วสัตโลต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย (Irwin และ Cameron, 1978); อเมริกาใต้ (Baldion et al., 1975) และประเทศไทย (Vinijsanond, 1976)

ในประเทศออสเตรเลีย Irwin และ Cameron (1978) ได้จำแนกเชื้อราสาเหตุออกเป็น 2 ชนิด (strain) คือ Type A และ Type B โดยอาศัยความแตกต่างทางอาการของโรค รูปร่างและลักษณะทางสรีรวิทยาของเชื้อรา นอกจากนี้ Irwin (ติดต่อส่วนบุคคล) ยังพบอีกว่า เชื้อราชนิดนี้มีถึง 5 สายพันธุ์ (races) 2 สายพันธุ์จาก Type A และ 3 สายพันธุ์จาก Type B

การใช้พันธุ์ต้านทานจัดว่าเป็นวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผลมากที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ทั้งยังไม่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของถั่วสัตโลซึ่งใช้ในการปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในการหาพันธุ์ต้านทานต่อโรคมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพการระบาดของโรค (epidemiology) ข้อมูลทางด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นการศึกษาทดลองหาข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อรา อาจช่วยให้เข้าใจถึงการระบาดของโรค อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของสปอร์ทั้งสองชนิดนี้ (Type A และ Type B) อาจจะแตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้ก็นำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และคัดพันธุ์ถั่วสัตโลที่ต้านทานต่อโรคนี้

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

ใช้เชื้อราที่เพาะเลี้ยงมาจากสปอร์เดี่ยว (Single spore) ของ *Colletotrichum gloeosporioides*

Type A (22260) และ Type B (22269) เลี้ยงเชื้อราทั้ง 2 ชนิดบนอาหาร oat meal agar ในจานเลี้ยงเชื้อขนาด 9 ซม. ที่อุณหภูมิ $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ โดยวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อใต้แสงอุลตราไวโอเลตเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน

เมื่อเชื้อรามีอายุ 6 วัน เตรียมอินอคูลัม (inoculum) โดยการเทน้ำกลั่นที่นิ่งฆ่าเชื้อแล้วจำนวน 3-5 มล. ลงบนอาหารที่มีเชื้อราเจริญอยู่ ใช้เข็มเขี่ยที่ลงไฟฆ่าเชื้อแล้วชุดเบา ๆ บนผิวอาหาร เพื่อให้เส้นใยและสปอร์ของเชื้อราหลุดออกจากอาหารแล้วเทเก็บไว้ในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อล้างสปอร์บนอาหารออกให้หมด นำน้ำที่มีสปอร์นี้ไปกรองเพื่อเอาเส้นใยออก โดยผ่านผ้าขาวบางที่พับไว้ 4 ชั้น แล้วทำ spore suspension ที่ได้ให้มีความเข้มข้น 1×10^6 สปอร์/มล. โดยใช้ haemocytometer ในการตรวจนับสปอร์

นำ spore suspension ที่เตรียมไว้ไปพ่นลงบนอาหารวัน 0.25% ด้วยระยะเวลาเท่า ๆ กัน จนกระทั่งมีหยดน้ำเล็ก ๆ เกิดขึ้นบนผิววัน พ่นจานเลี้ยงเชื้อเหล่านี้ด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นสูญหายไป แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ $5 \pm 1^{\circ}\text{C}$, 10°C , 15°C , 20°C , 25°C , 25°C , 30°C , 35°C หรือ 40°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง จากนั้นตรวจนับการงอกของสปอร์โดยการฉีด lactophenol cotton blue ลงไปในจานเลี้ยงเชื้อเพื่อฆ่าและย้อมสีสปอร์เหล่านั้น

การตรวจนับการงอกของสปอร์ทำโดยวาง cover slip ขนาด 18×18 มม. จำนวน 5 แผ่น ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ตรวจนับจำนวนสปอร์ทั้งหมดในหนึ่ง field ต่อ cover slip โดยวิธีสุ่ม

ตั้งยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 156 เท่า นับจำนวนสปอร์ที่สร้าง germ-tube แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ตรวจนับ appressoria จากสปอร์ที่งอกทั้งหมดแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ วัดความยาวของ germ-tube เป็นไมครอนจาก 2 สปอร์แรกในแต่ละ field วางแผนการทดลองแบบ factorial designs $8 \times 3 \times 2$ มี 4 ซ้ำ

ผลการทดลอง



ผลของการงอกของสปอร์ ความยาวของ germ-tube และการสร้าง appressoria แสดงไว้ในรูปที่ 1, 2, 3 และตารางที่ 1 ก่อนวิเคราะห์ค่าของวาเรียนซ์ได้เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์เป็นค่า arcsine ส่วนความยาวของ germ-tube ถูกเปลี่ยนเป็นค่า log

ก. การงอกของสปอร์ จากการทดลองพบว่า ทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาการบ่มเชื้อ มีผลต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อราทั้ง 2 ชนิด (Type A และ Type B) (รูปที่ 1) สปอร์จะงอกได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและระยะเวลานานขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิต่ำลงหรือสูงมาก (0 หรือ 40° C) สปอร์



จะงอกได้น้อยลงหรือไม่งอก ในเวลาการบ่มเชื้อ 6, 12 และ 24 ชั่วโมง พบว่าสปอร์ของ Type A งอกได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 30, 20 และ 25° C ตามลำดับ โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด (22.2%) ที่อุณหภูมิ 25° C เมื่อบ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

สำหรับสปอร์ของ Type B มีเปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่า Type A มากและในทุกช่วงเวลาบ่ม พบว่าสปอร์งอกได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 35° C และงอกได้น้อยมากที่อุณหภูมิ 5, 10 และ 40° C โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดถึง 93% ที่อุณหภูมิ 30° C เมื่อบ่มเชื้อเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ข. ความยาวของ germ-tube จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิและระยะเวลาการบ่มเชื้อ จะมีผลโดยตรงต่อการเจริญของความยาวของ germ-tube ของเชื้อราทั้ง 2 ชนิด (รูปที่ 2) ที่อุณหภูมิต่ำหรือสูง germ-tube จะสั้น และจะยาวมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในแต่ละช่วงเวลาบ่มของสปอร์ Type A พบว่า germ-tube เจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 20-30° C โดยจะมี



รูปที่ 1. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* ชนิด Type A (ซ้าย) และชนิด Type B (ขวา) บนอาหารวุ้น 0.25% + 6 ชั่วโมง; ○ 12 ชั่วโมง; □ 24 ชั่วโมง




รูปที่ 2. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อความยาวของ germ-tube เป็นไมครอน (um) ของเชื้อ *C. gloeosporioides* ชนิด Type A (ซ้าย) และชนิด Type B (ขวา) บนอาหารจุ้น 0.25% + 6 ชั่วโมง; ○ 12 ชั่วโมง; □ 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 1. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการสร้าง appressoria ของเชื้อ *Colletotrichum gloeosporioides* ชนิด Type A บนอาหารจุ้น 0.25%

อุณหภูมิ (°C)	ระยะเวลา (ชม.)	จำนวนสปอร์ที่ออกทั้ง (4 ชั่วโมง)	จำนวน appressoria ที่สร้าง (4 ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ย % สปอร์ที่สร้าง appressoria
5 + 1	6	0	0	0
	12	1	1	25
	24	3	1	25
10	6	2	0	0
	12	1	0	0
	24	2	0	0
15	6	3	0	0
	12	7	0	0
	24	18	0	0
20	6	0	0	0
	12	87	0	0
	24	79	0	0
25	6	10	0	0
	12	64	0	0
	24	179	0	0
30	6	11	1	5
	12	39	1	1.79
	24	28	0	0
35	6	3	0	0
	12	14	8	64.58
	24	15	3	28.57
40	6	0	0	0
	12	4	0	0
	24	4	1	25

ความยาวสูงสุด (146.8 ไมครอน) ที่อุณหภูมิ 35° C ในเวลา 24 ชั่วโมง

สำหรับสปอร์ชนิด Type B germ-tube เจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 15-35° C ในทุกเวลา การบ่มที่ศึกษา โดย germ-tube เจริญได้ยาวที่สุด (200 ไมครอน) ที่อุณหภูมิ 25-30° C ซึ่งภายใต้ทั้งสองอุณหภูมิดังกล่าวความยาวของ germ-tube ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อบ่มภายในเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง



รูปที่ 3. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการสร้าง appressoria ของเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* ชนิด Type B บนอาหารวุ้น 0.25% + 8 ชั่วโมง; ○ 12 ชั่วโมง; □ 24 ชั่วโมง

ค. การสร้าง appressoria เชื้อรา Type A สร้าง appressoria ไม่ค่อยแน่นอนที่อุณหภูมิต่างๆ (ตารางที่ 1) โดยทั่วไปเชื้อราจะสร้าง appressoria เมื่อบ่มในเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามไม่พบ appressoria ที่อุณหภูมิ 10 ถึง 25° C อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดต่อการสร้าง appressoria คือ 35° C สำหรับเชื้อรา Type B พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อการสร้าง appressoria มาก (รูปที่ 3) เชื้อราจะเริ่มสร้าง appressoria ที่อุณหภูมิต่ำ เช่น ที่ 5, 10 และ 15° C เมื่อเวลา 6, 12 และ 24 ชั่วโมงตามลำดับ หรือที่อุณหภูมิสูงถึง 40° C เมื่อเวลา 24 ชั่วโมง

สรุปและวิจารณ์

เป็นที่ทราบดีแล้วว่า น้ำที่อยู่นานในพืชมีบทบาทสำคัญต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อรา นอกจากนี้จากการทดลองยังพบว่า การงอกของสปอร์ *C. gloeosporioides* ทั้ง 2 ชนิดแตกต่างกันเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่างๆ กันในสภาวะที่เหมือนกัน สปอร์ของ Type B งอกได้ดีกว่าของ Type A มาก จะเห็นได้ว่าในสภาวะที่เหมาะสมมากที่สุด สปอร์ของ Type B งอกได้ดีถึง 80% ขณะที่สปอร์ของ Type A งอกได้ประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม ยังใช้เวลาในการบ่มนานเปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์ทั้ง 2 ชนิดสูงขึ้น และโดยทั่วไปสปอร์ทั้ง 2 ชนิดงอกได้ดีในช่วงอุณหภูมิประมาณ 15-35° C ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับปฏิกิริยาชีวเคมีในสิ่งที่มีชีวิตส่วนใหญ่ การที่สปอร์ทั้ง 2 ชนิดที่ศึกษาทั้งออกได้แตกต่างกันในสภาวะที่เหมือนกัน อาจจะเนื่องจากความแตกต่างทางสรีรวิทยาของเชื้อทั้ง 2 นั้นเอง อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการศึกษาการงอกของสปอร์ของเชื้อรานี้หลาย ๆ isolate เพื่อที่จะยืนยันถึงความแตกต่างทางสรีรวิทยาของเชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้

เชื้อราชนิด Type B นั้นนอกจากจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์สูงกว่า Type A แล้ว เชื้อ

Type B ยังสร้าง appressoria ได้มากกว่าเชื้อราชนิด Type A โดยทั่วไปเชื้อราทั้ง 2 ชนิดที่ศึกษาสร้าง appressoria เมื่ออยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำ (0-10° C) หรืออุณหภูมิค่อนข้างสูง (35° C) ผลการทดลองครั้งนี้สนับสนุนผลงานของ Meitile และ Lukezic (1972) ซึ่งได้แสดงว่า สปอร์ของ *C. trifolii* สร้าง appressoria ที่อุณหภูมิต่ำ (15° C) ในทางตรงข้าม Skoropad (1967) ได้รายงานหา สปอร์ของ *C. graminicola* สร้าง appressoria ได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่า (15-35° C) อย่างไรก็ตาม Solanki et al. (1974) พบว่าสปอร์ของ *C. capsici* ไม่สร้าง appressoria เมื่อให้เจริญบนอาหารร่วน 2% ภายใต้อุณหภูมิ 18-35° C

นอกจากอุณหภูมิแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการสร้าง appressoria ของเชื้อรา Van Burgh (1950) รายงานว่า ความแข็งของผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการสร้าง appressoria ของ *C. gloeosporioides* เขาพบว่า เชื้อราจะสร้าง appressoria ได้มากขึ้นถ้าเพิ่มความแข็งของผิวในการทดลองครั้งนี้เชื้อราทั้ง 2 ชนิด สร้าง appressoria ได้น้อยและไม่แน่นอน ทั้งนี้อาจจะเพราะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเปอร์เซ็นต์วุ้นต่ำ (0.25%) ซึ่งทำให้ผิววุ้นอ่อนเกินไป ไม่เหมาะต่อการสร้าง appressoria ของเชื้อรา จากการทดลองนี้เป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาต่อไปว่า ความแข็งของผิววุ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้าง appressoria หรือไม่

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของ germ-tube ของเชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้ใกล้เคียงกันมาก และอยู่ระหว่าง 25° C (Type A) และ 30° C (Type B) อย่างไรก็ตามในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมและระยะ

เวลาที่เท่ากัน ความยาวของ germ-tube ของเชื้อรา Type A จะยาวกว่าความยาวของเชื้อรา Type B ผลของการทดลองนี้คล้าย ๆ กับงานวิจัยของ Irwin และ Cameron (1978) ซึ่งได้สรุปผลงานไว้ว่า เส้นใยของ Type A เมื่อเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ดีจะมีโคโลนีขนาดใหญ่กว่าเชื้อรา Type B โดยที่มีการเจริญเติบโตคล้ายกันที่อุณหภูมิ 25 และ 30° C นอกจากนี้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยคือ 25 และ 30° C

สรุปผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิมีผลต่อการงอกของสปอร์ การเจริญของ germ-tube และการสร้าง appressoria ของเชื้อราทั้ง Type A และ Type B อย่างไรก็ตามในการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองการงอกของสปอร์บนอาหารร่วน ซึ่งจะมีสภาพแตกต่างจากบนผิวใบพืช ทั้งในแง่ของปริมาณน้ำ (available free water) ความแข็งของผิว และธรรมชาติของจุลินทรีย์ ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการงอกของสปอร์บนใบพืช (In vivo) ต่อไป

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ Dr. J.A.G. Irwin ที่ได้ให้เชื้อราสำหรับใช้ในการทดลอง และคำแนะนำปรึกษา ขณะทำการทดลองครั้งนี้ ตลอดจนภาคิวิศทาทุกศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

เอกสารอ้างอิง

- Baldion, R.R., J.C. Lozano and B. Grof. (1975). Evaluacion de la resistencia de *Stylosanthes* spp. a la antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*). 10: 104-108.
- Irwin, J.A.G. & D.F. Cameron. (1978). Two diseases of *Stylosanthes* spp. caused by *Colletotrichum gloeosporioides* in Australia, and pathogenic specialization within one of the causal organism. *Aust. J. Agric. Res.* 29:305-317.

Preparation and Electrical Properties of CdTe

* A.Hatsamin, N.Suttisiri,
V.Amornkitbamrung, Y.Jittakhawee

ABSTRACT

The crystals of CdTe was prepared by Bridgman growth technique at about 1150°C. The electrical conductivity has been measured as function of temperature between 100° and 300°K

บทคัดย่อ

การเตรียมผลึกแคดเมียมเทลลูไรด์ โดยวิธีบริดจแมน ที่อุณหภูมิ 1150°C ทำการวัดสมบัติทางไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิจาก 100°K ไปถึง 300°K

1. Introduction

CdTe is a semiconductor with a direct energy gap of ≈ 1.6 eV at low temperature, because of the excellent match of its band gap with solar spectrum, it was suggested as a candidate for solar cell material since 1947.

Alloyed of CdTe and Hg exhibit energy gaps which can be very closed to zero. Their application has been in the detection of infrared radiation particularly in the 8-14 μ m wavelength range band.

CdTe detectors are recent development which have found application as nuclear radiation dosimeters and probes. For using as electronic devices, electrical and optical properties of CdTe must be investigated. These studies require single crystals of high quality.

The object of this work was to investigate

the possibility of preparing CdTe in high conductivity n-type by melt growth technique.

2. Bridgman Growth^(1,3)

Bulk polycrystalline CdTe ingot (1092°C) was prepared by a tilted Bridgman furnace method. The element of 5N purity Cd and Te of stoichiometric quantities were introduced in a cleaned quartz tube and sealed under vacuum of 10^{-6} torr. The tube was then placed inside the hot zone of a resistance furnace that tilted 15° from horizontal position. The furnace temperature was slowly raised to 1150°C. A typical profile along the furnace was measured and plotted in Fig. 1.

After one day of temperature stabilization the furnace temperature was lowered to room temperature at a rate of 5°C/hr. Sample of CdTe crystals grown are shown in Fig. 2.

* Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University

● Received 9 August 1988 ● Accepted 17 August 1988




Fig. 1. Crystal growth of CdTe by the horizontal Bridgman method.
(a) Furnace profile (b) Position of growth tube




Fig. 2. Photograph of CdTe sample.

3. Structural determination

3.1 X-rays diffraction

X-rays diffraction pattern have been taken using the CuK_α radiation from Shimadzu model XD-3A diffractometer with Ni filter. The diffraction curve is shown in Fig. 3.




Fig. 3. X-rays diffraction pattern.




Fig. 4. Fluorescence spectrum of CdTe.

The value of interplanar spacing are the same as that given in the ASTM cards of CdTe in a comparable range of diffraction angles. This confirm the chemical composition and structure zinc-blende of the bulk CdTe.

3.2 X-rays fluorescence

X-rays fluorescence pattern have been taken using Nucleus PCA card.

From this technique we found that the ratio of tellurium to cadmium is not equal to 1.

4. Electrical characterization^(1,3,4)

The ingots is cut into $5 \times 5 \times 1$ m.m. wafers and mechanically polished by alumina powder. The as grown samples were found to be n-type by hot probe technique.

The wafers were then chemically etched ($\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 1$) for 5 minutes before application of contacts. Ohmic contacts were prepared by pressing indium on the wafer and then annealed in N_2 atmosphere at temperature 300°C for 30 minutes.

The electrical conductivity was measured over the temperature range of 100°K to 300°K . This results are shown in Figs. 5-6. The typical forward current voltage characteristics at several temperature were then plotted as in Fig. 5. They show ohmic behavior.




Fig. 5. Forward current voltage characteristics of CdTe.

Temperature dependence of the conductivity of CdTe is due to the change of concentration of the current carriers.




Fig. 6. $\log[1/V]$ as a function of reciprocal temperature for n-type CdTe from d.c. measurement.

5. Conclusion

It has been demonstrated that the crystals of CdTe can be obtained by Bridgman technique. X-rays Fluorescent analysis shows that the crystals are near stoichiometry.

The electrical conductivity is temperature dependence and the $\log[1/V]$ v.s. T^{-1} curves can be interpreted that the ionization energy of donors was 0.014 eV which corresponded to residual impurity Cl. Further progress in this respect can be expected.

Acknowledgements

The authors wish to thank Physics Department, Khon Kaen University for financial support. They also thank Assistant Prof. Pipat Chokesuwattanaskula for providing the X-ray fluorescence spectrum. Finally, they thank Faculty of Agriculture for X-ray diffraction analysis.

References

1. K. Zanio, Semiconductors and Semimetals. Vol. 13, Academic Press, New York, 1978.
2. R.E. Needham and M.F. Delaney, Anal. Chem., 55, 148-150, 1983.
3. R.E. Bube, Solar Cells, 23, 1-17, 1988.
4. S.M. Sze, Physics of Semiconductor devices. 2nd Edition, John Wiley & Sons, Singapore, 1981.

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ติمنมของนักเรียนและนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์จำแนกประเภท : กรณีศึกษา*

** รังสรรค์ เนียมสนิท

** สันทร สีลา

** สุรเดช ถาวรพิทักษ์

1. บทนำ

รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและหาแนวทางให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการบริโภคนมสดหรือนมพร้อมดื่มอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการบริโภคนม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าทางอาหารของนมว่าจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและกำลังสมองของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์และวิธีวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ

1. เพื่อทำการวิจัยตลาดนมของนักเรียนและนักศึกษา ในส่วนภูมิภาค

2. เพื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความนิยมดื่มนมหรือไม่ดื่มนมของนักเรียนและนักศึกษา ในส่วนภูมิภาค โดยสร้างสมการจำแนกประเภท (Discriminant Function) จากเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant Analysis)

ทั้งนี้ได้ใช้กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา ประกอบกับความพยายามที่จะนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์จำแนกประเภทมาช่วยการวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย ข้อเสนอที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะส่งผลถึงแนวทางการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมพร้อมดื่ม ซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

* ได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการวิจัยลำดับที่ 2/2530 ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2530

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีวิจัย กำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยกำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 583 คน (ตารางที่ 1) ข้อมูลที่ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ที่กำหนด ตรวจสอบและประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในรูปจากตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าสถิติพื้นฐาน และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์จำแนกประเภท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530 ถึง เดือนเมษายน 2531 เป็นเวลา 1 ปี

ตารางที่ 1 ลักษณะของตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1) นักเรียน	422	72.4
1.1) ม.1-ม.3	212	36.4
1.2) ม.4-ม.6	210	36.0
2) นักศึกษา	161	27.6
รวม	583	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดนมพร้อมดื่มในประเด็นต่างๆ

ตัวแปร *	กลุ่มเป้าหมาย		
	ม.1-ม.3	ม.4-ม.6	นักศึกษา
เพศ (ร้อยละ)			
ชาย	47.6	49.5	67.1
หญิง	52.4	50.5	22.9
ภูมิสำเนา (ร้อยละ)			
ในเขตเทศบาล/สุขาภิบาล	77.8	68.1	72.7
นอกเขต	23.2	31.9	27.3
อายุเฉลี่ย (ปี)	13.4	16.5	20.5
รายได้เฉลี่ย (บาท)	26 บาท/วัน	36 บาท/วัน	1,756/เดือน

3. ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดนมพร้อมดื่ม

กลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นตัวอย่าง พบว่าเป็นผู้ที่ดื่มนมพร้อมดื่มอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ นักเรียน ม.4-ม.6 มีจำนวนถึงร้อยละ 85.2 ของนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งมีอัตราที่ใกล้เคียงกับนักเรียน ม.1-ม.3 (ร้อยละ 82.5) และนักศึกษา (ร้อยละ 78.3) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐกับเอกชนได้ทำการเผยแพร่ ส่งเสริมและรณรงค์ร่วมกัน ผู้ที่ดื่มนมพร้อมดื่มมีเหตุผลและแรงจูงใจคือเห็นว่ามีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นเหตุผลที่มีจำนวนผู้ตอบสูงสุด รองลงมาได้แก่ดื่มเพื่อใช้ทดแทนอาหารอื่น และเนื่องจากถูกแนะนำ ชักชวนตามลำดับ แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายทราบถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมพร้อมดื่มเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษา และมีข้อสังเกตว่านักเรียน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ให้เหตุผลว่าดื่มนมพร้อมดื่มเพราะถูกแนะนำ ชักชวนถึงประมาณร้อยละ 30 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งการถูกแนะนำ ชักชวนนี้ มาจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติและเพื่อน เป็นสำคัญ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตัวแปร*	กลุ่มเป้าหมาย		
	ม.1-ม.3	ม.4-ม.6	นักศึกษา
พฤติกรรมการดื่มนม (ร้อยละ)			
ดื่มนม	82.5	85.2	78.9
เคยดื่ม (ปัจจุบันเลิกดื่มแล้ว)	11.9	11.9	19.9
ไม่เคยดื่ม	6.2	2.9	1.8
เหตุผลและแรงจูงใจ (ร้อยละ ;			
ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)			
มีกลิ่นคาวและเปรี้ยว	70.9	61.6	89.9
ใช้ทดแทนอาหารอื่น	15.4	32.4	39.7
ถูกแนะนำชักชวน	29.7	25.1	17.5
อื่น ๆ	1.1	6.1	5.6
ระยะเวลาที่ดื่มมาแล้วเฉลี่ย (ปี)	4.9	5.8	6.1
ยี่ห้อ นมที่นิยมดื่ม เฉพาะอันดับ			
1-4 (ร้อยละ ; ตอบได้มากกว่า			
1 คำตอบ)			
ไทย-เดนมาร์ก	61.1	64.2	57.9
โฟร์โมสต์	24.0	26.3	32.5
หนองโพ	13.7	14.0	19.8
มะลิ	10.9	11.7	7.9
รส เฉพาะอันดับ 1-3 (ร้อยละ ;			
ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)			
หวาน	61.4	54.2	52.4
ชีสโกแลต	36.6	30.2	40.5
ชีส	29.7	30.7	23.8
ความถี่ในการดื่ม			
ทุกวัน/เกือบทุกวัน	95.4	41.9	31.6
บ่อย (2-3 วันต่อสัปดาห์)	40.6	37.4	42.1
สัปดาห์ละ 1 วัน	8.6	6.7	6.3
นาน ๆ ครั้ง	15.4	14.0	19.8

* ตัวแปรอื่น ๆ ดูได้จากรายละเอียดฉบับสมบูรณ์

ในกลุ่มผู้ดื่มนมพร้อมดื่มนั้น เป็นผู้ที่ดื่มนมมาเป็นเวลานานแล้วทั้งสิ้นโดยนักเรียน ม.1-ม.3 ดื่มนมมาแล้วโดยเฉลี่ย 4.3 ปี นักเรียน ม.4-

ม.6 ดื่มนมมาแล้วโดยเฉลี่ย 5.6 ปี และนักศึกษา ดื่มนมมาแล้วโดยเฉลี่ย 6.1 ปี อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ดื่มนมมาแล้วของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ นี้ ข้อมูลมีการกระจายที่สูงพอควร

เมื่อพิจารณาถึงยี่ห้อ ตราของนมพร้อมดื่ม ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมาย พบว่านมสดไทย-เดนมาร์ก เป็นที่นิยมสูงสุดในทุกกลุ่มเป็นอัตราสูงมากเกือบ 1 ใน 3 ของผู้ดื่มนมทั้งหมด รองลงมาได้แก่ไฟร์โมสต์ นองโงและมะลิ ตามลำดับ เช่นเดียวกันทุกกลุ่ม รสที่นิยมที่สุดได้แก่ รสหวาน (มากกว่าร้อยละ 50) รองลงมาได้แก่ รสช็อกโกแลตและรสจัดในอัตราที่ใกล้เคียงกัน และกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะดื่มนมเป็นประจำ อยู่เสมอ

สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดนมพร้อมดื่มในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

3.2 ผลการศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จำแนกประเภท

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มนมพร้อมดื่มของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ม.1-ม.3, ม.4-ม.6 และนักศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จำแนกประเภทโดยแบ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ดื่มนมพร้อมดื่มและกลุ่มที่ไม่ดื่มนมพร้อมดื่ม (รวมถึงพวกที่เคยดื่มนมแต่ปัจจุบันเลิกดื่มแล้วด้วย) ให้ภาวะการดื่มนมพร้อมดื่ม เป็นตัวแปรตาม ส่วนตัวแปรอิสระที่นำมาวิเคราะห์มีจำนวน 8 ตัวคือ ตัวแปรประเภทช่วง ได้แก่ อายุ รายได้ และทัศนคติเกี่ยวกับนมพร้อมดื่ม

ตัวแปรประเภทกลุ่ม ได้แก่

เพศ มีค่า 1 = ชาย 0 = หญิง

ภูมิลำเนา มีค่า

1 = ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

0 = นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

เครื่องดื่มประเภททดแทน (นมเปรี้ยว,

นมถั่วเหลือง, ประเภทอาหาร) มีค่า

1 = ดื่มนเป็นประจำ

(ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป)

0 = ไม่ดื่ม

เครื่องดื่มประเภทคู่แข่งอื่น (น้ำอัดลม, ไอศกรีม, น้ำหวาน, น้ำรสผลไม้และสำเร็จรูป) มีค่า

1 = ดื่มนเป็นประจำ

(ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป)

0 = ไม่ดื่ม

เครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ (กาแฟ, ชาร้อน, ประเภทบำรุงกำลังเกลือแร่, ประเภทมีแอลกอฮอล์) มีค่า

1 = ดื่มนเป็นประจำ

(ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป)

0 = ไม่ดื่ม

ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้

1) กลุ่มนักเรียน ม.1-ม.3

พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ จากขนาดของสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน (ตารางที่ 3) พบว่า มีเพียง 3 ตัว ที่สามารถนำมาสร้างสมการจำแนกประเภทได้ เรียงตามลำดับความสำคัญ จากมากไปน้อย คือ ทัศนคติ ภูมิลำเนา และการดื่มนมเครื่องดื่มประเภททดแทน ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะการดื่มนมพร้อมดื่ม กล่าวคือ ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อนมพร้อมดื่ม มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของนมพร้อมดื่ม เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล และเป็นผู้ที่ดื่มนมเครื่องดื่มประเภททดแทนได้แก่ นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง และเครื่องดื่มประเภทอาหารเป็นประจำ จะเป็นผู้ที่ดื่มนมพร้อมดื่มสูงกว่า

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจำแนกประเภท (กลุ่มนักเรียน ม.1-ม.3)

ตัวแปร	สัมประสิทธิ์ของสมการจำแนกประเภท	
	คะแนนมาตรฐาน	คะแนนดิบ
ค่าคงที่		-6.1674
1) ทัศนคติ	0.6523	0.5169
2) ภูมิสำเนา	0.6145	0.5065
3) เครื่องดื่มประเภททดแทน	0.3701	0.7811
Canonical	Wilk's	
Eigenvalue	Correlation	Lamda
0.0959	0.2958	0.9125
		Chi-square
		19.1840
		df.
		3
		Sig.
		0.0003

ความสามารถในการจำแนกประเภท ทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 73.1

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจำแนกประเภท (กลุ่มนักเรียน ม.4-ม.6)

ตัวแปร	สัมประสิทธิ์ของสมการจำแนกประเภท	
	คะแนนมาตรฐาน	คะแนนดิบ
ค่าคงที่		-5.5835
1) ทัศนคติ	0.7913	0.7025
2) เพศ	-0.6116	-1.2208
Canonical	Wilk's	
Eigenvalue	Correlation	Lamda
0.0145	0.1194	0.9858
		Chi-square
		2.9555
		df.
		2
		Sig.
		0.2281

ความสามารถในการจำแนกประเภท ทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 61.0

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจำแนกประเภท (กลุ่มนักศึกษา)

ตัวแปร	สัมประสิทธิ์ของสมการจำแนกประเภท	
	คะแนนมาตรฐาน	คะแนนดิบ
ค่าคงที่		-1.0579
1) ภูมิสำเนา	0.8639	1.5998
2) เครื่องดื่มประเภททดแทน	-0.4341	-0.8800
Canonical	Wilk's	
Eigenvalue	Correlation	Lamda
0.0429	0.2029	0.9588
		Chi-square
		6.6413
		df.
		2
		Sig.
		0.0361

ความสามารถในการจำแนกประเภท ทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 69.6

อย่างไรก็ตาม ผลของการคาดคะเนความเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความสามารถทำนายได้ถูกต้อง ร้อยละ 73.1

2) กลุ่มนักเรียน ม.4-ม.6

พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ จากขนาดของสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน (ตารางที่ 4) พบว่า มีเพียง 2 ตัว ที่สามารถนำมาสร้างสมการจำแนกประเภทได้ เรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย คือ ทศนคติและเพศโดยทศนคติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะการติมนม ในขณะที่เพศ มีความสัมพันธ์เชิงลบ

เมื่อพิจารณาอำนาจในการจำแนกของสมการที่ได้ ปรากฏว่า สมการไม่นัยสำคัญที่ .05 (มีนัยสำคัญที่ .2281) ค่า Canonical Correlation ต่ำมากในขณะที่ค่า Wilk's Lamda สูงมาก แสดงว่า จำนวนในการจำแนกกลุ่มของสมการนี้ มีไม่มากนัก ซึ่งมีความสามารถทำนายได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 61.0 เท่านั้น

3) กลุ่มนักศึกษา

พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ จากขนาดสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน (ตารางที่ 5) พบว่า มีเพียง 2 ตัว ที่สามารถนำมาสร้างสมการจำแนกประเภทได้ เรียงตามลำดับความสำคัญจาก

มากไปน้อย คือ ภูมิสำเนา ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก และอัตราการดื่มเครื่องดื่มประเภททดแทน ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

เมื่อพิจารณาอำนาจในการจำแนกของสมการที่ได้ ปรากฏว่าสมการมีนัยสำคัญที่ .0361 มีค่า Canonical Correlation ต่ำ ในขณะที่ค่า Wilk's Lamda สูง แสดงว่าอำนาจในการจำแนกกลุ่มของสมการนี้ มีไม่มากนัก ผลการคาดคะเน ทำนายได้ถูกต้อง ร้อยละ 69.6

สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติมนมพร้อมดื่ม ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จำแนกประเภท (ตารางที่ 6) ปรากฏว่า การมีทศนคติที่ดีต่อนมพร้อมดื่ม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียน ม.1-ม.3 และนักเรียน ม.4-ม.6 แสดงว่า การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนมพร้อมดื่มต่อกลุ่มนักเรียน ยังมีความจำเป็นที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องไป สำหรับกลุ่มนักศึกษา ปัจจัยนี้ไม่มีผล เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนมพร้อมดื่มเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนปัจจัยเรื่องอัตราการดื่มประเภททดแทน ได้แก่ นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง นั้น สำหรับนักเรียน ม.1-ม.3 จะมีผลเชิงบวก แต่ในกลุ่มนักศึกษา กลับมีผลเชิงลบ ซึ่งเป็นไปได้ว่า นักเรียน ม.1-ม.3 ได้ติมนม

ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการติมนม ของกลุ่มเป้าหมาย

ตัวแปร	กลุ่มเป้าหมาย		
	ม.1-ม.3	ม.4-ม.6	นักศึกษา
ทศนคติ	บวก (1)	บวก (1)	-
ภูมิสำเนา	บวก (2)	-	บวก (1)
เครื่องดื่มประเภททดแทน	บวก (3)	-	ลบ (2)
เพศ	-	ลบ (2)	-

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลำดับความสำคัญ

พร้อมดื่มและเครื่องดื่มประเภททดแทนควบคู่กันไป เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติใกล้เคียงกัน แต่ในกลุ่มนักศึกษาเมื่อดื่มเครื่องดื่มประเภททดแทนแล้ว จะนิยมดื่มและติดเป็นนิสัยจนไม่ดื่มนมพร้อมดื่ม ส่วนปัจจัยภูมิสำเนามีผลเชิงบวกต่อการดื่มนมพร้อมดื่มในกลุ่มนักเรียน ม.1-ม.3 และนักศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล จะเป็นผู้ที่ไม่ดื่มนมพร้อมดื่มสูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ปัจจัยเรื่องเพศ ไม่มีผลต่อการดื่มนมพร้อมดื่ม ในกลุ่มนักเรียน ม.1-ม.3 และนักศึกษายกเว้นในกลุ่มนักเรียน ม.4-ม.6 มีผลเชิงลบหมายความว่านักเรียนชายจะเป็นผู้ที่ไม่ดื่มนมมากกว่านักเรียนหญิง

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ควรมีการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนมพร้อมดื่มอย่างต่อเนื่องกันไป ตามสื่อโฆษณาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งนอกจากเป็นการเผยแพร่ให้เยาวชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว ยังมีผลต่อผู้ประกอบการ จะทำให้ส่งผลต่อการแนะนำให้เยาวชนในความปกครองดื่มนมพร้อมดื่ม เนื่องจากพบว่า ผู้ปกครองยังมีอิทธิพลต่อการแนะนำให้ดื่มนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียน

2) แม้ว่าในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายจะหันมาดื่มนมพร้อมดื่มกันในอัตราที่สูง แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่จะมีผลกระทบต่อการส่งเสริมการดื่มนมในอนาคต คือ ปัจจัยด้านราคา ควรหาทางที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น กล้องเตตราแพคเพื่อลดราคาของนมพร้อมดื่มลง อย่างน้อยที่สุด

ควรมีราคาใกล้เคียงกับเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม มาตรการดังกล่าวนี้ ควรมีการวางแผนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

3) ควรพิจารณาถึงกลุ่มเยาวชน ที่มีภูมิสำเนานอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ด้วยว่าจะมีวิธีการส่งเสริมการดื่มนมพร้อมดื่มได้อย่างไร วิธีการหนึ่งที่อาจจะทำได้คือ ให้ทางโรงเรียนมีส่วนร่วมด้วย

4) ควรพิจารณาร่วมมือหรือส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิต จำหน่ายนมพร้อมดื่ม จัดจำหน่ายนมพร้อมดื่มในราคาพิเศษหรือมีส่วนลดแก่สถานศึกษาต่างๆ ในรูปของการขายตรงที่สถานศึกษานั้นๆ เช่น ในช่วงเวลาเช้าทุกวัน เป็นต้น

บรรณานุกรม

- | | |
|------------|--|
| เกษม | นันทชัย. 2527. การแปรรูปน้ำนมดิบก่อนใช้ดื่มกัน ในวารสารแก่นเกษตรปีที่ 12 ฉบับที่ 4. หน้า 159-164. |
| จิตตราภรณ์ | สิริพิพัฒน์. 2526. ทศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตอนนม ยู เอช ที. ในรวมบทความอภินิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2526 กรุงเทพมหานคร. บพิธการพิมพ์. หน้า 371-372. |
| จักรพันธ์ | โพธิ์นาม. 2524. ทศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานคร. ในรวมบทความอภินิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2524. กรุงเทพมหานคร. เรือนแก้วการพิมพ์. หน้า 525-526. |
| ประสงค์ | คุณานันท์ชัยเดช. 2526. ดื่มนมเพื่อสุขภาพ ในวารสารศูนย์แพทย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3. หน้า 177-179. |
| สุชาติ | ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ลัดดาวัลย์ รอดมณี. 2528. เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. หจก. ภาพพิมพ์. |
| สุชาติ | ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ลัดดาวัลย์ รอดมณี. ไพฑูรย์ ภักดี. 2529. ระบบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. |

- สุวรรณา กิจภากรณ์. 2528. **จุฬารัตน์** ปีที่ 4 ฉบับที่ 9
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2525. **นมและ
ผลิตภัณฑ์นม** กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์
จุฬารัตน์.
วารวิทย์ วณิชากิจชาติ. 2528. **นมและผลิตภัณฑ์นม.**
ในวารสารสงขลานครินทร์ ปีที่ 7. ฉบับที่
3. หน้า 325-334.
อนุชา ศิริ. 2526. **ดื่มนมดีจริงหรือ.** ในวารสาร
แม่ใจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 12-15.

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความสั้น ๆ ในแนว "ไม่ลองก็ไม่รู้" เพื่อเผยแพร่
ความรู้หรือประสบการณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งมาที่ กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับนั้น 2 เล่ม, ของที่ระลึก และ
สำเนาพิมพ์อีก 15 ชุด

ผลกระทบของอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพของน้ำ ในลำน้ำพอง

*ดร.สุนันทา เสงี่ยม *สุติมา คุคุ้มสมุทร
*ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง *รัตนา มหาชัย
*ดร.ไตรดาภรณ์ ชูศรี *วิรัช ว่องพัฒน์กุล
งามนิจ นนทโส *จิระศักดิ์ อินดาโรจน์

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

สรุปผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรม

จากการศึกษาผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำพองในช่วงเวลาตั้งแต่ มิ.ย. 2529-พ.ค. 2530 จะสามารถแบ่งลำน้ำออกตามคุณภาพของน้ำได้เป็น 5 บริเวณดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 และ 6

บริเวณที่ 1 ตั้งแต่หน้าเขื่อนอุบลรัตน์ลงมาจนถึงบริเวณโรงสูบน้ำโรงงานกระดาษพินิกส์ (จุดที่ 1, 2, 4, 5 และ 6)

บริเวณที่ 2 ในบริเวณท้ายโจด (จุดที่ 7, 8 และ 8/1)

บริเวณที่ 3 ตั้งแต่จุดบรรจบระหว่างท้ายโจดและลำน้ำพอง จนถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองหวาย (จุดที่ 8/2, 9 และ 10)

บริเวณที่ 4 ได้บริเวณฝายน้ำล้นจนถึงบริเวณโรงสูบน้ำโรงงานสุรา (จุดที่ 11 และ 12)

บริเวณที่ 5 ตั้งแต่โรงงานน้ำตาลลงไปจนถึงบริเวณบ้านกุดกว้าง (จุดที่ 13 จนถึงจุดที่ 17)

ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในบริเวณเหล่านี้ ได้แก่แทนนิน-ลิกนิน คลอไรด์ ความกระด้าง แคลเซียม ออร์แกนิก-ไนโตรเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ความสามารถในการนำไฟฟ้า ของแข็งแขวนลอย และสี ค่าเฉลี่ยตลอดปีของตัวแปรเหล่านี้มีแสดงในตารางที่ 4

จากการพิจารณาข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4 สามารถสรุปคุณภาพของน้ำและผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้

* ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบของตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น หน่วยของตัวแปรคือ mg/l ยกเว้น ความกระด้าง EC และสีที่มีหน่วยเป็น mg CaCO₃/l, μ S/cm และหน่วยสีตามลำดับ

บริเวณ	DO	COD	BOD	แทนนิน		ออร์แกนิก		ความ		EC	สี
				ลิกนิน	กลอไรค์	แคลเซียม	ไนโตรเจน	H ₂ S	กระด้าง		
1	5.20	10.39	1.55	0.27	10.22	13.79	1.92	nil	80.95	176.73	23.27
2	2.55	43.93	4.14	4.53	131.16	54.65	2.75	1.70	243.93	597.62	91.44
3	3.12	17.14	1.60	0.75	24.46	21.74	2.50	0.04	84.87	244.03	39.86
4	6.41	17.56	1.51	0.60	23.28	26.33	2.03	nil	97.06	305.32	32.80
5	4.85	28.09	3.46	0.98	23.49	15.95	2.41	nil	98.31	324.10	58.77


บริเวณที่ 1 คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ในบริเวณนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ดังนั้นการถ่ายเทของเสียทั้งในรูปสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์จากชุมชนและแหล่งเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ประปราย จึงอยู่ในระดับที่ลำนํ้าจะย่อยสลายและเจือจางได้ ในช่วงเวลาที่มีการขับถ่ายและเชื่อมอุปสรัดน้ำปล่อยน้ำน้อย ค่า DO จะลดลงอย่างชัดเจนและค่าตัวแปรอื่นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็เป็นช่วงระยะสั้นๆ ประมาณ 2 เดือน (28 ส.ค. - 30 ก.ย.) ผลการวิเคราะห์ทางชีวภาพสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพ กล่าวคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความสะอาดมากที่สุดโดยปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด total coliform และ fecal coliform จะต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่น ๆ ของลำนํ้า

เมื่อพิจารณาคุณภาพของน้ำในแต่ละจุดของบริเวณนี้พบว่าน้ำในช่วงท้ายของบริเวณ (จุดที่ 4, 5 และ 6) จะมีคุณภาพต่ำกว่าน้ำในช่วงต้นเล็กน้อย โดยพบว่าน้ำในบริเวณจุดที่ 4, 5 และ 6 มีค่า DO ต่ำสุดเป็น 0.30 mg/l และค่า BOD และ COD สูงสุดเท่ากับ 8.5 และ 31.0 mg/l ตามลำดับ และจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด total coliform และ fecal coliform ในบริเวณจุดที่ 5 จะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากน้ำในบริเวณจุดที่ 4-6 จะถูกปนเปื้อนจากน้ำเสียของห้วยโจดซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำทิ้งจาก


โรงงานฟีนิกซ์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เชื่อมอุปสรัดน้ำไม่ได้ระบายน้ำติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแต่อ่างเก็บน้ำหนองหวายซึ่งอยู่ใต้ลงไประบายน้ำเพื่อการชลประทานตามปกติ การระบายน้ำของเชื่อมหนองหวายมีผลทำให้ระดับน้ำในลำนํ้าพองลดต่ำลงมาก และน้ำเสียจากห้วยโจดไหลลงสู่ลำนํ้าพอง และแพร่ขึ้นมาจนถึงบริเวณบ้านแต่ (จุดที่ 4) ค่า DO ของน้ำในบริเวณจุดที่ 4,5,6 จึงลดลง นอกจากนั้นยังได้มีรายงานจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นว่าในบางครั้งปลาจะต้องลอยตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ อย่างไรก็ตามเมื่อเชื่อมอุปสรัดน้ำเริ่มทำการระบายน้ำ คุณภาพของน้ำในบริเวณนี้ก็กลับดีขึ้น

จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า น้ำในบริเวณที่ 1 นี้ เป็นน้ำสะอาดสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคได้โดยไม่ต้องผ่านการบำบัด และสามารถใช้น้ำดิบในการทำน้ำประปาได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าจะนำน้ำจากบริเวณนี้มาบริโภค จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคเสียก่อน

บริเวณที่ 2 บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง น้ำในบริเวณนี้จัดได้ว่าเป็นน้ำเสีย มีสีน้ำตาลอ่อน และมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย ค่า DO เหลือที่ผิวน้ำ



รูปที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า DO (mg/l) BOD (mg/l) COD (mg/l) organic-N (mg/l) และ tannin lignin (mg/l) และ H₂S (mg/l) ณ จุดเก็บต่างๆ ในลำน้ำพอง



รูปที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณคลอไรด์ (mg/l) ความกระด้าง (mg CaCO₃) สภาพนำไฟฟ้า (μ siemen/cm) และสี (color unit) ณ จุดเก็บต่างๆ ในลำน้ำพอง

เท่ากับ 2.55 mg/l และน้ำที่ระดับความลึก 6 เมตร (สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร) มีสีน้ำตาล และมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ค่า DO เท่ากับศูนย์ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในบริเวณนี้แสดงไว้ในตารางที่ 4 ซึ่งจะเห็นว่าค่าตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากค่า DO จะมีค่าสูงกว่าบริเวณอื่น ชาติที่เป็นอาหารของพืช มีความเข้มข้นค่อนข้างสูง พืชในห้วยโจดจึงมีแน่นอน

ลำน้ำพองบริเวณปากห้วยโจด อยู่ห่างจากจุดที่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟีนิกส์ระบายน้ำเสียประมาณ 1.5 กม. เฉลี่ยน้ำเสียวันละ 46,800 ลบ.ม. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในจุดเก็บที่ 7 ตลอดปีพบว่าค่าเฉลี่ยของสารปนเปื้อนต่าง ๆ มีค่าสูงมาก เช่น มีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 2,446.70 $\mu\text{S}/\text{cm}$ และมีสีเข้ม 447.30 หน่วยสี ดูรายละเอียดคุณภาพน้ำในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ ณ จุดเก็บที่ 7, 8/1 และ 1 ของตัวแปรบางตัว

ตัวแปร	คุณภาพน้ำจุดที่ 7		คุณภาพน้ำจุดที่ 8/1		คุณภาพน้ำจุดที่ 1	
	พิสัย (mg/l)	เฉลี่ย (mg/l)	พิสัย (mg/l)	เฉลี่ย (mg/l)	พิสัย (mg/l)	เฉลี่ย (mg/l)
ไนเตรต	0.13-44.20	8.26	0.00-9.83	2.08	0.00-6.96	2.42
ออร์แกนิก-ไนโตรเจน	0.38-17.62	5.10	0.20-21.73	4.20	0.00-10.79	1.84
ฟอสฟอรัสรวม	0.29-36.92	6.79	0.06-77.74	4.76	0.01-0.40	0.10
โบรมาต	48.50-148.30	87.45	20.10-104.69	50.70	2.84-5.70	3.93
โซเดียม	102.00-269.00	166.75	19.96-120.65	71.92	7.01-18.30	1.63
แคลเซียม	125.20-311.00	168.25	56.42-140.46	89.76	9.97-16.70	12.54
แมกนีเซียม	0.76-18.16	7.51	3.42-12.16	7.28	5.44-2.97	4.07
ซิลิเกต	174.00-288.00	224.77	36.00-48.00	45.37	6.00-6.90	6.57
ไฮโดรเจนซัลไฟด์	nil-0.15	0.02	0.42-5.10	3.36	nil	nil
แอมโมเนีย-นิกนิน	1.89-47.20	19.01	1.34-31.00	9.26	0.00-0.60	0.22
สี	70.00-800.00	447.30	17.00-600.00	149.80	10.00-50.00	19.62
ความสามารถในการนำไฟฟ้า	1356.60-3720.00	2446.70**	240.70-2020.00	904.77	150.70-230.00	176.60
ความขุ่น	6.40-482.66	149.13***	1.13-278.00	63.71	0.02-15.10	4.56
ปริมาณคลอรีน	138.38-1701.21	271.88	32.59-745.71	271.88	3.79-17.13	9.90
ค่าออกซิเจนละลาย	0.00-5.52	2.06	0.00-4.00	0.43	4.05-8.32	5.81
บีโอดี	0.89-43.00	17.70	0.39-16.00	7.21	0.30-6.90	1.65
ซีโอดี	34.64-910.00	361.90	10.54-180.00	69.14	3.58-36.27	11.49

*ใช้หน่วย color unit

**ใช้หน่วย S/cm

***ใช้หน่วย NTU

จากตารางที่ 5 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรบางตัวของน้ำทิ้ง มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน เช่น BOD มีค่าเฉลี่ย 17.7 mg/l แต่ปริมาณน้ำทิ้งที่ถูกระบายลงในแม่น้ำมีปริมาณสูงมาก จนลำน้ำไม่สามารถจะย่อยสลายหรือเจือจางได้ การย่อยสลายของเสียที่ถูกทิ้งลงในห้วยโจดจะต้องใช้ออกซิเจนถึงวันละ 826.36 กิโลกรัม นอกจากนี้ น้ำทิ้งจากโรงงาน ยังมีปริมาณธาตุอาหารของพืชสูง ทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ออกซิเจนละลายลงสู่ลำน้ำได้ยาก การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำจึงเป็นไปในแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic process) น้ำในบริเวณนี้ และที่อยู่ลึกลงไปจะมีกลิ่นเหม็น ในฤดูฝนที่ฝนตกหนัก กระแสน้ำไหลแรงทำให้น้ำเสียที่จมอยู่ตอนล่าง ถูกกวานให้ลอยขึ้นมาผสมกับน้ำที่ผิวหน้า ผลจากการวิเคราะห์ทางชีวภาพ พบว่า ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดมีค่าค่อนข้างต่ำ และไม่พบสารสีเขียวของ phytoplankton แสดงว่าปริมาณของออกซิเจนละลายในน้ำมีน้อย และแบคทีเรียที่พบควรเป็น facultive anaerobic ซึ่งทำให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ปริมาณ total coliform และ fecal coliform ที่พบในบริเวณนี้แสดงว่ามีสารอินทรีย์เจือปนในปริมาณค่อนข้างสูง สรุปได้ว่า น้ำในบริเวณนี้จัดเป็นน้ำเสีย และจะต้องผ่านการบำบัดก่อนนำไปใช้

บริเวณที่ 8 คุณภาพของน้ำในบริเวณนี้จะดีกว่าบริเวณที่ 2 แต่จะต่ำกว่าบริเวณที่ 1 เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียในบริเวณที่ 2 เป็นที่น้ำสังเกตว่าคุณภาพในจุดที่ 8/2 จะดีกว่าจุดที่ 9 ทั้งๆ ที่จุด 8/2 อยู่ในบริเวณที่ห้วยโจดบรรจบกับลำน้ำพอง ซึ่งจุดนี้คุณภาพของน้ำควรจะต่ำกว่าจุดที่ 9 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า ลำน้ำพองมีสภาพเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีลักษณะยาวและ

ระดับน้ำจะถูกควบคุมโดยฝายของอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองหวาย กระแสน้ำไหลไม่รุนแรง ดังนั้นน้ำเสียซึ่งมีความหนาแน่นสูงจะจมอยู่เบื้องล่างในบริเวณจุด 8/2 น้ำเสียจะแพร่ขึ้นมาผสมไม่มากนัก และจะค่อยๆ แพร่ขึ้นมาผสมในระยะทางออกไป จึงมักพบว่าจุดที่ 9 มีคุณภาพต่ำกว่าจุดที่ 8/2 ในระยะทางระหว่างจุด 8/2 และ 9 กรมประมงสงเคราะห์ได้ติดตั้งบิมน้ำ 2 ตัวในบริเวณฝั่ง 14 เพื่อสูบน้ำเข้าพักในอ่างเก็บน้ำฝั่งที่ 12 13 และ 14 (ซึ่งมีจำนวนครัวเรือน 160, 50 และ 50 ตามลำดับ) จากฝั่ง 12 จะมีบิมน้ำต่อไปที่กิโลเมตรที่ 5 แล้วสูบน้ำต่อไปที่อ่างเก็บน้ำภูกระแตเพื่อจ่ายน้ำไปยังหมู่บ้านปันน้ำใจ ซึ่งเป็นบ้านจัดสรรของกรมประมงสงเคราะห์และมีประมาณร้อยละ 10 ครัวเรือน ได้รับทราบจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กรมประมงสงเคราะห์ว่า ก่อนจะตั้งโรงงานกระดาษ น้ำที่สูบได้มีคุณภาพดี ใช้อาบน้ำซักผ้า ทำสวนครัว ทำความสะอาดด้วยขามได้ แต่หลังจากโรงงานกระดาษตั้งแล้ว บางช่วงเวลาน้ำที่สูบขึ้นมาได้ไม่มีผู้ใดกลั้นำไปใช้ เพราะมีสีน้ำตาลอ่อน และมีกลิ่นเหม็น ประชากรบริเวณดังกล่าวพากันเดือดร้อนเสมอมา เพราะไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคเหมือนดังเคย

ส่วนคุณภาพน้ำในจุดที่ 10 จะมีคุณภาพดีขึ้นกว่าจุดที่ 9 เล็กน้อยเพราะสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายไปบ้างแล้ว แต่ DO มีค่าลดลงเนื่องจากถูกใช้ไปในการย่อยสลายสภาพน้ำเช่นนี้นับเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างยิ่ง

จากการศึกษาข้อมูลอื่นๆ ประกอบ เช่น ปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงาน อัตราการเจือของน้ำเสียจากโรงงาน ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อน ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำล้นจากฝาย พอจะสรุปได้ว่าคุณภาพน้ำในบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 3 จะขึ้นกับปริมาณน้ำเสีย ที่โรงงานปล่อย ปริมาณน้ำที่

ระบายจากเขื่อนลงในลำน้ำพอง พบไม่ขึ้นกับปริมาณน้ำฝนเลย ทั้งนี้จากการพิจารณาข้อมูลเทียบกับปริมาณน้ำฝนพบว่า ปริมาณน้ำฝนในเดือนมิถุนายน 2529 เท่ากับ 124.7 มม. ปริมาณน้ำฝนในเดือนพฤษภาคม 2530 เท่ากับ 123.9 มม. แต่พบว่าคุณภาพของน้ำแต่ละจุดระหว่าง 2 เดือนนี้แตกต่างกันมาก เมื่อศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนและปริมาณน้ำล้นที่ระบายจากฝายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 วัน จากวันที่เก็บตัวอย่างพบว่า วันที่ 28 มิถุนายน 29 มีค่า = 2.3813 MCM และ 1.6277 MCM ตามลำดับ ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 วัน = 0.17 mm. ส่วนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2530 พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำปล่อยจากเขื่อน จากฝายและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 วัน เท่ากับ 0.00 MCM, 0.01 MCM และ 13.00 MCM ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำพองตอนเหนือฝายคือปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเมื่อเหตุการณ์อื่น ๆ ดำเนินไปอย่างปกติ เมื่อเขื่อนปล่อยน้ำจะทำให้สัดส่วนการเจือจางสูงขึ้น ก็จะช่วยให้มีคุณภาพสูงขึ้นเล็กน้อย

บริเวณที่ 4 น้ำในบริเวณนี้มีคุณภาพค่อนข้างดี มีปริมาณแบคทีเรีย total coliform และ fecal coliform ใกล้เคียงกับบริเวณที่ 1 เนื่องจากเป็นน้ำผิวหน้าที่ล้นออกมาจากฝาย และขณะที่ล้นออกมาได้มีการกระแทกกับหินแตกเป็นฟอง ทำให้ออกซิเจนละลายลงเจือปนได้มากขึ้น ค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายสูงมากถึง 6.41 mg/l เป็นที่น่าสังเกตว่าค่า BOD ที่บริเวณนี้ต่ำเท่ากับบริเวณที่ 1 แต่ค่า COD ยังสูงอยู่เล็กน้อยแสดงว่ายังมีสารอินทรีย์เจือปนอยู่ แต่สารอินทรีย์ลดน้อยลงมาก จึงสอดคล้องกับค่าลิกนิน-แทนนินซึ่งต่ำลง แต่ค่าการนำไฟฟ้ายังคงสูงอยู่ (ตารางที่ 4)

ถ้าดูรายละเอียดของคุณภาพน้ำในบริเวณนี้ตลอดปีจะพบว่าในบางช่วงเวลางานชลประทานหนองหาวมิได้ปล่อยน้ำให้ล้นจากฝาย คุณภาพของน้ำจะลดต่ำลงมากเนื่องจากน้ำที่มีคุณภาพต่ำกว่าในตอนล่างแพร่ขึ้นมาเจือปน จากการสอบถามผู้ที่อาศัยใน บริเวณใกล้โรงงานสุรา ได้รับทราบที่โรงงานสุราจะระบายน้ำเสียลงในลำน้ำพองในเวลาค่ำหรือตอนดึกๆ เสมอ คณะผู้วิจัยจึงได้เก็บน้ำในขณะที่โรงงานได้ระบายออกมาหลายครั้งในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2530 และพบว่าน้ำมีสีน้ำตาลอ่อนๆ ซึ่งอาจเป็นน้ำจากการชะล้างทำความสะอาดขวดและบริเวณโรงงาน โรงงานจะใช้น้ำในการทำความสะดวกประมาณ 50 - 150 ม³/วัน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งที่โรงงานสุราปล่อยออกมาพบว่ามีความกระด้าง 82.77 mg CaCO₃ คลอไรด์ 974.03 mg/l และ COD 45.28 mg/l นอกจากนั้นน้ำเสียจากบ้านพักของพนักงานโรงงานสุราก็ยังถูกระบายลงสู่ลำน้ำพองโดยตรงด้วย ผลจากการวิเคราะห์ทางชีวภาพพบว่า มีค่า total MPN, fecal MPN ก่อนข้างสูงซึ่งแสดงว่ามีจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเจือปนอยู่

ในช่วงระหว่างจุดที่ 12 และ 12/1 บางครั้งพบว่ามีค่าความขุ่นสูงมาก เนื่องจากโรงงานกรวดทรายทำการล้างกรวดทราย ค่าของแข็งแขวนลอย (suspended solid) ในบริเวณนี้มีค่าสูงถึง 49 mg/l ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริเวณที่ 1 ซึ่งเท่ากับ 34 mg/l และมีค่าความขุ่นระหว่าง 80-100 NTU ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริเวณที่ 1 ซึ่งต่ำกว่า 10 NTU นอกจากนั้นยังพบว่ามีค่าความกระด้างสูง ปริมาณแคลเซียมที่พบสูงสุดคือ 178 mg/l และคิดเป็นความกระด้าง 501 mg CaCO₃ และค่าการนำไฟฟ้าสูงถึง 302.1 μ S/cm ถัดจากโรงงานล้างกรวดทราย

ลงไปจะเป็นโรงงานผลิตครั้งซึ่งระบายน้ำที่มีสี
แดงอมม่วงเป็นสาเหตุให้น้ำในบริเวณใกล้เคียงมีสี
เข้มไม่น่าดู ในเดือน ตุลาคม น้ำจะมีสีแดงอมม่วง
เข้มตั้งแต่จุดที่ 12 จนถึงจุดที่ 13 เป็นระยะทาง
ประมาณ 3 กม. แต่เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้ปรากฏ
ขึ้นอีกหลังจากเดือนธันวาคม 2529 ไปแล้ว

บริเวณที่ 5 บริเวณนี้คุณภาพของน้ำจะ
ลดต่ำลงมากโดยเฉพาะจุดที่ 13 เพราะเป็นบริเวณ
ที่รวมน้ำเสียจากโรงงานสุรา บ้านพักของพนักงาน
โรงงานสุรา, โรงงานล้างขวดทราย, โรงงานผลิต
ครึ่ง, โรงงานผลิตปลาแห้ง และโรงงานน้ำตาล

ระบบกำจัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลประกอบ
ด้วยบ่อบำบัดน้ำ 3 บ่อ และบ่อบำบัดน้ำร้อนที่ไหล
จากเครื่องควบแน่น ซึ่งน้ำจากบ่อนี้จะถูกนำกลับ
ไปใช้อีกเมื่อมีอุณหภูมิลดต่ำลงแล้ว เมื่อคุณภาพ
น้ำลดต่ำลงมากจะถูกระบายออกสู่ลำน้ำพองโดย

ใช้ท่อขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบริเวณเดียวกับสถานีสูบน้ำ
ของโรงงาน น้ำเสียจากระบบผลิตน้ำตาลจะถูก
กักเก็บในบ่อบำบัดเพื่อย่อยสลายไปบางส่วนแล้ว
จึงระบายลงสู่ลำน้ำพองโดยใช้ท่อขนาดใหญ่ ระบาย
ลง ณ จุดที่อยู่ต่ำกว่าสถานีสูบน้ำของโรงงาน
ประมาณ 150 เมตร นอกจากนั้นเมื่อมีฝนตก
น้ำฝนจะชะล้างเอาสารอินทรีย์ซึ่งตกค้างอยู่บนกอง
กากอ้อยด้านหลังโรงงานลงสู่ลำน้ำพองด้วย จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่า ในฤดูที่มีการหีบอ้อยจนถึง
ช่วงโรงงานล้างเครื่องจักร (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)
คุณภาพของน้ำในจุดที่ 13 จะลดต่ำลงมากกล่าวคือ
มีค่า BOD สูงสุดถึง 32 mg/l และถ้ายิ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ฝายมิได้ระบายน้ำ คุณภาพน้ำจะลดลง
อย่างมากในบางจุดค่า DO ลดลงจนมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ก็มี แต่เมื่อฝายระบายน้ำ น้ำเสียก็จะถูก
ชะล้างไปยังจุดถัดออกไป

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ ณ จุดเก็บที่ 13 และ 11 ของตัวแปรบางตัว

ตัวแปร	คุณภาพน้ำจุดที่ 11		คุณภาพน้ำจุดที่ 13	
	ฟอสฟอรัส (mg/l)	เหล็ก (mg/l)	ฟอสฟอรัส (mg/l)	เหล็ก (mg/l)
ไนเตรต	0.00-3.37	2.08	0.00-4.21	1.97
ออร์แกนิกไนโตรเจน	0.26-22.11	2.77	0.00-13.64	2.34
ฟอสฟอรัสทั้งหมด	0.05-1.18	0.34	0.01-1.02	0.24
ความขุ่น	0.04-45.07	11.03	0.01-40.90	6.98
ความสามารถ ในการนำไฟฟ้า	187.00-2217.00	364.45	172.00-431.00	239.91
แคลเซียม	12.44-44.86	18.05	11.50-20.60	16.14
โปแตสเซียม	3.80-13.29	6.43	1.05-6.50	4.93
โซเดียม	9.80-57.26	17.64	9.50-21.14	12.53
คลอไรด์	6.70-94.82	24.03	8.80-65.04	22.32
ออกซิเจนละลาย	0.00-7.92	5.25	4.09-8.33	6.56
บีโอดี	0.04-32.00	5.93	0.16-7.40	1.49
ซีโอดี	8.85-194.34	35.05	0.86-46.72	16.12
แทนนิน-ลิกัน	0.13-3.62	1.09	0.18-1.10	0.56

ผลจากการวิเคราะห์ทางชีวภาพพบว่าน้ำบริเวณนี้มีแบคทีเรียประเภท total coliform และ fecal coliform เจือปน ควรผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคก่อนนำมาใช้ในการอุปโภค, บริโภค

จากการศึกษาข้อมูลน้ำฝนและปริมาณน้ำที่ระบายผ่านฝายน้ำล้น สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำในบริเวณที่ 4 และ 5 จะขึ้นกับปริมาณน้ำล้น ปริมาณน้ำฝนแทบไม่มีผลเลย และเนื่องจากลำน้ำช่วงบริเวณนี้ตื้นและเป็นลำน้ำแคบๆ ดังนั้นจึงมีน้ำปริมาณน้อย แม้ว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมไม่หนาแน่นนัก และแต่ละแห่งมิได้ระบายน้ำในปริมาณมากขนาดโรงงานผลิตเยื่อกระดาษก็ตาม แต่คุณภาพน้ำจะต่ำกว่าในลำน้ำช่วงบน (บริเวณที่ 3) เพราะมีปริมาณน้ำเจือปนน้อยมาก และจะพบการเน่าเสีย ณ บริเวณที่ 5 ทุกครั้งที่ฝายน้ำล้นมิได้ระบายน้ำติดต่อกัน 2-3 วัน

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงลำน้ำพองส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำพอง จึงเป็นที่น่าห่วงใย โดยเฉพาะลำน้ำพองช่วงบนเหนือฝายน้ำล้น เพราะน้ำในบริเวณนี้นอกจากจะใช้เพื่อการเกษตรแล้วยังใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ซึ่งบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะพบว่าน้ำประปามีสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็นไม่น่าบริโภค และอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้หากได้รับการสะสมเป็นเวลานานๆ ส่วนลำน้ำพองส่วนที่ถัดฝายน้ำล้นลงมาแม้คุณภาพจะต่ำกว่าน้ำในช่วงเหนือฝายน้ำล้นๆ แต่ก็ยังสบายใจในแง่ที่ว่า เป็นน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคและเพื่อการอุตสาหกรรมเท่านั้น

สามารถกล่าวได้ว่าการจัดตั้งโรงงานเป็นสาเหตุทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสูญเสียไป ทั้งนี้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านบริเวณฝั่ง

13 (ห้วยโจด) และลำน้ำพองได้ฝายน้ำล้นกว่าก่อนโรงงานมาตั้ง พวกเขาสามารถหาปลาได้วันละหลายๆ นอกจากจะพอรับประทานแล้วยังสามารถนำไปขายเพื่อการยังชีพได้อีกด้วย แต่บัดนี้พวกเขาไม่สามารถหาปลาจากแหล่งน้ำนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายที่แหล่งโปรตีน ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติได้ ของชาวขอนแก่น ได้ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิง

สรุปผลกระทบจากแหล่งเกษตรกรรมต่อลำน้ำพอง

ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ย

จากการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรท ฟอสฟอรัส ในรูปฟอสเฟต และโปแตสเซียม พบว่ามีค่าตั้งแต่ nil-7.04, nil-1.68 และ 2.83-10.00 mg/l ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยตลอดปีของธาตุทั้งสามตัว จะพบว่าลำน้ำพองมีโปแตสเซียมมากที่สุด รองลงมาคือไนเตรท และฟอสเฟต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพดินเค็มของอีสาน ที่ทำให้มีโปแตสเซียมจากดินถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่มาจากน้ำทิ้งโรงงาน

เมื่อพิจารณาปริมาณของธาตุทั้งสามที่ใช้เป็นปุ๋ย กับแหล่งเกษตรกรรมในบริเวณลำน้ำพองพบว่า

(1) ในบริเวณลำน้ำพองตอนบน มีแหล่งเกษตรกรรมใหญ่ บริเวณบ้านห้วยทราย (จุดที่ 3) เกษตรกรปลูกข้าว และมีการปลูกผักใช้บริโภคในครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณใกล้เคียง (จุดที่ 1, 2 และ 4) ในฤดูการปลูกข้าว พบว่าปริมาณไนเตรท และฟอสเฟตมีค่าค่อนข้างสูง แต่ปริมาณโปแตสเซียมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเกษตรกรบริเวณนี้ใช้ปุ๋ยผสมของไนโตรเจน


และฟอสเฟตบ้าง แต่การเปลี่ยนแปลงของธาตุเหล่านี้ไม่เด่นชัดมากนัก ส่วนในฤดูปลูกผัก เมื่อเปรียบเทียบจุดที่ 3 กับจุดใกล้เคียง พบว่า ธาตุทั้งสามมีปริมาณไม่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่า การใช้ปุ๋ยในการเกษตรกรรมไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำพอง

(2) ในบริเวณลำน้ำพองตอนล่าง มีแหล่งเกษตรกรรมใหญ่ ๆ อยู่ 2 แหล่ง ได้แก่ บ้านห้วยเสียว (จุดที่ 14) และบ้านกุดกว้าง (จุดที่ 16) มีการเกษตรกรรมหนาแน่นมากที่สุด มีการปลูกพืชผักเพื่อการค้า ในฤดูการทำนา พบว่าปริมาณไนเตรท ฟอสเฟต และโปแตสเซียม ไม่แตกต่างจากช่วงเวลาที่ไม่ใช่ฤดูทำนาแต่ถ้าเป็นฤดูการปลูกผัก พบว่า จุดที่ 16 มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน

สูงพอสมควร แต่ปริมาณฟอสเฟตและโปแตสเซียมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยคอกในบริเวณดังกล่าว

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของธาตุทั้งสามตัวจากแหล่งเกษตรกรรมบ้านห้วยทราย บ้านห้วยเสียว บ้านกุดกว้าง กับจุดน้ำทิ้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟีนิกซ์และโรงงานน้ำตาล ดังแสดงในกราฟรูปที่ 7 จะเห็นว่า ปริมาณธาตุทั้งสามในน้ำทิ้งจากโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานผลิตเยื่อกระดาษมีค่าสูงมากอย่างเห็นได้ชัดจนจึงสรุปได้ว่า ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยในการเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำพองไม่ชัดเจนเท่าผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม

(อ่านต่อฉบับหน้า)



รูปที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยของคอกิจของน้ำโครเจนในรูปไนเตรท ฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตและโปแตสเซียม (mg/l) กับระยะทางโดยพลอตจุดที่ 3,7,8/1 และ 16 และ 17 ซึ่งอยู่นอกลำน้ำด้วย

ใคร่จดจำ



“อุศยา”

เกร็ดความรู้ เป็นคอลัมน์ที่นำเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่พบเห็นตามปกติ มาอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ สำหรับในฉบับนี้ขอนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาเสนอให้ทราบดังนี้

ความรู้ (บางอย่าง) เรื่อง “โลก”

นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ และได้ข้อสรุป (บางอย่าง) ออกมาดังนี้

อายุของโลก	ประมาณ	2,000 - 4,000 ล้านปี
น้ำหนักโลก	ประมาณ	7,000 ล้านล้านล้านตัน
รัศมีของโลก	ประมาณ	6,000 กิโลเมตร
ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย	ประมาณ	5.5

และเชื่อว่า ภายในโลกยังร้อนอยู่ เนื่องจากพบว่าเหมืองแร่ที่เจาะลงไปลึก ๆ ได้แสดงอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสต่อความลึกประมาณ 50 เมตร

ความรู้เรื่อง “ทางช้างเผือก”

นักดาราศาสตร์ประมาณว่า ในท้องฟ้ามีกาแลกซี (กลุ่มดาว) อยู่ประมาณ 75 ล้าน กาแลกซี และ “ทางช้างเผือก” เป็นชื่อกาแลกซีที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยกลุ่มดาวหลายล้านดวงที่เรียงตัวเป็นรูปคล้ายวงกลม 2 วงที่วางตะก้น ดาวอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ อยู่ทางประมาณ 2 ใน 3 ของระยะทางจากจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกไปยังขอบของมัน ดาวส่วนมากที่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของกาแลกซีทางช้างเผือก

ความรู้เรื่อง “แสงสว่างในตัวหิ่งห้อย”

หิ่งห้อย เป็นแมลงชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีแสงสว่างในตัว ดังที่เราพบเห็นในเวลากลางคืน แสงดังกล่าวนี้เป็นแสงที่ปราศจากความร้อนที่เรียกว่า แสงนวล (luminescence) และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เหมือนแสงทั่วไป คือ สามารถหักเหได้ สะท้อนได้ และสามารถวัดปริมาณได้ ปริมาณของแสงสว่างในตัวหิ่งห้อยมีน้อยมาก คือมีประมาณ 1 ใน 1,000 ของแสงจากเทียนไขธรรมดา

แสงสว่างในตัวหิ่งห้อย เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสาร ลูซิเฟอริน (Luciferin) กับออกซิเจน โดยมีเอนไซม์ลูซิเฟอเรส (luciferase) เป็นตัวช่วย (catalyst) สารและเอนไซม์ดังกล่าวมีอยู่เฉพาะในตัวหิ่งห้อยเท่านั้น

ความรู้เรื่อง “ลูกผสม”

โดยปกติแล้วสัตว์ต่างชนิดกันจะไม่ผสมพันธุ์กันเอง แต่ด้วยความคิดที่จะปรับปรุงพันธุ์เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์สร้าง “ลูกผสม” ระหว่างสัตว์ต่างชนิดกันขึ้นมา ด้วยเทคนิคการผสมเทียม ลูกผสมที่เกิดขึ้นบางกรณีก็มีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น มีความแข็งแรง อุดทน เชื่อง ฉลาด มากกว่าชนิดของพ่อแม่ แต่บางกรณีก็มีลักษณะด้อยกว่าชนิดของพ่อแม่ ตัวอย่างของลูกผสมที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว จากพ่อ - แม่ต่างชนิดกัน มีดังนี้

ล่อ (Mule)	เป็นลูกผสมระหว่าง	ม้า กับ ลา
ซองกี (Zonkey)	เป็นลูกผสมระหว่าง	ม้าลาย กับ ลา
ยาคาว (Yakow)	เป็นลูกผสมระหว่าง	จามรี กับ วัว
บีฟาโล (Beefalo)	เป็นลูกผสมระหว่าง	วัวเนื้อ กับ ควายป่าไบซัน
กีพ (Geep)	เป็นลูกผสมระหว่าง	แพะ กับ แกะ
ไลเกอร์ (Liger)	เป็นลูกผสมระหว่าง	สิงโต กับ เสือ
ไทกลอน (Tiglon)	เป็นลูกผสมระหว่าง	เสือ กับ สิงโต

ลูกผสมที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นหมัน ไม่สามารถสืบลูกหลานต่อไปได้ ดังนั้นการสร้างลูกผสมจึงไม่ใช่เป็นการสร้างสายพันธุ์สัตว์ชนิดใหม่ อย่างไรก็ตามการสร้างลูกผสมก็ให้ประโยชน์ในการศึกษาด้านพันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ



ครุฑนึ่งเรื่อง ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 16 (2531)

เรื่อง	ฉบับที่ (หน้า)
เคมี	
การไทเทรตแบบเทอร์โมเมตริก	1 (41-49)
โซนิโกรา	4 (191)
จริงหรือ.....ที่ว่าหวาน	2 (69-70)
ตะกั่ว.....หรือจะสู่ทะเล	3 (128)
ตัววัดสัญญาณชนิดจับอิเล็กทรอนิกส์	1 (26-32)
น้ำ • ไฟฟ้า	2 (64)
โปรตีนมีส่วนในการทำลายเซลล์ที่ถูกฉายด้วยรังสี	3 (135-137)
ผลกระทบของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพ ของน้ำในลำน้ำพอง	2 (96-118), 4 (227-235)
ภัยจากพิษแปลกปลอมในอาหาร	3 (125-127)
มฤตยูเงียบที่คามอรูน	1 (15-17)
ไม่น่าเชื่อ	1 (9-10)
ว่าด้วยเรื่องอาหารโปรตีน (สำหรับนักวิ่ง)	2 (74-81)
สัพสมอาหาร	4 (181-183)
สวน (ของ) นักเคมี	1 (5)
อลูมิเนียมกับสนิม	4 (186-187)
คณิตศาสตร์และสถิติ	
กราฟช่วยเราแก้ปัญหาได้อย่างไร	2 (65-68)
การจัดการการเลี้ยงกบ	1 (50-52)
คำตอบสมการตัวแปรเดียวในจำนวนเต็มเกาส์	1 (18-21)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มหมของนักเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์จำแนกประเภท : กรณีศึกษา	4 (219-226)

เรื่อง

ฉบับที่ (หน้า)

ชีววิทยา

การผลิตเบต้า - กาโรทีน โดยยีสต์	1 (53-56)
การเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลา	4 (192-194)
தாகทะเล	1 (22-25)
เทคโนโลยีชีวภาพ กับ ผลิตผลจากพืช	3 (138-142)
ผลกระทบของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพของน้ำในลำน้ำพอง	2 (96-118), 4 (227-235)
ผลของขัดมอญต่อการฝังตัวของตัวอ่อนและการเจริญของตัวอ่อนในหนูขาว	2 (92-95)
พืชปลดปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมเพื่ออะไร	4 (200-206)
มะละกอ : พืชสารพัดประโยชน์	4 (195-199)
ภัยจากพิษแปลกปลอมในอาหาร	3 (125-127)
ยังจะใช้ <i>Eugenia</i> กับพืชสกุลชมพู่อีกหรือ?	3 (129-134)
ว่าด้วยเรื่องอาหารโปรตีน (สำหรับนกวิ่ง)	2 (74-81)
สมุนไพรที่ใช้ทา	2 (87-91)
อนุกรมวิธานของกล้วยไม้ในสกุลช้าง	2 (71-73)

ฟิสิกส์

ดาราศาสตร์ไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	3 (143-169)
รังกีนน้ำทำไมตัวงอ	1 (6-8)
วิธีการของความโค้ง	1 (33-40)
Preparation and Electrical Properties of CdTe	4 (214-218)

เกษตรศาสตร์

การทดสอบความต้านทานของข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	3 (170-176)
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการงอกของสปอร์ <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสของถั่วสัโตโล	4 (207-213)
ไอโซไทปเสถียรของธาตุคาร์บอนกับการกำหนดคุณภาพของปุ๋ยคอก	2 (82-86)

อื่น ๆ

พบนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2530	1 (11-14)
สาส์นจากประธานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4 (184-185)

วรรณคดีผู้เขียนในวารสาร วิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 16 (2531)

ผู้เขียน	ฉบับที่ (หน้า)	ผู้เขียน	ฉบับที่ (หน้า)
ชศยา	1 (57-58), 2 (119-120), 3 (177-178), 4 (236-237)	เพ็ญประภา ทาบุตรณ	3 (125-127)
ขาว เหมือนนางค์	3 (143-169), 4 (184-185)	ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย	2 (71-73)
เฉลิม เรื่องวิริยะชัย	1 (9-10), 2 (69-70), 3 (128), 4 (191)	ยุวดี วัฒนโกศาณ	4 (181-183)
สุติมา กุญสมุทร และคณะ	2 (96-118), 4 (227-235)	รัชณี ฉวีราช	4 (195-199)
ดร. เพ็ญ	1 (5), 2 (64), 3 (124), 4 (188-190)	รังสรรค์ เนียมสนิท และคณะ	4 (219-226)
ศรिताกรณ ชุศรี	2 (74-81)	ละออศรี เสนาะเมือง	1 (22-25)
เดือนใจ ไก่สกุล	4 (200-206)	วิทยา มะเสนา	2 (82-86)
ถาวร วินิจสานันท์	4 (207-213)	วิทยา อมรกิจบำรุง	1 (6-8), 1 (11-14)
ทรงยศ พิเศษกุล	2 (87-91), 3 (170-176)	วิรัช ว่องพัฒนากุล	1 (26-32)
ทิพย์วัลย์ กำแหง	1 (41-49)	สมศักดิ์ สร้างบิน	3 (135-137)
เที่ยง ภูมิสะอาด	1 (18-21)	สยาม ชูถิ่น	1 (33-40)
ประนอม จันทโรทัย	3 (129-134)	สุนันทา เสงี่ยมิ	1 (15-17)
พาลี วรรณนิชกุล	3 (138-142)	สุรศักดิ์ รอดทอง	1 (53-56), 4 (192-194)
		อโนทัย ตริวนิช	1 (50-52)
		อำพา เหลืองภิรมย์	2 (92-95)
		อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์	2 (65-68)
		A. Hatsamin and others	4 (214-218)

คอลัมน์นี้มีรางวัล



เล็ก ๆ น้อย ๆ กับฟิสิกส์


1. ในการผสมชาดำคนำแมลงแก่ฟิช บางครั้งเกษตรกรจะเติมน้ำสบู่ลงในส่วนผสมของชาดำแมลงกับน้ำแล้วควนให้เข้ากันอย่างดีก่อนจะทำการฉีดใส่ใบพืช ที่เติมน้ำสบู่ลงไปเพื่ออะไร?
ก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ยาออกฤทธิ์เร็ว ข. เพื่อเพิ่มแรงตึงผิวให้แก่ยาขับใบพืช
ค. เพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำยากับใบพืช
2. บางครั้งเราเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินฟ้าร้อง ท่านคิดว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากคุณสมบัติข้อใดของเสียง
ก. การสะท้อน ข. การหักเห ค. การแทรกสอด ง. การเลี้ยวเบน
3. โทรศัพท์ที่ใช้สายเป็นตัวนำสัญญาณนั้น สัญญาณที่ถูกส่งไปหาผู้ฟังที่อยู่ปลายอีกปลายข้างหนึ่งของสายเป็นสัญญาณอะไร?
ก. เสียง ข. ไฟฟ้า ค. แม่เหล็กไฟฟ้า

...ส่งคำตอบมาทางไปรษณีย์บัตร ภายในเดือน ธันวาคม 2531 รางวัลใหญ่ กำลังรอคุณอยู่นะคะ


....น.ส. TINA....

เฉลย.... กณิต...กิดเพลิน (ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2531)

1. สมมุติว่ามีเหรียญบาทวางอยู่ 2 แถวๆ ละ 5 อัน ให้ย้ายเหรียญได้เพียง 4 อันไปวางอยู่ที่ใดก็ได้ที่ไม่อยู่ตรงหัวเหรียญอันอื่นในแนวดิ่ง ซึ่งเมื่อย้ายไปวางแล้วต้องสามารถลากเส้นตรงได้ 5 เส้น โดยแต่ละเส้นผ่านจุดกึ่งกลางของเหรียญ ทุกๆ แถวได้แถวละ 4 เหรียญด้วย



รูปที่ 1 เหรียญที่ถูกกำหนดให้เคลื่อนย้ายได้ 4 อัน และทิศทางที่จะต้องย้าย



รูปที่ 2 เมื่อย้ายเหรียญไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วจะได้สร้างรูปที่ 2 และจะสามารถลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางเหรียญต่างๆ จำนวนเส้นละ 4 เหรียญได้ 5 เส้นตามต้องการ

2. จงหาค่า y ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ซึ่งทำให้สามเหลี่ยม

ซึ่งมีจุดยอดที่ $A(0,2)$, $B(1,y)$ และ $C(2,0)$ เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม ABC เป็นมุมฉาก

ตอบ $y = 1 + \sqrt{2}$ หรือ $1 - \sqrt{2}$

.....ปัญหาฉบับที่ 2 นี้ไม่มีท่านใดตอบถูกเลย ทางเรารู้สึกเสียใจที่รางวัลไม่ได้มอบให้กับท่านใดเลย โอกาสหน้าร่วมสนุกกับเราใหม่นะคะ

....น.ส. TINA....

