



วารสาร

วิทยาศาสตร์ชุมชน.

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2532



ฉบับวันวิทยาศาสตร์ไทย

2532



วารสาร

วิทยาศาสตร์ปู.
THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ISSN 0125-2384

เจ้าของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน

ตึก 6 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ค่าบำรุง ปีละ 40 บาท ทยอยปลีกละ 12 บาท

การบอกรับเป็นสมาชิก

แจ้งความจำนงค์เป็นจดหมาย หรือโทรออก
ใบสมัครเป็นสมาชิก พร้อมส่งค่าบำรุง
เป็นธนาคติ หรือเช็คไปรษณีย์ในนามของ
นางบุญคุ้ม เหลือล้ำ ฝ่ายจัดการ ส่งจ่าย
ป.ท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ที่ปรึกษา

คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

บรรณาธิการ

พานี วรรณธิกุล

บรรณาธิการผู้ช่วย

สมศักดิ์ สร่งบิน

กองบรรณาธิการ

ไพบุลย์ มงคลถาวรชัย

ปริญญา ชีรมงคล

อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์

ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์

รัชณี นววิราช

อโนทัย ตรวีนาธิ

วิทยา อมรกิจบำรุง

สยาม ชูถิ่น

สุชัย ตันยอชฌาตุณ

ฝ่ายศิลป์และภาพ

ทรงเวทย์ เบ้าชัย

ฝ่ายเหรียญกษาปณ์

ลักขณา สุขบาง

ฝ่ายจัดการ

บุญคุ้ม เหลือล้ำ

บุษราภรณ์ ดวงคำน้อย

สมศักดิ์ อุ่นจันทิ

พยอม เดชพลมาตย์

อาน มหามูล



บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารนี้เป็นของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับทัศนะของกองบรรณาธิการ


วารสาร

วิทยาศาสตร์ชุมชน

THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

136



143

บริษัท ไทยศรีนครประกันภัยและสวิตินค้า จำกัด

บริษัท ไทยเอเชียประกันภัย จำกัด

บริษัท กมลสุโขทัยประกันภัย จำกัด
KAMOL SUKOSOL INSURANCE COMPANY LIMITED



อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด
PATRA INSURANCE CO., LTD.

147



กำหนดการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 121

คอลัมน์ประจำ

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองบรรณาธิการ 123

จดหมายข่าว สมาคมวิทยาศาสตร์ สาขากาชา
ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช 126

ไม่ลองก็ไม่รู้
ดร.เพ็ญ 128

สารคดี-วิชาการ

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต
กิม ศักดิ์ทัศน์ 129

จระเข้
วิโรจน์ นุตพันธ์ 136

หากท่านไม่ยอมผัดหวังกับบริษัทประกันภัย
อโนทัย ตรวานิช 143

พรรณไม้ใน "บัวหลวง"
รัชณี นวราช 147

งานวิจัย

โครโมโซมและคาริโอไทป์ของแย้พันธุ์
Leiolepis belliana rubritaeniata (Mertens)
โรจน์ชัย ศัตราหา 152

การศึกษาต่อมพิษในผิวหนังและพฤติกรรมของอนุแรน
สุภากร พลภานุ และพาดิ วรณนธิกุล 157

พืชและสัตว์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตอนที่ 1 แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
ประนอม จันทร์โทย และคณะ 164

เบ็ดเตล็ด

เกร็ดความรู้
ชศยา 176

คอลัมน์นี้มีรางวัล
น.ส. TINA 179



0258323
วิทยาจารย์
THE JOURNAL OF SCIENCE KHONKAEN UNIVERSITY

ISSN 0125-2264

Publisher

Faculty of Science, Khon Kaen University,
Thailand.

Office

Faculty of Science Library, Building 6, Khon
Kaen University.

Objectives

1. To promote and propagate knowledge in all fields of science.
2. To publish results from research and studies by academic staff and students.
3. To be a medium for the exchange of knowledge and ideas among staff, students and those interested from both inside and outside the institute.

Publishing terms

four issues per annual volume
Issue no. 1 January - March
Issue no. 2 April - June
Issue no. 3 July - September
Issue no. 4 October - December

Subscription rate

40 baht per annum. Single issue price 12 baht.

Membership

Membership request can be made by letter or by completing the membership form, with the fee paid in the form of a postal order or postal cheque sent to Mrs. Boonkoom Lualon, Managing Committee, Khon Kaen University Post Office, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002.

Advisory Committee

Dean, Faculty of Science

Associate Dean for Academic Affairs

Editor

Panee Wannitikul

Associate Editor

Somsak Sarangbin

Editorial Board

Paiboon Mongconthawornchai

Parinya Theramongkol

Utith Inprasit

Chatchavan Ruengprapan

Rachaneè Chaveerach

Anotai Trevanich

Wittaya Amornkijbumroong

Siam Choothin

Suchai Tanaiaedchawoot

Songwate Bousechai

Artist

Treasurer

Luckana Sukbang

Managing Committee

Boonkoom Lualon

Bussaraporn Duangkomnoi

Somsak Unjantee

Payom Deipolamataya

Oan Mahamool



The views and opinions expressed in this journal are those of the authors, and do not necessarily reflect the views and opinions of the editorial board.

บรรณาธิการ แสดง



และแล้วก็ถึงวันที่ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และฉลองครบรอบ 25 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 จะมีการจัดงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าชาววิทยาศาสตร์ มข. ทุกรุ่น โดยจะ เริ่มรายการตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานนี้ค่ะ


สำหรับวารสารฉบับนี้ ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการครบถ้วน ท่านจะได้ทราบถึงประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เรื่องของบริษัทประกันภัยต่างๆ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ จระเข้ ซึ่งปัจจุบันเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก นอกจากนั้นเรายังเพิ่มคอลัมน์ใหม่ “พรรณไม้น้ำ” เป็นพิเศษ สำหรับท่านที่สนใจไม้ประดับในน้ำ ฉบับนี้ประดับด้วยดอกไม้ที่เรารู้จักกันดี “บัวหลวง”

ฉบับหน้าท่านจะได้พบกับผลงานใหม่ ๆ ของบรรณาธิการคนใหม่ พร้อมกับ ทีมกองบรรณาธิการชุดใหม่ พวกเรากองบรรณาธิการชุดเก่าขอถือโอกาสนี้ลาท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจและสนับสนุนวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ตลอดมา และหวังว่าจะยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไป

สวัสดีค่ะ

พาณี วรรณนิชกุล

๐ คำบรรยายภาพปกหน้าและปกหลัง ๐



ปกหน้า : นกยูงอินเดีย

(*Pavo cristatus* Linnaeus)

นกยูง จัดอยู่ใน Family Phasianidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกันกับไก่ฟ้า นกกระทา และนกคุ้ม นกยูงมีอยู่ 2 ชนิด คือ นกยูงอินเดีย หรือนกยูงสีน้ำเงิน พบในอินเดีย และซีลอน (Ceylon) กับ นกยูงไทย

หรือนกยูงสีเขียว (*Pavo muticus* Linnaeus) ซึ่งพบในอินเดีย พม่า ไทย จีน แหลมมลายู และเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

นกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 สงวนไว้ประดับธรรมชาติ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย มีหงอนเป็นขนสีเขียว ลักษณะเป็นพู่เรียวยาวขึ้นไป ส่วนนกยูงอินเดีย มีหงอนเป็นแผง ขนที่คอและบนหัวเป็นขนสั้น ๆ เหลืองเขียวแกมน้ำเงิน

ปกติ นกยูงหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก อาหาร ได้แก่ ลูกไม้ เมล็ดข้าว ผลไม้ ตัวแมลง ฯลฯ นอนในที่สูงอย่างธรรมชาติภายในป่าบนยอดไม้สูงและใหญ่

นกยูง ตัวผู้มีขนหางยาว สำหรับรำแพนเกี้ยวตัวเมีย ช่วงผสมพันธุ์ของนกยูงไทย เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคม ส่วนของนกยูงอินเดียจะเริ่มตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคม

ปกหลัง : นกกีวี (*Apteryx* spp.)

นกกีวี เป็นนกประจำชาตินิวซีแลนด์ จัดอยู่ใน Order Apterygiformes เป็นนกที่บินไม่ได้ ถึงแม้จะมีปีก 2 ปีก ยาวประมาณ 2 นิ้ว มีปากยาว 6 นิ้ว และมีรูจมูกอยู่ที่ปลายของปาก เนื้อปากมีขนแข็งยื่นออกมาช่วยในการรับสัมผัส ออกหากินในเวลากลางคืน อาหาร ได้แก่ หนอน แมลง ผลไม้

นกกีวีตัวเมียขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ออกไข่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในบรรดานกด้วยกัน เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว นกกีวีน้ำหนัก 8 ปอนด์ จะออกไข่หนัก 1 ปอนด์ ออกไข่คราวละ 1-2 ฟอง ไข่มีความยาวประมาณ 3-5 นิ้ว ระยะเวลาในการกกไข่ 75-80 วัน

นกกีวี มี 3 species ได้แก่ *Apteryx australis*, *A. haastii* และ *A. oweni*



ปกหน้า : ประนอม จันทรโณทัย เอื้อเฟื้อภาพ

ปกหลัง : อนุรักษ์ ธาณี เอื้อเฟื้อภาพ

บรรยาย : พาณี วรณนิธิกุล

กำหนดการ

การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวาระครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 สิงหาคม 2532

09.00-09.30	พิธีเปิด
09.30-10.30	การบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
10.30-10.45	พัก - อาหารว่าง
10.45-12.00	เสนอผลงาน แยก 2 ห้อง ห้องสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และห้องสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา	
10.50-11.10	DDT : ผลกระทบต่อการพัฒนาการของตัวอ่อนนก กระทาญี่ปุ่น รศ. สุภาพ ณ นคร
11.15-11.35	การเลือกอาหารและชักนำความชอบกินอาหาร ของหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน ดร.ณัฐภูมิ ธานี
11.40-12.00	การสำรวจหนอนพยาธิซึ่งพบในระบบทางเดิน อาหารของกระบือและสุกรของชาวไทยใต้ ผศ.พนิจ หวังสมนึก และคณะ
12.00-13.30	พัก - รับประทานอาหาร
13.30-14.30	การบรรยายพิเศษเรื่อง บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาชนบทไทย โดย รศ.นายแพทย์กระแสด ชนะวงศ์
14.30-14.45	พัก - อาหารว่าง
14.45-16.00	เสนอผลงาน แยกห้อง
14.50-15.10	บทบาทของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง อ.รสสุคนธ์ เหล่าไพบุลย์
15.15-15.35	การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอใน หลอดทดลอง รศ.บุญยืน กิจวิจารณ์ และคณะ
15.40-16.00	การประยุกต์เลเซอร์-รามานและ อินฟราเรด สเปกโตรสโกปีในกระบวนการเคมีและชีวภาพ ผศ.ดร.ไฉนพร ด้านวิรุฑ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ห้อง 3111 (ห้องปฏิบัติการ Ecology)	
10.50-11.10	การเตรียมสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิ สูง กลุ่ม Y-Ba-Cu-O ในห้องปฏิบัติ การ ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ชิตัง
11.15-11.35	ฟิล์มบางของเพชร ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
11.40-12.00	Cold Fusion ผศ.ดร.รงค์ รุ่งกรกานต์
14.50-15.10	กลุ่มหนึ่งของฟังก์ชันเชิงซ้อน รศ.ดร.สุชาติ จันทรทิพย์
15.15-15.35	การประเมินโครงการสร้างงานใน ชนบท ผศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
15.40-16.00	การแก้สมการเชิงซ้อนสองตัวแปร ในจำนวนเต็มเกาส์ ผศ.เทียง ภูมิสะอาด



การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
(15TH CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THAILAND)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรภาคเหนือ

ชื่อย่อ การประชุม ว.ท.ท. ครั้งที่ 15 (15 th STT CONFERENCE)

18-20 ตุลาคม 2532

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50002

จัดโดย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ร่วมกับ

สมาคมเคมี สมาคมคณิตศาสตร์ฯ สมาคมคอมพิวเตอร์ฯ

สมาคมฟิสิกส์ไทย สมาคมดาราศาสตร์ไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมธรณีวิทยาฯ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรฯ สมาคมโภชนาการ

สมาคมปราชญ์วิทยาฯ สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ เกษตรกรรมสมาคม

ทันตแพทย์สมาคมฯ แพทย์สมาคมฯ และสัตวแพทย์สมาคมฯ

28 มิถุนายน 2532 หมดเขตหอรับแบบฟอร์มบทคัดย่อ

30 มิถุนายน 2532 หมดเขตรับบทคัดย่อและเรื่องย่อ

23 กันยายน 2532 หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้า



นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2532

ศ.นพ.วิศิษฐ์ ลิตปรีชา

แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทุ่มเทให้กับงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไตมา 22 ปี ได้
รับการตัดสินให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2532

ผลงานวิจัยของ ศ.นพ.วิศิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไตในเมืองร้อนมีทั้งหมด 157 เรื่อง พิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ทั่วโลก เคยได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศ 41 ครั้ง

ที่เด่นที่สุดคืองานของท่าน ศ.นพ.วิศิษฐ์ จะเอาหลักธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในงานวิจัยด้วย มีหลักใหญ่ ๆ อยู่ 4 ประการ

1. ต้องมีจิตใจผ่องใส ไม่สับสน 2. สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 3. ต้อง
พยายามทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นตัวกระตุ้น เพราะงานวิจัยบางอย่างจะชวนให้คู่แข่งเสียก่อน
จะสำเร็จ ประการสุดท้าย 4. ต้องมีวิริยะสูง

ในอดีตก่อนจะมาเป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2532 นี้ เมื่อปี 2521 ได้รับรางวัลวิจัย
ดีเด่นจากจุฬาฯ เรื่อง "พยาธิสรีรวิทยาของโรคไตวายในมาเลเซีย" ปีถัดมา 2522 ได้รับรางวัลผลงาน
วิจัยโรคไตที่เกี่ยวข้องกับโรคเมืองร้อน

ต่อมาปี 2528 ได้รับรางวัล "แพทย์ที่มีผลงานดีเด่น" จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมรสกับคุณหญิงทิพาพร ไชยนันท์ หัวหน้าแผนกยาทุนหมุนเวียน รพ.จุฬาฯ มีบุตรชาย
1 คน คือ "ศิริวิทย์" กำลังเรียนอยู่ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์.

(จากเดลินิวส์ 8 กรกฎาคม 2532)

กรม.อนุมัติให้ตั้งอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์


นายสุวิทย์ ยอดมณี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้เห็นชอบการจัดตั้งอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ โดยโครงการนี้จะใช้ชื่อว่า “อุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Science and Technology Park) ซึ่งการจัดตั้งดังกล่าวจะสอดคล้องกับทรัพยากรความต้องการของสังคมและนโยบายของรัฐบาล จึงต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน กล่าวคือ จะต้องศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมทั้งสถานที่ตั้ง รูปแบบ การดำเนินงาน และสาขาเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง และจะต้องจัดตั้งและบริหารงานตามลำดับ ความสำคัญ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับงบประมาณที่จะใช้ นายสุวิทย์เปิดเผยว่า มี จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจัดตั้งอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น สำนักงานงบประมาณได้ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานแล้ว

(จาก เดลินิวส์ 8 กรกฎาคม 2532)

วอยเอเจอร์ พบ “ลมกรด” เหนือเนปจูน

ยานอวกาศวอยเอเจอร์-2 กำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวเนปจูน อันเป็นบริวารดวงที่ไกลขอบสุริยจักรวาล และรายงานให้ทราบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ถึงปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีวงแหวนคล้ายกระแสมืดพัดวนอยู่ในบริเวณขั้วใต้ของดาวดวงนี้



ภาพถ่ายดาวเนปจูน แสดงถึงสายลมกรดที่พัดผ่านส่วนขั้วใต้ของดาว ซึ่งยานวอยเอเจอร์ถ่ายส่งกลับมายังโลกได้สำเร็จ ทำให้เห็นภาพใกล้มากของดาวขอบจักรวาลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (รอยเตอร์)

กระแสดมดังกล่าวเต็มไปด้วยเมฆครีมี มีขนาดกว้างประมาณ 4,345 กิโลเมตร คาดเป็นวงอยู่ขอบนอกของดาว ทั้งนี้ตามรายงานของนักวิทยาศาสตร์ในหอสังเกตการณ์ที่ติดตามการเดินทางของยานอวกาศลำนี้ที่พาซาเดนา ในแคลิฟอร์เนีย

สิ่งที่ไม่เหมือนกับกระแส “เจ็ทสตรีม” ของโลกคือ กระแสดมของดาวเนปจูนนี้มีลักษณะเหมือนเส้นตรงเช่นเดียวกันกับที่พบในดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ หรือยูเรนัส (มฤตยู) ส่วนกระแสมืดกรดของโลกนั้น มักวิ่งสลับไปมาตามสภาพบรรยากาศพื้นล่างของโลก

(จาก สยามรัฐ 8 และ 9 กรกฎาคม 2532)

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประจำปี 2532

ดร.ลีปนันทน์ เกตุทัต ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแถลงว่า ในการประชุมของคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2532 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ ศ.ดร.ถาวร วัชรากย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2532

ดร.ลีปนันทน์กล่าวว่า ดร.ถาวรเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาพฤกษศาสตร์และเป็นผู้ที่ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเลียงเนื้อเยื่อพืช และเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของประเทศไทยที่นำวิธีการเลียงเนื้อเยื่อพืชมาใช้กับกล้วยไม้ในปี 2508 ซึ่งทำให้ประเทศไทยจากผู้สั่งเข้ากล้วยไม้กลายเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน

ดร.ถาวรยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการค้นพบและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผันแปรของเซลล์ร่างกายที่เกิดจากการเลียงเนื้อเยื่อที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการคัดเลือกพืชพันธุ์ที่มีลักษณะใหม่ที่ต้องการมาขยายพันธุ์ และผสมพันธุ์ตามแบบเดิมต่อไป การคัดเลือกพันธุ์ดังกล่าวมีบางลักษณะที่ไม่สามารถหาได้จากการคัดเลือกและผสมพันธุ์ตามหลักเดิมของเมลเดล ต่อมา ดร.ถาวร ได้ดำเนินการศึกษาต่อประมาณ 10 ปีอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จในการสร้างพันธุ์กล้วยไม้ที่มีลักษณะต่างไปจากเดิม และยังสามารถคัดเลือกพันธุ์

ข้าวที่เกิดจากความผันแปรขณะเลียงเนื้อเยื่อให้สามารถทนต่อความเค็มของเกลือได้สูง

นอกจากนั้น ดร.ถาวร เป็นนักวิจัยที่ทำงานด้านวิจัยแบบเน้นคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ผลิตความรู้ใหม่ๆ เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นงานที่มีศักยภาพซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่อง ศ.ดร.ถาวร วัชรากย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2532



ศ.ดร.ถาวร วัชรากย์ เกิดวันที่ 2 เม.ย. 2477 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรนายสหัสและนางเซย วัชรากย์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ รร.ปัญญานิธิ ระดับมัธยมศึกษาที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ทางไม้ดอก และไม้ประดับ จบปริญญาเอกพฤกษศาสตร์ ทางเซลล์พันธุศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ได้ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชเพื่อการศึกษาเลียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และทุนวิจัยขององค์การยูเนสโกเพื่อหาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ทนดินเค็มและดินเปรี้ยว ปัจจุบันเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(จาก สยามรัฐ 30 กรกฎาคม 2532)



จดหมายข่าว

สมาคมวิทยาศาสตร์

สาขากาดะวันออกเฉียงเหนือ

ความกับน้าของโครงการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนทางโทรทัศน์

สืบเนื่องจากวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2532) ได้เสนอ “จดหมายข่าวสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ สาขากาดะวันออกเฉียงเหนือ” ในเรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชนทางโทรทัศน์นั้น เมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไประยะหนึ่ง คณะทำงานของโครงการนี้ก็ได้ออกปฏิบัติงานจนทำให้ได้ผลงานก้าวหน้าอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถผลิตเป็นรายการแพร่ภาพออกอากาศได้ ทั้งนี้คณะทำงานปรารถนาที่จะให้ได้ผลงานที่ปรารถนั้บรรจง คงต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกภาพเพิ่มเติมการติดต่อเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และการให้เสียงบรรยายประกอบภาพ อย่างไรก็ดีในส่วนที่ได้ถ่ายทำและบันทึกภาพไว้แล้ว ประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องและอาจารย์ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้.-

1. นานาทศนะเกี่ยวกับปลาร้า

โดย อ.ไพโรจน์ สโมสร

2. พืชภัยต่อสุขภาพในการบริโภคปลาร้า

โดย อ.ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช

และ อ.สุชาติ ปริยานนท์

3. นานาทศนะเกี่ยวกับยาฆ่าแมลง

โดย อ.ไพโรจน์ สโมสร

4. พืชภัยต่อสุขภาพในการใช้ยาฆ่าแมลง

โดย อ.ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช

5. เกมกับสิ่งแวดล้อม

โดย อ.ตริตรภรณ์ ชุศรี

และ อ.ชุติมา กุคู่สมุทร

6. วิทยาศาสตร์เชิงธรณีวิทยา

โดย อ.สุวิน บุศรคำ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี อ.ขาว เหมือนวงศ์ เป็นประธานสมาคมฯ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อ.ศรีสมนตร์ สีตะธนี เป็นคณบดี ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่ง สำหรับความร่วมมือทางฝ่ายเทคนิค คณะทำงานโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก อ.พิสิฐฐี สันต์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ประมาณ มุสิกโปดก หัวหน้างานเวชณินัทสน์ และพิพิธภักดิ์ คณะแพทย-ศาสตร์ และ อ.สมพงษ์ สติธิพรหม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะทำงานโครงการนี้ยังมีความปรารถนาดีที่จะบันทึกภาพของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในอีกหลากหลายแง่มุม อาทิ เรื่องของเพชร-พลอย, เทคโนโลยีชีวภาพ, พงษุรส, สีสผสมอาหาร สมุนไพรไทย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม หากท่านสมาชิกของวารสารวิทยาศาสตร์ และท่านผู้อ่านที่เคารพท่านใดมีความประสงค์ที่จะให้คณะทำงานโครงการนี้เสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในแง่มุมอื่นใดบ้าง นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้นหรือหากท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาแจ้งให้พวกเราได้รับทราบเพื่อจักได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีสูงสุดสำหรับโครงการนี้ต่อไป และขอถือโอกาสนี้กราบขอพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

นายประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช

รองศาสตราจารย์ระดับ 9

ประธานโครงการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เพื่อประชาชนทางโทรทัศน์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ



โดย...ดร.เพียน

ไม่ลองก็ไม่รู้

บทความในชุด “ไม่ลองก็ไม่รู้” นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์โดยการทดลอง หรือประดิษฐ์เครื่องมืออย่างง่าย ซึ่งนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วยังคาดหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการสอนวิทยาศาสตร์ในแบบแผนปัจจุบันอีกด้วย

มาดูแลเหล็กเล่นโยกเยกแบบคู่ควบ

คราวนี้ตั้งชื่อให้มันเก๋ไปอย่างนั้นเอง หรือจะพูดว่าเรียกความสนใจก็คงไม่ผิด คล้ายๆ กับการประชุมสภาผู้แทนฯ ที่เรียกนัดพิเศษว่า **ลงมติไม่ไว้วางใจ** รมต. ซึ่งใครจะผิดถูกอย่างไร ฝ่ายรัฐบาลต้องชนะการลงคะแนนเสียงวันยังค่ำ ใครที่เบื่อการเมืองทำนองนี้แล้ว ขอเชิญมาเข้าห้องทดลองทำอะไรทำเล่นสนุกๆ พร้อมกับฮัมเพลง...“...อยู่คนเดียววว คงดีగా.....บอกลาการเมืองให้พอ...” แก้วแข็งซะให้เข็ด!



การเล่นโยกเยกแบบคู่ควบนั้น ที่จริงกำลังแปลมาจากต้นฉบับที่ว่า **coupled oscillation** ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของการโยกเยก (oscillation) ที่มีการถ่ายเทพลังงานจลน์จากส่วนหนึ่งของระบบไปยังอีกส่วนของระบบแบบย้อนกลับได้ พุดง่าย ๆ ว่าเมื่อส่วนหนึ่งแกว่งแล้ว อีกส่วนก็พลอยไกวตามไปได้ด้วย ถ้าพุดอย่างนี้แล้วยังงง ก็ลงมือลองกันดีกว่า เพราะ **...ไม่ลองก็ไม่รู้**

ขอให้ดูรูปข้างบน จะเห็นว่า A,B,C คือแม่เหล็กถาวรแบบแท่งสี่เหลี่ยม (ที่เคยลองใช้ขนาด 23x9x3 มม.) โดยขึ้นแรกวางแท่ง A ไว้บนพื้นราบก่อน แล้วจึงวางแท่ง B ให้ขั้วเหมือนกันอยู่ตรงกัน ก็จะเกิดแรงผลักขึ้น จากนั้นค่อยๆ เลื่อนแท่ง B เข้าหาแท่ง A จนในที่สุดจะเกิดภาวะสมดุลที่ทำให้แท่ง B ลอยอยู่เหมือนในรูป ส่วนแท่ง C ก็จัดการทำนองเดียวกัน

คราวนี้เคาะแท่ง B อย่างระมัดระวังให้แกว่งขึ้นลง ภายในวินาทีต่อมา แท่ง C ก็จะเริ่มไกวตัวขึ้นลงตามบ้าง และถ้าทั้งระบบมีสมมาตรดี การถ่ายเทพลังงานก็จะมีประสิทธิภาพมากจนแท่ง B และ C จะโยกเยกสลับรับจังหวะกันดีเหมือนปีกับกลองเขียวเหละ

หมายเหตุ การจัดระบบให้ได้สมมาตรนั้น ต้องอาศัยการลองค่อยๆ ขยับแท่ง B หรือ C ให้เข้าใกล้หรือออกห่างจาก A เล็กน้อย แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นและอย่าคิดมากเลยเถิดไปไหนเสีย

เอกสารอ้างอิง

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต

* กิม ศักดิ์ทัศน์

เมื่อกล่าวถึงไฟฟ้าสถิตเรามักจะไม่คิดว่าไฟฟ้าสถิตจะมีประโยชน์มีสามารถนำมาใช้ได้อย่างมากมาย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วแรงทางไฟฟ้าสถิตจะอ่อนมากเมื่อเปรียบเทียบกับแรงโน้มถ่วงและจะมีผลเพียงเล็กน้อยสำหรับวัตถุขนาดใหญ่ แต่สำหรับอนุภาคเล็กๆ (ขนาด 1-100 μm) แล้วแรงทางไฟฟ้าสถิตก็อาจจะมีค่ามากกว่าแรงโน้มถ่วงและผลของอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคได้ โดยที่แรงโน้มถ่วงมีค่าขึ้นอยู่กับมวลของอนุภาคแต่ประจุไฟฟ้าสถิตที่อนุภาคสามารถมีได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของอนุภาค ดังนั้นเมื่อขนาดวัตถุเล็กลงแรงไฟฟ้าสถิตก็จะค่อยๆทวีความสำคัญมากขึ้นจนกระทั่งสามารถใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดเล็กๆ ได้ ซึ่งการควบคุมการเคลื่อนที่โดยแรงไฟฟ้าสถิตนี้สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง หลักการดังกล่าวนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

โดยธรรมชาติแล้วอนุภาคหรือหยดของเหลวต่างๆ มักจะมีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วเกือบเสมอไป แต่สำหรับการจะนำไปประยุกต์ใช้งานแล้วจะต้องมีการเพิ่มประจุเพื่อให้อนุภาคหรือหยดของเหลวมีปริมาณประจุสูงสุด และทำให้ได้ประจุอย่างสม่ำเสมอ การทำให้อนุภาคมีประจุหรือการให้ประจุแก้อนุภาคนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี

ด้วยเทคนิคต่างๆ กัน แต่วิธีสำคัญที่จะกล่าวถึงซึ่งใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตมี 3 วิธี คือ

(1) การทำให้เกิดประจุโดยการเสียดสี วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและรู้จักกันมาเป็นเวลากว่า 2,500 ปีมาแล้วตั้งแต่ปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ทาเลส ค้นพบปรากฏการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต เมื่อเขานำแท่งอำพันไปถูกับผ้าไหมแล้วแท่งอำพันนั้นสามารถดูดวัตถุเล็กๆ เช่น ฝุ่นผงได้ หลักการของวิธีนี้ก็คือนำวัตถุสองชนิดมาขัดถูกัน อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากวัตถุหนึ่งไปเกาะบนวัตถุอีกชนิดหนึ่ง วัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนก็จะมีสถานะทางไฟฟ้าเป็นลบ ส่วนวัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนไปก็จะมีสถานะทางไฟฟ้าเป็นบวก ถ้าวัตถุทั้งสองเป็นฉนวนประจุที่ได้ก็จะเกาะและสะสมอยู่บนผิววัตถุ

(2) การทำให้เกิดประจุโดยวิธีโคโรนา (corona charging) วิธีนี้มักจะทำโดยให้ไฟฟ้าศักย์สูงๆ แก่ขั้วไฟฟ้าที่เป็นตัวนำปลายแหลมหรือเป็นลวดเส้นเล็กๆ สนามไฟฟ้าที่บริเวณปลายแหลมจะมีความเข้มสูงมาก (เพราะประจุไฟฟ้าจะมาสะสมอยู่บริเวณปลายแหลมมากที่สุด) ทำให้อากาศที่อยู่รอบๆ บริเวณปลายแหลมแตกตัวเป็นไอออน (ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้ มีค่าประมาณ 30,000 โวลต์/เซนติเมตร) ไอออนที่มีประจุตรงข้ามก็จะ

* อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถูกดึงดูดเข้าหาขั้วไฟฟ้าปลายแหลม ไอออนที่มีประจุเหมือนกับขั้วไฟฟ้าก็จะถูกผลักออกไป จึงเกิดเป็นกลุ่มไอออนรอบๆ ขั้วไฟฟ้า เรียกว่า การคายประจุแบบโคโรนา (corona discharge) การคายประจุนี้ถ้าเกิดขึ้นที่บริเวณขั้วบวก ก็จะเป็นประกายไฟสีฟ้ารอบๆ ขั้ว แต่ถ้าเกิดที่บริเวณขั้วลบก็จะมีสีแดงเรื่อๆ เมื่อมีอนุภาคผ่านเข้าไปในกลุ่มไอออน ไอออนเหล่านี้ก็จะถูกดึงดูดเข้าไปเกาะกับอนุภาค ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศกับอนุภาค และปริมาณประจุที่อนุภาครับได้จะมีค่าสูงสุดเมื่อแรงผลักที่เนื่องจากประจุนบนอนุภาคสมดุลกับแรงที่ดึงดูดให้ไอออนเข้ามาเกาะกับอนุภาค การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตในทางอุตสาหกรรมหลายอย่าง อย่าง มักจะใช้การทำให้เกิดประจุแบบโคโรนา โดยไม่นิยมใช้วิธีทำให้เกิดประจุโดยการเสียดสีเพราะการควบคุมปริมาณประจุที่อนุภาคได้รับนั้นกระทำไดยาก

(3) การทำให้เกิดประจุโดยการเหนี่ยวนำ วิธีนี้สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีสภาพเป็นตัวนำเท่านั้น และในทางปฏิบัติมักจะใช้ในการทำให้หยดของเหลวมีประจุ วิธีเหนี่ยวนำนี้มีหลักการดังแสดงไว้ในรูปที่ 1 กล่าวคือ อนุภาคที่อยู่บนขั้วไฟฟ้าบวกก็จะมีประจุบวก เมื่อทำให้อนุภาคนั้นหลุดออกจากขั้วไฟฟ้าก็จะกลายเป็นอนุภาคอิสระที่มีประจุบวก

สำหรับปริมาณประจุที่จะสามารถสะสมอยู่บนผิววัตถุได้มากที่สุดนั้น จะถูกจำกัดด้วยการทำให้อากาศที่อยู่เหนือผิววัตถุแตกตัวเป็นไอออน เพราะเมื่อวัตถุมีประจุมากขึ้นความเข้มของสนามไฟฟ้าเหนือผิววัตถุก็จะสูงขึ้น เมื่อประจุมากขึ้นถึงระดับที่ทำให้อากาศเหนือผิววัตถุแตกตัวเป็นไอออนได้แล้ว ถ้ามีประจุมากกว่านั้นประจุส่วนที่มากเกินไปจะถูกคายออกไป สำหรับอนุภาคทรงกลม ปริมาณประจุสูงสุดที่สามารถสะสมอยู่บนอนุภาคสามารถคำนวณได้จากกฎของเกาส์ โดยคำนวณหาสนามไฟฟ้า (E) เหนือพื้นผิวทรงกลมของอนุภาค (S) จากกฎของเกาส์ ซึ่งเขียนได้เป็น

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1)$$

โดยที่ q คือ ประจุทั้งหมดบนทรงกลม

ϵ_0 คือ ค่าสภาพยอม (permittivity) ของสุญญากาศ


สำหรับอนุภาคทรงกลมรัศมี a สมการ (1) ก็เขียนได้เป็น

$$E(4\pi a^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

นั่นคือ ปริมาณประจุสูงสุดที่อนุภาคทรงกลมจะมีได้

$$q_{\max} = 4\pi\epsilon_0 a^2 E_b$$

โดยที่ E_b คือ ความเข้มสนามไฟฟ้าที่ทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้



รูปที่ 1 การทำให้เกิดประจุโดยการเหนี่ยวนำด้วยการนำตัวนำมาสัมผัสกับขั้วไฟฟ้า

แต่สำหรับการทำให้มีประจุแบบโคโรนา นั้น ปริมาณ ประจุสูงสุดที่อนุภาคจะมีได้นั้น จะเป็นไปตาม ความสัมพันธ์

$$q_{\max} = 4\pi\epsilon_0 a^2 E_p$$

โดยที่ E คือ ค่าสนามไฟฟ้าขณะที่มีการรับประจุของ อนุภาคเกิดขึ้น

p เป็นค่าคงที่ ขึ้นอยู่กับค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ของอนุภาค ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-3


สำหรับการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตนั้น ใน ที่นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลาย ๆ ตัวอย่าง โดยจะกล่าวถึงเฉพาะหลักการอย่าง กว้าง ๆ เท่านั้น

เครื่องจับฝุ่นละอองโดยใช้ไฟฟ้าสถิต

(Electrostatic precipitator)

สำหรับในเชิงพาณิชย์แล้ว การประยุกต์ ของไฟฟ้าสถิตที่นับว่ามีประโยชน์มากที่สุดก็คือ การใช้ไฟฟ้าสถิตควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาค เล็ก ๆ เครื่องมือที่ใช้หลักการนี้และถูกนำไปใช้ งานในทางอุตสาหกรรมในระยะแรกสุดคือ เครื่อง จับฝุ่นละอองโดยใช้ไฟฟ้าสถิต ซึ่งได้สร้างขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี ค.ศ.1890 รูปแบบที่ง่ายที่สุดของ เครื่องจับฝุ่นละอองมีลักษณะดังรูปที่ 2 ซึ่งจะ ประกอบด้วย ท่อโลหะทรงกระบอกซึ่งต่อลงดิน (ground) ไว้ โดยมีเส้นลวดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในแนว แกนของท่อทรงกระบอก ทำหน้าที่คายประจุแบบ โคโรนา เมื่ออากาศที่มีฝุ่นละอองผ่านเข้าไปในท่อ อนุภาคฝุ่นก็จะได้รับประจุจากการคายประจุแบบ โคโรนาแล้วถูกผลักโดยแรงไฟฟ้าไปติดกับผนัง ท่อที่ต่อลงดินไว้ เครื่องกำจัดฝุ่นละอองหรือฝุ่น คำนที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบันนั้น โดยทั่วไป จะออกแบบให้มี 2 ส่วน คือ ให้มีบริเวณที่ทำให้ เกิดประจุกับบริเวณที่เก็บฝุ่นแยกจากกัน ทำให้

สามารถนำส่วนที่เก็บฝุ่นมาทำความสะอาดได้ สะดวก และยังมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% โดย สามารถจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 2-3 ไมครอน ได้ ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้สำหรับกำจัดควันบุหรี่ ในห้องทำงานด้วย



รูปที่ 2 แสดงหลักการทำงานของเครื่องจับฝุ่นละออง โดยใช้ไฟฟ้าสถิต


เทคนิคการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าสถิต

(Electrostatic coating techniques)

การเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าสถิต เช่น การเคลือบสี สามารถนำหลักการทำนองเดียวกับ เครื่องจับฝุ่นละอองมาใช้ได้ ซึ่งมีหลักการดัง แสดงไว้ในรูปที่ 3 วัสดุที่ใช้เคลือบจะเป็นพวก พลาสติก (thermoplastic) หรือพลาสติก-โมเซตติ้งเรซิน (thermosetting resin) ในการเคลือบ พลาสติกเหล่านี้จะถูกพ่นออกจากปืนฉีดพ่นผ่านเข็ม ปลายแหลมที่ติดอยู่ที่ปากกระบอก โดยที่เข็มปลาย แหลมนี้ต่ออยู่กับขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์สูง ๆ ทำให้ มีการคายประจุแบบโคโรนาที่บริเวณปลายแหลม เมื่อกลุ่มพ่นเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปก็จะได้รับประจุจาก ไอออนที่ได้จากการคายประจุแบบโคโรนา แล้ว


อนุภาคผงเหล่านี้ก็จะถูกสนามไฟฟ้าพาไปยังวัตถุที่ต้องการเคลือบซึ่งถูกต่อลงดินไว้ เนื่องจากอนุภาคผงเหล่านี้มีสภาพเป็นฉนวน ประจุไฟฟ้าของมันจึงยังคงอยู่และทำให้อนุภาคเหล่านั้นยังคงเกาะติดกับวัตถุที่ต้องการเคลือบถึงแม้ว่าจะเอาสนามไฟฟ้านั้นออกไปแล้วก็ตาม เมื่อเคลือบผิวได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็จะนำวัตถุนั้นไปเข้าเตาอบ ซึ่งจะทำให้ผงพลาสติกหลอมละลายเกิดเป็นฟิล์มสีเคลือบผิวอย่างสม่ำเสมอ วัตถุที่จะเคลือบผิวด้วยวิธีนี้จะต้องเป็นตัวนำหรือถ้าไม่เป็นตัวนำก็

ต้องทำให้ผิววัตถุนั้นมีสภาพเป็นตัวนำก่อน ข้อดีที่สำคัญที่สุดของวิธีนี้ที่เหนือกว่าการพ่นสีแบบธรรมดาที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือ ไม่ต้องสิ้นเปลืองสารละลายที่เป็นพิษและติดไฟได้ เช่น ทินเนอร์ ทั้งยังได้ผิวเคลือบที่สม่ำเสมอ แข็งแรง ทนทานต่อการขีดขูดด้วย ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถนำฝุ่นผงที่ไม่เกาะติดกับวัตถุและตกอยู่กลับมาใช้ได้อีก ทำให้ประหยัดผงสีเมื่อเทียบกับ การพ่นสีธรรมดา ถึงแม้ว่าวัสดุผงสีที่ใช้เคลือบจะมีราคาแพงกว่าก็ตาม



รูปที่ 3 ระบบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าสถิต

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบอีกแบบหนึ่งมีลักษณะ ดังรูปที่ 4 วิธีนี้เรียกว่า “electrostatic fluidized bed” วิธีนี้จะใส่ผงสีหรือผงวัตถุที่จะใช้เคลือบไว้ในถาด โดยให้ผงสีอยู่เหนือวัสดุที่มีรูพรุนและในส่วนตอนล่าง ของถาดจะมีที่วางให้อากาศผ่านเข้ามา อากาศจากด้านล่างจะดันให้ผงสีเคลื่อนไปมาบนพื้นรูพรุนและได้ผงสีจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเมื่อต่อเข้ากับไฟฟ้าศักย์สูงๆ ก็จะทำให้เกิดการคายประจุแบบโคโรนาที่บริเวณปลายแหลมของขั้วไฟฟ้า ทำให้




รูปที่ 4 ระบบเคลือบผิวแบบ Electrostatic fluidized bed

ผงสีได้รับประจุไฟฟ้าในการเคลื่อนวิธีนี้เฉพาะอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเท่านั้น ที่จะถูกดึงดูดขึ้นไปจากถาดไปยังวัตถุที่ต้องการเคลือบ จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาการเคลือบสีไม่สม่ำเสมอแต่ทั้งนี้ผงสีในถาดจะต้องเรียงตัวสม่ำเสมอด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบทั้งสองแบบนี้ปัจจุบันมีใช้อยู่ทั่วไป แต่การเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน


การเคลือบผิวโดยใช้ไฟฟ้าสถิตนี้อาจใช้กับสีในลักษณะที่เป็นของเหลวได้ด้วย โดยจะทำให้สีแตกตัวออกเป็นละอองฝอยๆ โดยใช้การพ่นล่าอากาศ (jet) หรือโดยหัวฉีดแบบจานหมุนหรือแบบรูปประฆัง หลักการเคลือบก็จะเหมือนกับสีผง กล่าวคือ ละอองสีที่ได้รับประจุจะเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นสนามไฟฟ้าไปยังทุกส่วนของวัตถุที่อยู่ภายในขอบเขตของสนามไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ละอองสีอ้อมไปเกาะด้านหลังของวัตถุที่ต้องการเคลือบได้ กระบวนการนี้เรียกว่า "wrap round" และเทคนิคของวิธีการนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ ในการพ่นยาปราบศัตรูพืชด้วย ซึ่งทำให้ยาสามารถไปเกาะที่ใบทั้งผิวนบนและผิวล่างด้วยนับว่ามีประ-

โยชน์มาก

หลักการในทำนองเดียวกับการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าสถิตอีกอย่างหนึ่งก็คือ เทคนิคที่เรียกว่า "ฟล็อกกิ้ง" (flocking) เป็นเทคนิคที่ใช้สนามไฟฟ้าช่วยในการเรียงตัวของเส้นใยต่างๆ โดยใช้หลักที่ว่า เมื่อเส้นใยวางตัวขวางท่ามกับสนามไฟฟ้าจะไม่อยู่ในสภาวะสมดุล กล่าวคือ ถ้าเส้นใยวางตัวท่ามกับแวนอนดังแสดงในรูปที่ 5 เส้นใยจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโพลาไรซ์ขึ้น แล้วแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อเส้นใยก็จะทำให้เกิดโมเมนต์ ซึ่งจะหมุนเส้นใยเหล่านั้นให้วางตัวขนานกับสนามไฟฟ้า ซึ่งเป็นสภาวะที่สมดุล ในขบวนการฟล็อกกิ้งนี้ เส้นใยจะถูกปล่อยให้ตกหรือพ่นออกจากหัวฉีดผ่านสนามไฟฟ้าลงบนพื้นผิวที่ติดกาวไว้ ดังรูปที่ 6 และโดยที่สนามไฟฟ้าจะทำหน้าที่เรียงเส้นใยเหล่านั้น จึงสามารถใช้สนามไฟฟ้าควบคุมความหนาแน่นของเส้นใยได้ จึงมักจะนำขบวนการฟล็อกกิ้งนี้ไปใช้ในการผลิตพรมหรือผลิตกระดาษปิดผนัง (wall-papers)




รูปที่ 5 เส้นใยในสนามไฟฟ้า



รูปที่ 6 ระบบเรียงเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต

จระเข้




*วิโรจน์ นุตพันธ์


จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งยังคงดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน อยู่ในอันดับ Crocodylia มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนมากจะพิจารณาจากรูปลักษณะ ทั้งจากลักษณะทั้งตัวและความแตกต่างของบางส่วนโดยเฉพาะ เช่น จากรูปร่างของปาก ของเกล็ดบนหัวและคอ ความแตกต่างของฟัน เป็นต้น

จระเข้ทั่วไปจะเรียกว่า Crocodile ในสกุล Crocodylus ซึ่งดูจะมีรูปร่างสมส่วนในเรือนร่างของจระเข้มากที่สุด มีจำนวนมากชนิดที่สุด เช่น จระเข้ไทย (*Crocodylus siamensis*) จระเข้อียิปต์ (*Crocodylus niloticus*) จระเข้จอนสัน (*Crocodylus johnsoni*) จระเข้เมซอน (*Crocodylus intermedius*) จระเข้นิวกินี (*Crocodylus novae-guineae*)


จระเข้ประเภทที่มีปากใหญ่ปานทุจะเรียกว่า Alligator เช่น อัลลิเกเตอร์มิสซิสซิปปี (*Alligator mississippiensis*), อัลลิเกเตอร์จีน (*Alligator sinensis*)



Alligator mississippiensis




Crocodylus niloticus




Alligator sinensis


จระเข้ที่มีขนาดเล็กและไม่ค่อยดุร้ายเรียกว่า Caiman เช่น ไคมานเวเนซุเอลา (*Caiman crocodilus*), ไคมานอเมซอน (*Caiman latirostris*) และที่อยู่ในสกุลอื่นๆ อีกเช่น ไคมานดำ (*Melanosuchus niger*), ไคมานปากลาย (*Paleosuchus palpebrosus*), ไคมานปากแหลม (*Paleosuchus trigonatus*) จระเข้เล็กแอฟริกา (*Osteolaemus tetraspis*)




Osteolaemus



Caiman crocodilus




Melanosuchus niger





Paleosuchus palpebrosus

จระเข้ที่มีปากเล็กยาวแหลมเรียกตะโขงหรือ จระเข้ปากกระทุงเหว Gavial คือตะโขงอินเดีย (*Gavialis gangeticus*) และตะโขงปากสั้น (*Tomistoma schlegelii*) ที่พบในประเทศไทย มาเลเซีย สุมัตรา และบอร์เนียว



Gavialis

อย่างไรก็ตามลักษณะทั่วไปของจระเข้ทุกประเภทคือ มีปากและหัวยาว รูขมุกและตายากสูง อยู่ส่วนบนของหัว คอสั้น ลำตัวกลมยาวมีเกล็ดบนคอและหนัง เกล็ดท้องเป็นแผ่นแบน ทางยาวใหญ่และแข็งแรงมีเกล็ดเป็นแผ่นใหญ่ตั้งสูงบนสันทาง ทางแบนทางด้านข้างขาสั้นทั้งขาหน้าและขาหลัง นิ้วตีนสั้นทั้งตีนหน้าและตีนหลัง ลื่นไม่

*Crocodylus siamensis*

ตามหัว หลัง ขาทั้งสี่และบนสันหางสีน้ำตาลอมเขียว ด้านข้างลำคอ ข้างตัวและข้างหางสีเหลืองอมเขียวอ่อนๆ มีลายสีน้ำตาลเข้มเกือบดำเป็นปื้นๆ โดยเฉพาะที่หางจะเป็นปื้นยาวเป็นแผ่น ขวางความยาวของหาง จนดูเป็นลายปล้อง 8-10 ปล้อง ท้องสีขาวหม่น อย่างไรก็ตามสีของจระเข้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

จระเข้ชนิดนี้เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทย เคยพบชุกชุมในภาคกลางและภาคเหนือบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ อาศัยอยู่ตามลำน้ำและบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เช่น บึงบอระเพ็ด แต่ในปัจจุบันถูกล่าจนเหลือน้อยมากหรือแทบจะกล่าวได้ว่าเกือบจะสูญไปจากถิ่นธรรมชาติในประเทศไทยเสียแล้ว นอกจากในประเทศไทยพบในกัมพูชา เวียดนามได้ และชาว


จระเข้ไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด ทั้งนี้เพราะคุณภาพของหนังดีมาก มีสีและลวดลายเด่นชัด ในเกล็ดของหนังไม่มีกระดูกฝังอยู่ทำให้พอกง่าย หนังไม่หนาและไม่บางเกินไป มีความเหนียว แต่ละเกล็ดมีขนาดเหมาะสม

กับการใช้งาน จระเข้ชนิดนี้จึงถูกล่าถูกฆ่าเอาหนังไปทำของใช้ เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ส่วนประกอบของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน จนกล่าวได้ว่าถ้าหากไม่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์โดยมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการโดยตรง จระเข้ชนิดนี้จะต้องสูญพันธุ์ไปในวันหน้าเป็นแน่

2. จระเข้ไอ้เก๋ยม จระเข้ น้ำเค็ม


Saltwater Crocodile

Crocodylus porosus porosus Schneider



จระเข้ไอ้เก๋ยม

ตามสถิติพบมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 8 เมตร รูปร่างเรียวยาวกว่าจระเข้ไทย ส่วนปลายจะแคบและเรียวยาวแหลมกว่า ไม่มีเกล็ดใหญ่ระหว่างท้ายทอยกับกลุ่มเกล็ดคอ อย่างจระเข้ไทย

*Crocodylus porosus*

จระเข้ไอเคียมสีกัลลายจระเข้ไทย แต่พบบางตัวและกลุ่มที่พบอาศัยแถบประเทศอินโดนีเซีย มักมีสีอ่อนและสีขาวยืดลงลายเข้มตามตัวมีเพียงแต้มเล็ก ๆ มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เหมือนกันทุกตัว ทำให้ดูคล้ายเป็นจระเข้เผือก ไอเคียมที่มีสีอ่อนเช่นนี้มักเรียกกันว่า "ไอทองกลาง" เพราะสีคล้ายสีเนื้อไม้ทองกลาง


ในประเทศไทยพบจระเข้ไอเคียมทางจังหวัดภาคใต้ ที่มีลำน้ำติดต่อกับทะเล พบอาศัยอยู่ตามป่าละเมาะป่าโกงกางชายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณใกล้ปากน้ำ เคยพบว่าแยกออกจากตัวอยู่ในทะเล และพบนอนผิงแดดตามหาดชายเกาะในทะเล แต่ส่วนมากจะพบมากในบริเวณน้ำกร่อย สามารถปรับตัวอยู่ตามบริเวณน้ำจืดได้ดี นอกจากในประเทศไทยแล้วยังพบในอินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ส่วนที่พบในลังกาเป็นชนิดย่อย คือ *Crocodylus porosus minikanna* Deraniyagala

นอกจากมีขนาดใหญ่หนักแล้วยังดุ เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากจระเข้ก็มักจะเป็นจระเข้ชนิดนี้ เมื่อครั้งมีซุกซุมจะมีเหตุการณ์ที่สัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข ลูกวัว แพะ ก็มลงไปกินน้ำ แล้วถูกจระเข้ซึ่งคอยที่อยู่ลากไปกิน


3. ตะโขง จระเข้ปากกระทุงเหว

False Gavial

Tomistoma schlegelii (S. Müller)



ตะโขง




Tomistoma

เป็นจระเข้ตัวใหญ่ ปากเรียวยาวคล้ายปากปลาเข็มและปลากะทุงเหว โตเต็มวัยมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 5 เมตร ปกติไม่ดุ ปากที่เล็กเรียวยาวคล่องแคล่วในการแสวงจับกินปลาในน้ำมาก

ตะโขงสีน้ำตาลแดง มีลายเข้มเป็นปื้นห่าง ๆ ท้องสีน้ำตาลอ่อน ในประเทศไทยพบเฉพาะในจังหวัดภาคใต้ตามน้ำกร่อย เป็นชนิดที่พบน้อยที่สุดในจำพวกจระเข้ที่พบในประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำโดยตรงและตลอดเวลา ชอบขึ้นอาศัยตามป่าเลนชายน้ำเป็นส่วนใหญ่จึงสามารถอยู่ตามบริเวณน้ำจืดได้ดี นอกจากในประเทศไทยแล้ว พบในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย



ตะโขงที่พบในอินเดียเป็นคนละสกุลกับตะโขงที่พบในประเทศไทย เรียกว่า "ตะโขงอินเดีย" (*Gavialis gangeticus* Gmelin) มีขนาดใหญ่กว่าและปากเรียวยาวกว่า



ไ้ทองกลาง



กะโหลกจระเข้ไทย



คัดจาก สารานุกรมสัตวศาสตร์ไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 39

กุมภาพันธ์ 2532.



กะโหลกตะโขง



หากท่านไม่ยากผิดหวัง กับบริษัทประกันภัย

* อินทัย ตริวานิช

บริษัท ไทยศรีนครประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด

บริษัท ไทยเอเชียประกันภัย จำกัด

บริษัท กมสสุโกศลประกันภัย จำกัด
KAMOL SUKOSOL INSURANCE COMPANY LIMITED



อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

ภัทรประกันภัย จำกัด
PATRA INSURANCE CO., LTD.

ไทยสมุทรประกันภัย

ทุกวันนี้ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น บริษัทประกันภัยก็ขยายตัวเพิ่มตาม กรมธรรม์ประกันภัยจึงมีสภาพเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งมีหลายราคาและคุณภาพก็ต่างกันไป จึงเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยมีการแข่งขันกันยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความลำบากใจแก่ผู้ที่คิดจะทำประกันมากกว่าจะเลือกประกันภัยกับบริษัทใดจึงจะดีเพราะถ้าหากพลาดพลั้งไป

ประกันกับบริษัทที่ฐานะไม่ดีเข้า เวลาเกิดภัยขึ้นซึ่งเป็นภัยที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ เวลาเรียกร้องค่าเสียหาย (claim) จากบริษัทก็จะกระทำไม่ได้โดยลำบากหรือบางครั้งอาจสูญเสียไปเลยก็ได้ ฉะนั้นจึงต้องพิจารณาว่าในการเลือกบริษัทประกันภัยนั้นจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรจึงทำให้เราผู้ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยจะไม่ผิดหวังในภายหลังได้

* อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกณฑ์การพิจารณาเลือกบริษัทประกันภัย

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริษัทประกันภัยที่ใครขอเสนอแนะนั้นจะแยกพิจารณาตามประเภทของการประกันภัยคือ

1. การเลือกบริษัทประกันวินาศภัย
2. การเลือกบริษัทประกันชีวิต

1. เกณฑ์การเลือกบริษัทประกันวินาศภัย⁽¹⁾

เกณฑ์ในการเลือกบริษัทที่จะทำประกันวินาศภัย อาทิเช่น ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันโจรกรรม เป็นต้น เราควรพิจารณาจาก

1.1 เงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ พิจารณาดูว่าในกรมธรรม์นั้นระบุถึงความคุ้มครองที่บริษัทจะให้ความคุ้มครองถึงภัยใดบ้างทั้งภัยโดยตรงและภัยต่อเนื่องใกล้เคียง ตลอดจนข้อยกเว้นภัยต่างๆ ที่บริษัทจะไม่คุ้มครองหากเกิดขึ้น และควรตรวจสอบว่าการให้ความคุ้มครองตรงกับจุดประสงค์ของเราหรือไม่ นอกจากนี้กรมธรรม์อาจมีการระบุถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เราปฏิบัติเมื่อเกิดภัยขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามบริษัทประกันภัยอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้เช่น การสำรวจค่าเสียหาย การพิสูจน์ การตีราคาค่าเสียหายสิทธิในการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในเงื่อนไขข้อใดหรือข้อความใด เราต้องรีบถามจากบริษัททันที นอกจากนี้ควรจะได้นำกรมธรรม์ของหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกันเพื่อจะได้ทราบว่าเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัทใดให้ประโยชน์แก่เรามากน้อยผิดกันเพียงใด บางบริษัทอาจให้ความคุ้มครองหมดทุกอย่าง บางบริษัทก็ให้ความคุ้มครอง

ไม่หมดหรือไม่ครบกับที่เราต้องการ บางบริษัทยอมให้เพิ่มเติมได้แต่บางบริษัทไม่ยอม เป็นต้น

1.2 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง พิจารณาจากอัตราเบี้ยประกันว่าสูงต่ำประการใด และอัตรานั้นสมควรหรือไม่ เพราะเราจะเห็นแก่เบี้ยประกันต่ำเพียงอย่างเดียวไม่ได้ บริษัทที่เสนออัตราเบี้ยประกันต่ำอาจให้ความคุ้มครองน้อยและบริการอาจไม่ดี หรืออาจเป็นการเสนออัตราต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อประกันแต่ในปีต่อไปเราอาจถูกขอเพิ่มเบี้ยประกัน โดยบริษัทอ้างเหตุผลต่างๆ นานาได้ และโดยที่เบี้ยประกันที่เรียกเก็บจากเราซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยนั้นประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของความเสียหายที่แท้จริง ค่าใช้จ่ายและกำไรของบริษัทนั้นอยู่ในระดับที่ยุติธรรมต่อเราเพียงใด ซึ่งจะดูได้โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายของบริษัทกับเบี้ยประกัน (Expense ratio) อัตราส่วนระหว่างค่าชดเชยค่าเสียหายทดแทนกับเบี้ยประกัน (loss ratio) และพิจารณาจากกำไรสุทธิจากการประกัน (Net underwriting) เช่น ถ้าอัตราส่วนระหว่างรายจ่ายของบริษัทกับเบี้ยประกันภัยสูง แสดงว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทสูงเกินไป ไม่ยุติธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย

1.3 ความมั่นคงทางการเงิน การที่จะทราบถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นอย่างไรนั้น จะต้องพิจารณาจากทรัพย์สิน (assets) หนี้สิน (liabilities) ทุนสำรอง (reserve) ส่วนเกินความรับผิดชอบ (surplus) แนวโน้มของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายกับค่าสินไหมทดแทนว่ามีระดับไปในทิศทางใดในปีที่ผ่านมา

⁽¹⁾ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวินาศภัย อ่านได้จากบทความเรื่อง "การประกันภัยช่วยท่านได้อย่างไร" ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข.ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2532.

มา สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะอยู่ในบัญชีประกอบการกับงบดุลประจำปีและรายงานกิจการประกันภัยจากสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกเป็นประจำปี นอกจากนี้เราต้องดูการลงทุนของบริษัทด้วยว่ามีความปลอดภัยเพียงใดด้วย โดยบริษัทประกันภัยจะนำเงินไปลงทุนในกิจการอื่นเพื่อให้ได้ดอกผลซึ่งจะใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันนั้นจะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510

1.4 การให้บริการ ได้แก่ บริการเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนจะต้องมีการดำเนินการด้วยความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรม มิใช่บริการเพื่อหาคนทำประกันภัยรายใหม่เท่านั้น จะต้องมีการบริการอย่างสม่ำเสมอ ไม่โยกโย้

2. เกณฑ์ทางเลือกบริษัทประกันชีวิต

สำหรับเกณฑ์ในการเลือกบริษัทประกันชีวิตซึ่งรวมทั้งการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลด้วยนั้นจะคล้ายกับการเลือกบริษัทประกันวินาศภัย คือเราจะพิจารณาจาก

2.1 เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต แม้จะแยกออกเป็นหลายแบบก็ตามแต่สามารถกำหนดแบบต่าง ๆ ไว้เป็นมาตรฐานคล้ายกันเกือบทุกบริษัท จะแตกต่างกันก็เพียงในเรื่องความหมายของคำบางคำเช่น คำว่า “อุบัติเหตุ” บางบริษัทถือว่าอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดจากการไม่เจตนาที่จะก่อให้เกิด บางบริษัทถือว่าอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดจากการไม่เจตนาหรือหากจะมีเจตนาแต่มิใช่เป็นเจตนากระทำต่อผู้เอาประกันโดยตรง นอกจากนี้ก็มีเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินกรณีสูญเสียอวัยวะบางอย่าง เช่น แขน ขา นิ้วมือ เป็นต้น ซึ่งอาจจ่ายเงินมากน้อยผิดกันบ้างแต่ไม่มากนัก ฉะนั้นเราควรต้องอ่านเงื่อนไขใน

กรมธรรม์ให้ละเอียด

2.2 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง การประกันชีวิตเป็นการประกันภัยระยะยาวและเมื่อประกันไประยะหนึ่งแล้วเกิดยกเลิกสัญญาก็ยังมีส่วนได้รับเงินที่เรียกว่ามูลค่าเงินสด (Cash Value) กลับคืน ซึ่งเราสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองได้จากการเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัยเรียกเก็บ (premium) ซึ่งจะทำให้เราทราบได้ว่าการประกันแบบเดียวกัน เงื่อนไขอย่างเดียวกัน จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากัน บริษัทใดเรียกเก็บมากน้อยกว่ากัน แต่ทั้งนี้ต้องดูการให้บริการของบริษัทควบคู่ด้วย

2.3 ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เราจะพิจารณาจากความปลอดภัยในการลงทุน และขนาดของเงินสำรองประกันชีวิต (policy reserve) ซึ่งคือเงินออมของผู้เอาประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายคืนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดหรือมีเหตุที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ว่ามีจำนวนเพียงพอต่อความรับผิดชอบต่อกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับหรือไม่ ซึ่งเงินสำรองประกันชีวิตเราจะดูได้จากบัญชีประกอบการกับงบดุลประจำปีและรายงานกิจการประกันชีวิตจากสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกเป็นประจำปี

2.4 การให้บริการ ก็พิจารณาเช่นเดียวกันกับการให้บริการของการเลือกบริษัทประกันวินาศภัย คือดูจากการอำนวยความสะดวกในการจัดการเวลาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์รายอื่น ๆ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมลงหรือได้รับบาดเจ็บ การให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ผู้เอาประกันภัยและเป็นการเสริมสร้างความศรัทธาเชื่อถือในบริษัทแก่ผู้เอาประกันภัย

ต่อไปนี้น่าจะคงจะไม่ผิดหวังหรือกลุ้มอก
กลุ้มใจเท่าไรนักหลังจากทำประกันภัยแล้ว ถ้า
หยุดคิดถึงเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกบริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้

กล่าวมาแล้วสักนิดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยกับ
บริษัทประกันภัยใด อย่าตัดสินใจทำประกันภัย
เพราะเชื่อคำพูดของตัวแทนหรือนายหน้าขาย
ประกันเพียงอย่างเดียว

A. Burnt Child Dreads Fire.

เด็กที่เคยถูกไฟไหม้ ย่อมจะกลัวไฟ

อยู่เสมอ



พรรณไม้บัว

* รัชณี ฉวีราช

บัวหลวง

มีพรรณไม้บัวหลายชนิดที่นำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันทั่วไปตามบ้าน ในกระถาง บ่อ หรือคูน้ำ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงไม้ประดับจากน้ำเพียงอย่างเดียวคือ บัวหลวง ซึ่งเป็นพรรณไม้บัวชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีทั่วประเทศไทย จะเห็นว่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป หรือตามบ้านที่มีสระน้ำที่ปลูกบัวเป็นไม้ประดับ เรามักจะพบบัวอยู่ 2 กลุ่มคือ บัวหลวงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปทุมชาติ และบัวสาย หรืออุบลชาติ ทั้งบัวหลวงและบัวสายมีข้อแตกต่างกันหลายอย่าง นักพฤกษศาสตร์จึงจัดไว้คนละสกุล (genus) บัวหลวงจัดไว้ในสกุล *Nelumbo* Adans. บัวสายจัดไว้ในสกุล *Nymphaea* Linn. แต่ทั้งบัวหลวงและบัวสายก็จัดเป็นพืชในตระกูล (family) เดียวกัน พืชในตระกูลนี้เป็นพรรณไม้บัวที่จัดเป็นไม้ประดับอยู่ทุกส่วนของโลก

บัวหลวง *Nelumbo* Adans. เป็นชนิดของพรรณไม้บัวที่มีอายุปีเดียวหรือหลายปีพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า Sacred lotus หรือ East Indian lotus แต่บางคนก็เรียกว่า Egyptian lotus มีถิ่นกำเนิดใน

เอเชียเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนแถบทะเลสาบแคสเปียนจนถึงญี่ปุ่น อินเดีย เปอร์เซียตะวันออกและออสเตรเลีย บัวหลวงสกุลนี้มีอยู่ 2 ชนิดสำหรับประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียวคือ *Nelumbo nucifera* Gaertn. มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดังนี้คือ

ลำต้นมี 2 แบบ (stem dimorphic) คือ ลำต้นที่อยู่ใต้ดินใต้น้ำ มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) เก็บสะสมอาหาร สีขาวหรือค่อนข้างแดง รูปทรงกระบอกยาว อีกแบบหนึ่งเป็นลำต้นที่อยู่เหนือดินใต้น้ำ มีลักษณะเป็น stolon ทอดยาวขนานไปกับพื้นดินลำต้นมีข้อและปล้องเห็นได้ชัดเจน ใบและดอกเกิดที่ข้อ แล้วมาเจริญที่เหนือน้ำหรือผิวน้ำรากเกิดที่ข้อ

ใบ เป็นใบเดี่ยว (simple leaf) ออกจากข้อของลำต้นแบบสลับ ใบลอยผิวน้ำหรือโผล่เหนือน้ำ ผิวใบมีนวล ใบอ่อนมีลักษณะม้วนตัว ใบเจริญเต็มที่ที่มีลักษณะกลม (orbicular) ขอบใบเรียบ มีสีเขียวเข้มหรือม่วง ด้านท้องใบมีสีค่อนข้างขาว ขนาดของใบ 20-60 เซนติเมตร โคนก้านใบตรงข้อมีหูใบที่มีลักษณะเป็นกาบบางแผ่นเล็กเรียวยาว

ยาวสีน้ำตาล 2 อันติดอยู่ ก้านใบติดอยู่ตรงกลางทางด้านท้องใบ (peltate leaves) มีหนามสั้นๆ ประปรายทั่วไป ใบชูขึ้นสูงเหนือระดับน้ำประมาณ 100-200 เซนติเมตร เส้นใบออกจากจุดกึ่งกลางใบที่ติดกับก้านใบ

ดอก เป็นดอกเดี่ยว ขนาดใหญ่ มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันอยู่สูงจากผิวน้ำประมาณ 10-25 เซนติเมตร ดอกบานเวลาเช้าและเริ่มหุบในเวลาบ่าย บานอยู่ 2 วัน จากนั้นอีก 2 วันกลีบจะร่วงหมด ดอกมี 2 สี คือ สีขาว และสีชมพู มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงด้านนอกมีสีเขียว ด้านในสีเดียวกับกลีบดอก มี 4-5 กลีบ หรือมากกว่า ร่วงง่ายกลีบดอกและเกสรตัวผู้มีจำนวนมาก บางพันธุ์มีเกสรตัวผู้ที่คล้ายกลีบดอก มีทั้งเป็นหมัน (sterile) และไม่เป็นหมัน (fertile) อับเรณูมีสีเหลือง เกสรตัวเมียมีรังไข่แบบสูปรีเรียโอวารี (superior ovary) ประกอบด้วยประมาณ 12-30 คาร์เปิล (carpel) แยกออกจากกัน (apocarpus) โดยแต่ละคาร์เปิลจะมีส่วนของฐานรองดอกเจริญขึ้นมาหุ้มไว้ ฐานรองดอกที่ขยายใหญ่แบบนี้เรียกว่า โทรัส (torus) หรือ ทาลามัส (thalamus) ก็คือส่วนที่เรารู้จักกันว่า "ฝักบัว" นั่นเอง

ผล เป็นผลกลุ่ม ผลย่อยแต่ละผลแก่แล้ว

ไม่แตก เปลือกแข็ง (nut) ผลย่อยมีรูปร่างคล้ายรูปไข่

บัวหลวงมีหลายพันธุ์และหลายชื่อ ซึ่งอาจแยกออกตามลักษณะ รูปร่างและสีของดอกได้ 6 พันธุ์ดังนี้คือ

1. บัวหลวงชมพู ปทุมปัทมา หรือโกกระณต ดอกขนาดใหญ่สีชมพู ดอกตูมเป็นรูปไข่ ปลายเรียว

2. บัวหลวงขาว บุญทริก หรือปทุมทริก ดอกขนาดใหญ่สีขาว ดอกตูมเป็นรูปไข่ ปลายเรียว

3. บัวหลวงชมพูซ้อน สัตตบงกชหรือบัวฉัตรชมพู ดอกขนาดใหญ่สีชมพู ดอกตูมเป็นรูปไข่ป้อม

4. บัวหลวงขาวซ้อน สัตตบุษย์ หรือบัวฉัตรขาว ดอกขนาดใหญ่สีขาว ดอกตูมเป็นรูปไข่ป้อม

5. บัวเข็มชมพู บัวปักกิ่งชมพู หรือบัวหลวงจีนชมพู ดอกขนาดเล็กสีชมพู ดอกตูมเป็นรูปไข่ ปลายเรียว

6. บัวเข็มขาว บัวปักกิ่งขาว หรือบัวหลวงจีนขาว ดอกขนาดเล็กสีขาว ดอกตูมเป็นรูปไข่ ปลายเรียว

ลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของดอกบัวหลวงทั้ง 6 พันธุ์แสดงไว้ในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 แสดงลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของดอกบัวหลวง 6 พันธุ์

ส่วนต่างๆ	บัวพันธุ์ ปทุมปัทมา	บัวพันธุ์ บุญทริก	บัวพันธุ์ สัตตบงกช	บัวพันธุ์ สัตตบุษย์	บัวพันธุ์ ปักกิ่งชมพู	บัวพันธุ์ ปักกิ่งขาว
ขนาดดอกตูม (ซ.ม.)	7.5×13.0	6.0×10.5	11.0×10.5	9.5×10.0	4.0×7.0	3.7×7.0
จำนวนเกสรตัวผู้	185×396	210×376	7-198	134-171	108-150	90-126
จำนวนเกสรตัวผู้ที่คล้ายกลีบดอก	-	-	117-338	117-279	-	-
สีดอก	ชมพู	ขาว	ชมพู	ขาว	ชมพู	ขาว



รูปที่ 1 บัวหลวง

รูปที่ 2 ขวานาฉัดยา
น้ำแมลง, เพลี้ย,
หนอน
(สกุลไทย: 1808)



รูปที่ 3 เก็บบัวบานเพื่อตัด
เอาเกสรบัวไปขาย
เป็นยาสมุนไพร
(สกุลไทย: 1808)

การขยายพันธุ์ บัวหลวงเป็นพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย นิยมขยายพันธุ์โดยการตัดเหง้าที่มีตา (bud) หน่อ (sprout) หรือโดยการแยกต้นอ่อนจากต้นแม่ (vegetative propagation) วิธีนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไป เพราะเห็นผลเร็วกว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเพาะเมล็ด โดยเพาะในภาชนะที่มีน้ำ เมล็ดจะเริ่มงอกจนมีใบแก่ ใช้เวลา 11-16 วัน การงอกเป็นแบบใบเลี้ยงฝังอยู่ใต้ดิน (hypogeal-germination) ต้นที่เริ่มมีใบในระยะแรกใบจะลอยที่ผิวน้ำ ต่อมาระยะหลังใบก็จะอยู่เหนือน้ำ ต้นใช้เวลาในการเจริญ 1-3 เดือน ถึงจะเริ่มมีดอกซึ่งนับว่าช้ากว่าการแยกเหง้าที่มีหน่อหรือต้นอ่อนไปปลูกมาก

ประโยชน์และโทษ บัวหลวงให้ทั้งประโยชน์และโทษ บางแห่งในที่ที่เราไม่ต้องการ เช่น แหล่งชลประทานต่าง ๆ ถือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่กำลังยากเพราะมีเหง้าใต้ดิน แต่ในขณะเดียวกันในที่ที่เราต้องการบัวหลวงก็จะมีประโยชน์มากมาย ปัจจุบันเกษตรกรในหลายจังหวัด เป็นต้นว่า จ.ปทุมธานี, จ.นนทบุรี ฯลฯ ทำนาบัวเป็นอาชีพ แทนการทำนาข้าวทั้งนี้เพราะสามารถเก็บผลผลิตขายให้รายได้ดีกว่าการทำนาข้าว มีการทาบุง, กำจัดโรคและแมลงต่าง ๆ เพื่อให้บัวหลวงเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตได้มาก บัวหลวงนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน โดยเฉพาะดอกและเมล็ด เกษตรกรสามารถที่จะเลือกได้ว่าระหว่างการทำนาบัวเพื่อตัดดอกขาย กับการทำนาบัวเพื่อเก็บเมล็ดขาย ประเภทไหนจะมีรายได้ดีกว่ากัน ปัจจุบันสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทยได้จัดบัวหลวงเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง ส่วนต่าง ๆ ของบัวหลวงที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มีดังต่อไปนี้

เหง้า ใช้เป็นอาหาร ยาบำรุงกำลัง ยาแก้ร้อนใน แก้ท้องร่วง แก้ประจำเดือน ผิดปกติ รักษาโรคจิตสัณฐาน บางครั้งรับประทานดิบหรือทำเป็นสลัด (อุทัย 2526, Burkill, 1966, Subramanyam, 1962)

เมล็ด ใช้เป็นอาหารทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่ (Burkill, 1966) ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง แก้กษัยและลำไส้อักเสบ (สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 2518)

ต้นอ่อน หรือที่เราเรียกกันว่า ตีบัว เข้าเครื่องยาจีนใช้เป็นยาลดไข้ แก้หวัดตกโรค แก้กระหายหลังจากอาเจียนเป็นเลือด ต้นอ่อนมีสารชนิดหนึ่งคือ methylcorypalline ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 2518, Burkill, 1966)

ดอก ใช้ประดับและใช้ในกิจกรรมทางศาสนา กลีบดอกใช้เป็นยาแก้โรคหนองใน แก้ท้องร่วง แก้ไข้ ยาบำรุงหัวใจ ช่วยให้เกิดลูกง่าย สมานแผล ใช้ทำเครื่องสำอาง กลีบดอกตากแห้งใช้มวนบุหรี่ เกสรตัวผู้เข้าเครื่องยาหอมบำรุงหัวใจจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า เกสรทั้ง 5 (เกสร มะลิ พิกุล สารภี บุนนาค บัวหลวง) เป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย ช่วยบำรุงหัวใจ แต่งกลิ่น (เพียว 2530) แก้ไข้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ สมานแผล ทำเครื่องสำอาง (สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 2518, Burkill, 1966)

ใบ ใบอ่อนต้มรับประทานเป็นผัก ใบแก่ใช้ห่อของ ใบแก่มีสารอัลคาลอยด์ (alkaloid) หลายชนิด ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ท้องร่วง แก้พิษเห็ดรา บำรุงเลือด ช่วยในการคลอดลูก รักษาโรคผิวหนังและห้ามเลือด

ผัก ใช้เป็นยาใส่แผลสดและห้ามเลือด แก้วพิษเห็ดรา

ก้านใบและก้านดอก ใช้ทำยาครรรักษา บำรุงกำลัง บำบัดแผลในลำไส้แก้มุตกิต (สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 2518) เส้นใยที่เป็นเกลียว (spiral fibres) จะถูกสกัดจากก้านดอก และจากส่วนต่างๆ ของลำต้น นำไปทำใส่ตะเกียง (Perry, 1972, Burkill, 1966)

สารเคมีที่พบในส่วนต่างๆ ของบัวหลวง มีดังนี้

ใบแก่ มีอัลคาลอยด์หลายชนิด ได้แก่ roemerine, nuciferine, anonaine, pronuciferine, N-nornuciferine, arnepavine, N-methylcoclaurine, dehydroroemerine, dehydronuciferine, dehydroanonaine และ N-methylisococlaurine

ผักบัว มีสารอัลคาลอยด์ nuciferine, N-nornuciferine, oxoushinsunine และ N-norameparvine

เมล็ดบัว พบ β -sitosterol, β -sitosterol fatty ester, glucose, palmitic acid, unsaturated keto acid และอัลคาลอยด์ (Dhar and Munjal, 1972)

ต้นอ่อนหรือดิบัว มีอัลคาลอยด์ ได้แก่ liensinine, isoliensinine, nuferine, neferinine, pronuciferine, lotusine, nornuciferine, roemerine, arnepavine, anonaine และ methylcorypalline (สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย, 2518)

นอกจากส่วนต่างๆ ของบัวหลวงจะมีคุณค่าทางสมุนไพรแล้ว ในแง่ของคุณค่าทางอาหารก็ยังมี ส่วนของบัวหลวงที่มีสารอาหารที่สำคัญคือ เมล็ดบัวแกะเปลือกแล้วมีโปรตีน (protein) ร้อยละ

22.99 คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ร้อยละ 63.58 ไขมัน ร้อยละ 15.3 เหน้มีโปรตีน ร้อยละ 8.23 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 73.78 และไขมัน ร้อยละ 0.47 (วาสนา, 2527)

จะเห็นได้ว่า บัวหลวง นอกจากจะเป็นพรรณไม้ประดับตามแหล่งน้ำแล้ว เรายังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นคือ เป็นอาหาร, เป็นสมุนไพร, ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา จากแทบจะทุกส่วนของมันได้อีก ซึ่งนอกจากเราจะใช้ประโยชน์จากบัวหลวงโดยตรงแล้ว โดยทางอ้อมก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่ดีพอสมควร

เอกสารอ้างอิง

1. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. 2530. **คู่มือการใช้สมุนไพร**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมดิคัล มีเดีย หน้า 110.
2. วาสนา มิตรานนท์. 2527. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลบัวหลวง (*Nelumbo Adans.*) ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. สุชาติ ศรีเพ็ญ. 2530. **พรรณไม้น้ำ**. หน้า 138-141.
4. Bailey, L.H. 1975. *Manual of cultivated plants*. 15th. 381-385.
5. Benson, L. 1975. *Plant classification*. 2nd ed. Massachusetts : Raytheon Education Company.
6. Rasett, N.C. 1969. *A Manual of Aquatic Plants*. 3rd ed. London : The University of Wisconsin Press. P. 210.
7. Lawrence, George H.M. 1951. *Taxonomy of vascular plants*. 2nd ed. Newyork : Macmillian company. p 489-491.
8. Perry, F. 1972. *Flowers of the world*. 1th ed. London, Newyork, Sydney, Toronto ; The Hamlyn Publishing Groups Limited. P. 192-193.

โครโมโซมและคาริโอไทป์ของแย้พันธุ์

Leiolepis belliana rubritaeniata (Mertens)

*โรจน์ชัย ศัตตราหา

**สุกนธ์ พลกนิษฐ

บทคัดย่อ

ได้ศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทป์ของแย้พันธุ์ *L.b. rubritaeniata* (Mertens) ที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า Diploid โครโมโซมของแย้พันธุ์นี้มีจำนวน 36 อัน ($2n=36$) ประกอบด้วยโครโมโซมขนาดใหญ่ 6 คู่ และโครโมโซมขนาดเล็ก 12 คู่ โครโมโซมขนาดใหญ่แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ โครโมโซมขนาดใหญ่คู่ที่ 2 เป็นแบบ Submetacentric ส่วนคู่อื่น ๆ เป็นแบบ Metacentric chromosomes แต่โครโมโซมขนาดเล็กมีขนาดเล็กมาก ไม่สะดวกในการตรวจวัดจำแนกรูปแบบ

Abstract

Chromosome number and karyotype of *L.b. rubritaeniata* (Mertens) collected from provinces in the northeast Thailand were investigated. Diploid chromosome of this sand lizard subspecies composed of 36 chromosomes, 6 pairs and 12 pairs of macrochromosome and microchromosome respectively. The second pair of the macrochromosome were submetacentric while the others were all metacentric. The microchromosomes were too small to be classified.

บทนำ

แย้พันธุ์ *L.b. rubritaeniata* เป็นหนึ่งใน 3 subspecies ของแย้ที่พบอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ได้มีรายงานทางด้านนิเวศวิทยาและอุปนิสัยบางประการ (โรจน์ชัย ศัตตราหา และ ไพรัช ทาบสีแพร, 2525^a, 2525^b; โรจน์ชัย ศัตตราหา และชรินทร์ คูคุ้มทร, 2528; โอภาส ขอบเขตต์, 2517; Satrawaha, 1984^a, 1984^b และ Taylor, 1963) และเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ (โรจน์ชัย

ศัตตราหา และสุกนธ์ พลกนิษฐ, 2531) แต่ยังมีการศึกษาด้านพันธุกรรมน้อยมาก (Hall, 1970) รายงานนี้มุ่งหมายเสนอข้อมูลจำนวนโครโมโซมและคาริโอไทป์ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางพันธุกรรมและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยขั้นสูง และเป็นแนวทางในการเสาะหาสู่ทางเพื่อการขยาย และปรับปรุงพันธุ์ของแย้ต่อไปในอนาคต

*รองศาสตราจารย์ ดร.ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมสไลด์โครโมโซม เพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซม (chromosome number) และคาริโอไทป์ (karyotype) โดยใช้แยพันธ์ *L.b.rubritaenjata* จังหวัดขอนแก่น สกลนคร อุตรธานี และอุบลราชธานี จำนวน 44 12 15 และ 35 ตัวตามลำดับ มาเตรียมสไลด์โครโมโซมโดยทำทั้งวิธีตรงและวิธีอ้อม (Macgregor and Varley 1983) การเตรียมสไลด์โครโมโซมโดยวิธีตรง เตรียมจากอวัยวะต่างๆ ของแย เช่น รังไข่ อัณฑะ ตับ และโพรงกระดูก (bone marrow) ก่อนการผ่าตัดเอาอวัยวะต่างๆ ของแย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ฉีดด้วยสารละลายโคลจิซีน (colchicine) 0.5-1.0 ml เข้าไปในช่องท้องของแยเพื่อหยุดการแบ่งตัวของเซลล์ ผ่าตัดเปิดช่องท้องแยตัดเอาอวัยวะดังกล่าวข้างต้น ออกมาบด-ตัด (squash) ด้วยกรรไกรโค้งขนาดเล็กจนละเอียด โดยใช้อวัยวะนั้นอยู่ใน สารละลายไฮโปโทนิค (0.075 M KCl) 5 ml ที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 15 นาที นำเซลล์ที่บดแล้วไปแช่ในสาร fixative (Methanol:acetic acid, 3:1) สองครั้ง แล้วนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นที่ 1000rpm เป็นเวลา 5 นาที แยกส่วนแขวนลอย (supernatant) ออกดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นสองครั้งนำเซลล์ที่ได้มาล้าง แล้วเติม fixative เพื่อจัดทำสไลด์โครโมโซม โดยหยดสารผสมที่เตรียมไว้สองหยด ลงไปบนแผ่นกระจกสไลด์ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิของห้องแล้วย้อมสีด้วยสารละลาย Giemsa 2% ที่ละลายใน phosphate buffer pH 6.8 เป็นเวลา 5-10 นาที ล้างด้วยน้ำก๊อกตากให้แห้งแล้ว mounted

การเตรียมสไลด์โครโมโซมโดยวิธีอ้อม เตรียมจากการเพาะเลี้ยงเม็ดเลือดแดง (Blood culture) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)

ในการเพาะเลี้ยงเม็ดเลือดแดง ใช้เลือดจากหัวใจของแย ผสมกับสาร Heparine 0.3-1.0 ml นำไปเพาะเลี้ยงในสาร Eagle's MEM 5 ml ที่มี serum จากลูกวัวอยู่ 10% มี PHA (Phytohaemagglutinin) 0.1% และ Concanabarine A 0.1% หลังจากเพาะเลี้ยงได้ 70 ชั่วโมง เติมสารละลายโคลจิמיד (Colchimid) 10 μ g/ml 2-3 หยดหลังจากนั้น 2 ชั่วโมง hypotonic KCl treatment, fixation และเตรียมสไลด์โครโมโซมตามวิธีตรงดังกล่าวข้างต้น ในการเพาะเลี้ยงด้วยเนื้อเยื่อ ใช้เนื้อเยื่อโคนหางของแยมาเพาะเลี้ยง โดยวิธีการเดียวกันกับการเพาะเลี้ยงเม็ดเลือดแดง เซลล์ที่เพาะเลี้ยงไว้ต้องทำ subculture สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และในการเก็บเซลล์ใช้สาร trypsin 0.25% เป็นตัวทำให้เซลล์หลุดจากผิวของขวดเพาะเลี้ยง นำไปละลายใน phosphate buffer pH 7.2 ล้างด้วยน้ำกลั่น ทำให้เจือจางและย้ายไปเพาะเลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยงใหม่ การเพาะเลี้ยงใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์หรือจนได้เซลล์มากพอแล้วเติมโคลจิמידให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 0.1 μ g/ml เพื่อหยุด Mitosis และเก็บเซลล์นำไปทำสไลด์โครโมโซมตามขั้นตอนการเตรียมสไลด์ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ผลการวิจัย

การตรวจสอบจำนวนโครโมโซม โดยการเตรียมสไลด์โครโมโซมโดยวิธีตรงจากโพรงกระดูก และจากตับไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าที่ควร ส่วนการเตรียมสไลด์โครโมโซมจากรังไข่และจากอัณฑะ ได้ผลดีพอสมควร แต่ที่ได้รับผลดีเป็นที่น่าพอใจเป็นการเตรียมสไลด์โครโมโซมโดยวิธีอ้อม จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโคนหาง และการเพาะเลี้ยงเม็ดเลือดแดง

การตรวจนับจำนวนโครโมโซมของແພພວ່າ
ແພພວ່າที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนโครโมโซม
อยู่ระหว่าง 33-37 อันประกอบด้วยโครโมโซมขนาด
ใหญ่ (macrochromosome) จำนวน 12-13 อัน
และโครโมโซมขนาดเล็ก (microchromosome)
จำนวน 21-24 อัน อย่างไรก็ตามจากการตรวจนับ
โครโมโซมจาก Metaphase cell 187 cells พบว่า
ส่วนใหญ่ (160 cells จาก 187 cells) จะมีจำนวน
โครโมโซม 36 อัน ($2n=36$) แยกเป็นโครโมโซม
ขนาดใหญ่ 12 อัน และโครโมโซมขนาดเล็ก 24 อัน
(ตารางที่ 1) การแปรผันของจำนวนโครโมโซมส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นกับโครโมโซมขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเล็ก

มากและกระจัดกระจายออกจากกลุ่มได้โดยง่าย
จากคาริโอไทป์ พบว่าโครโมโซมของແພພວ່านี้
จัดเป็นสองชุด (diploid set, $2n=36$) (รูปที่ 1)
มีโครโมโซมขนาดใหญ่ 6 คู่ และโครโมโซมขนาด
เล็ก 12 คู่ จากการวัด Relative length ของ
โครโมโซมขนาดใหญ่คู่ที่ 1 ถึงคู่ที่ 6 มีค่า 0.241,
0.215, 0.177, 0.162, 0.125 และ 0.079 ตามลำดับ
ส่วนการวัด Arm Ratio พบว่าสามารถแยกโครโมโซม
ขนาดใหญ่ของແພພວ່าชนิดนี้ออกเป็น 2 แบบ คือ
โครโมโซมขนาดใหญ่คู่ที่ 2 เป็นแบบ Submeta-
centric และคู่อื่นๆ เป็นแบบ Metacentric macro-
chromosomes (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 Diploid โครโมโซม ($2n$) ของແພພວ່າ *L.b.rubritaeniata*

จำนวนโครโมโซม/metaphase cell			จำนวน cell ที่นับ				
โครโมโซม ขนาดใหญ่	โครโมโซม ขนาดเล็ก	รวม	ตัวอย่างแต่ละตัว				รวม
			1	2	3	4	
13	24	37	1	0	0	0	1
12	24	36	40	47	40	33	160
12	23	35	7	3	9	3	22
12	22	34	1	1	1	0	3
12	21	33	1	0	0	0	1
รวมจำนวนเซลล์ที่นับ			50	51	50	36	187

ตารางที่ 2 การตรวจวัด Macrochromosomes ของແພພວ່າ *L.b.rubritaeniata*

Chromosomes	Relative length (Mean $\pm$ SD)	Arm ratio	Morphological classification
1	0.241 $\pm$ 0.0114	0.454	M
2	0.215 $\pm$ 0.0122	0.403	SM
3	0.177 $\pm$ 0.0101	0.462	M
4	0.162 $\pm$ 0.0091	0.457	M
5	0.125 $\pm$ 0.0068	0.462	M
6	0.079 $\pm$ 0.0055	0.471	M



รูปที่ 1 แสดง Somatic diploid metaphase chromosomes ของแยังพันธุ์ *L.b. rubritaeniata* (Mertens)
(ก) Metaphase plate และ (ข) Karyotype.

สรุปและวิจารณ์ผล

การเตรียมสไลด์โครโมโซมของแยัง ควรเตรียมจากการเพาะเลี้ยงเม็ดเลือดแดง หรือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทำให้ได้เซลล์ ที่เห็นโครโมโซมได้อย่างชัดเจน โครโมโซมของแยังพันธุ์ *L.b. rubritaeniata* ใน diploid set ประกอบด้วยโครโมโซมขนาดใหญ่จัดได้เป็น 2 แบบ คือ โครโมโซมขนาดใหญ่คู่ที่ 2 เป็นแบบ Submetacentric ส่วนคู่อื่น ๆ เป็นแบบ Metacentric macrochromosomes แต่โครโมโซมขนาดเล็กมีขนาดเล็กมากไม่สะดวกในการวัดขนาดและจัดรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม Hall (1970) รายงานว่าแยังพันธุ์ *Leiolepis belliana* (Gray) ที่ซื้อจากพ่อค้าสัตว์ป่าในสิงคโปร์ แยังจำนวนหนึ่งมีโครโมโซม เป็นแบบ

triploid set ($3n=54$) ประกอบด้วยโครโมโซมขนาดใหญ่ 18 อัน และโครโมโซมขนาดเล็ก 36 อัน ซึ่งจัดว่าเป็นลักษณะของสัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่ต้องได้รับการผสมเชื้อ (Parthenogenesis) ในกรณีของ Hall นี่อาจเป็นไปได้ว่า แยังที่ Hall ศึกษาเป็นแยังพันธุ์ *L.b. belliana* (Gray) ซึ่งมีกระจายอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นคนละพันธุ์ (subspecies) กับแยังพันธุ์ที่ศึกษาในครั้งนี้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าแยังที่ Hall ใช้ศึกษานั้นไม่ทราบแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสมเพียงแต่สันนิษฐานว่าเป็นแยังที่พ่อค้าสัตว์ป่าเก็บรวบรวมได้จากภาคเหนือของประเทศไทยหรือเขตชายแดนติดต่อกับภาคใต้ของประเทศไทย จึงเป็นที่น่าสนใจที่ควร

มีการตรวจสอบโครโมโซมของแย้พันธุ์ *L.b. belliana* (Gray) จากภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป เพื่อยืนยันหรือคัดค้านข้อมูลของ Hall ซึ่งยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือคัดค้านรายงานของ Hall ดังกล่าวแต่อย่างใด และ หากตรวจพบว่าแย้พันธุ์ *L.b. belliana* (Gray) มีการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องได้รับการผสมเชื่อจริงจะเป็นผลดีในการขยายพันธุ์แย้ อีกทางหนึ่ง

คำขอบคุณ

โครโมโซมและคาริโอไทป์ของแย้พันธุ์ *L.b. rubritaeniata* (Mertens) เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่องโครโมโซม และกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของ แย้พันธุ์ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่นประจำปี 2529 และ 2530 ผู้เขียนขอ ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุน งานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุญาต ให้ใช้สถานที่ในการทำการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

โรจน์ชัย คัตราหา และ ไพรัช ทาบสีแพร 2525a. การ ศึกษาขนาดและสัดส่วนของแย้ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 10(3):235-240

----- 2525b. รายงานการวิจัย เรื่องนิเวศวิทยาและวงชีพของแย้ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 27 หน้า.

โรจน์ชัย คัตราหา และ ชรินทร์ คูคุ้มมุทร 2528. รายงาน การวิจัยเรื่องการกระจายและโครงสร้างทางประชากร ของแย้ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 29 หน้า.

----- และ สุคนธ์ พลกนิษฐ 2531. รายงานการวิจัยเรื่องโครโมโซมและกายวิภาคระบบ สืบพันธุ์ของแย้ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 หน้า.

โอภาส ขอบเขตต์ 2517. การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภายนอก และนิสัยการกินอาหารของแย้ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens). Res. Note. No.8. ภาควิชา ชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ กรุงเทพฯ.

GOIN, C.J., O.B. GOIN and G.R. ZUG. 1978. *Introduction to Herpetology*. 3rd ed. W.H. Freeman. San Francisco.

HALL, W.P. 1970. Three Probable Cases of Parthenogenesis in Lizards (Agamidae, Chamaeleontidae, Gekkonidae). *Experimentia* 26:1271-1273.

MACGREGOR, H.C. and J.M. VARLEY. 1983. *Working with Animal Chromosomes*. John Wiley & Sons. Satrawaha, Rojchai, 1984a. Some Ecological Aspects of an Agamid Lizard, *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens). *Wildlife Ecology in Southeast Asia. Biotrop Spec. Publ. No. 21*:77-85.

Satrawaha, Rojchai, 1984b. Preliminary Study of Population Dispersion of an Agamid Lizard, *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens). *KKU. Sc. J.* 12(3):123-128.

TAYLOR, E.H. 1963. The Lizards of Thailand. *The Univ. of Kansas. Sci. Bull.* 44(4):904-910.

การศึกษาต่อมพิษในผิวหนัง และพฤติกรรมของอูเรน

*สุวคนธ์ พลกนิษฐ์ และ
พาณี วรรณนิธิกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาต่อมพิษในผิวหนังของอูเรน 4 ชนิด คือ อึ่งอ่างบ้าน, อึ่งเผ้า, เขียดอีโม้, และเขียดจะนา โดยการย้อมด้วยสี Hematoxylin-Eosin, Alcian blue, PAS และ Ferric ferricyanide พบว่ามีต่อมเมือกในผิวหนังของอูเรนทั้ง 4 ชนิด ส่วนต่อมพิษนั้นพบเฉพาะในผิวหนังของอึ่งอ่างบ้านและอึ่งเผ้า

จากปฏิกิริยาของสีย้อม แสดงให้เห็นว่า มีสารพวกมิวโคพอลิแซ็กคาไรด์ (mucopolysaccharides) เป็นส่วนประกอบของสารเมือกและสารของต่อมพิษ นอกจากนั้นในสารของต่อมพิษยังประกอบด้วยคาทีโคลามีน (catecholamine) และเซโรโโทนิน (serotonin) อีกด้วย

Abstract

The studies of poison glands were made on skins of four anurans, *Kaloula pulchra pulchra* Gray, *Kalophrynus pleurostigma*, *Rana limnocharis* and *Ooeidozyga lima*. By staining with Hematoxylin-Eosin, Alcian blue, PAS and Ferric ferricyanide; mucous glands were found in skins of all species but poison glands were found only in *Kaloula pulchra pulchra* Gray and *Kalophrynus pleurostigma*.

Histochemical reactions of mucopolysaccharides were demonstrated in mucous glands and poison glands of all species. Catecholamine and serotonin were found in poison secretion of poison glands.

บทนำ

อูเรน (Anuran) เป็นกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อยู่ใน Order Anura ได้แก่ พวกกบและคางคก ซึ่งรวมถึง เขียด อึ่งอ่าง ปาด ฯลฯ ด้วย อูเรน นอกจากช่วยกำจัดแมลง ช่วยสมดุลธรรมชาติแล้ว อูเรนหลายชนิดยังเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านในหลายจังหวัดของภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีจำนวนมาก หาได้ง่าย ราคาไม่แพง หรือไม่ก็สามารถจับเองได้ นอกจากกบแล้ว ชาวบ้านยังนิยมรับประทานอึ่งอ่าง คางคก และเขียดอีกด้วย สำหรับคางคกนิยมรับประทานในบางแห่งเท่านั้น และมีรายงานว่าพิษจากต่อมพิษของคางคกและงูโครง สามารถทำให้สัตว์อื่นตายได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของต่อมพิษและสารพิษบางชนิดในผิวหนังของอูเรนที่เป็นอาหารของชาวบ้าน รวม

*อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ของอนุแรนที่อาจมีความสัมพันธ์กับการมีต่อมพิษในผิวหนัง เช่น ความว่องไวในการหลบหนีศัตรู เป็นต้น และเพื่อเก็บเป็นตัวอย่าง ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานของอนุแรนที่พบในจังหวัดขอนแก่น

อุปกรณ์และวิธีการ

ซื้อตัวอย่างอนุแรนจากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่างบ้าน หรือ หลิ่ง (*Kaloula pulchra pulchra* Gray), อึ่งเผ้า (*Kalophrynus pleurostigma*) เขียดอีโม้ หรือกบบัว (*Rana limnocharis*) และเขียดจะนา หรือเขียดหนังเหนียว (*Ooeidozyga lima*) จำแนกชนิดและชื่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้หนังสือของ ปรีชา กลิ่นเกษร (2514), Suvatti (1967) และ Taylor (1962) เป็นเอกสารอ้างอิง

แบ่งอนุแรนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งนำไปเลี้ยงในอ่างกระจกเพื่อศึกษาพฤติกรรม อีกกลุ่มหนึ่งนำไปตัดผิวหนังเพื่อทำสไลด์ถาวรศึกษาต่อมชนิดต่าง ๆ ในผิวหนัง โดยแช่ผิวหนังในน้ำยารักษาสภาพ 2 ชนิด คือ น้ำยาบูแอง (Bouin's fluid) และ 10% ฟอรัมาลิน นาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการดึ่งน้ำออก แล้วฝังในพาราฟลาสต์ (paraplast) จากนั้นนำมาตัดให้บาง 8 ไมครอน และนำไปย้อมสี Hematoxylin-Eosin, Alcian blue, PAS และ Ferric ferricyanide.

ผลการศึกษา

ต่อมที่พบในผิวหนัง

อนุแรนทั้ง 4 ชนิด มีต่อมเมือกอยู่ในผิวหนัง ส่วนต่อมพิษพบเฉพาะในผิวหนังของอึ่งอ่างบ้านและอึ่งเผ้า ขนาดและลักษณะของต่อมได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1,2,3 และ 4

สำหรับปฏิกิริยาของสารในต่อมกับสีย้อมต่าง ๆ ได้แก่ Alcian blue, PAS และ Ferric ferricyanide แสดงไว้ในตารางที่ 2 และรูปที่ 1,2,3 และ 4

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของต่อมเมือก และต่อมพิษในผิวหนังของอนุแรนแต่ละชนิด

ชื่อ	ขนาดของต่อม (ไมครอน)	
	ต่อมเมือก	ต่อมพิษ
อึ่งอ่างบ้าน	74	80-145
อึ่งเผ้า	67	70-120
เขียดอีโม้	80	-
เขียดจะนา	90	-

ตารางที่ 2 แสดงปฏิกิริยาของสารในต่อมกับสีย้อมต่าง ๆ

ชื่อ	Alcian blue		PAS		Ferric ferricyanide	
	M	P	M	P	M	P
อึ่งอ่างบ้าน	3+	-	3+	2+	-	3+
อึ่งเผ้า	3+	3+	3+	1+	-	3+
เขียดอีโม้	3+	0	3+	0	1+	0
เขียดจะนา	3+	0	3+	0	1+	0

M = ต่อมเมือก

P = ต่อมพิษ

0 = ไม่มีต่อมชนิดนั้น ๆ

- = ไม่มีปฏิกิริยา

1+ = ปฏิกิริยาน้อยที่สุด

2+ = ปฏิกิริยาปานกลาง

3+ = ปฏิกิริยามากที่สุด

พฤติกรรมของอนุแรนในอ่างกระจก

เนื่องจากการเลี้ยงอนุแรนในอ่างกระจกเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากธรรมชาติ และอนุแรนไม่แสดงพฤติกรรมที่น่าสนใจออกมา ไม่ว่าจะเป็นกระตุ่นอย่างไร สุดท้ายอนุแรนเหล่านี้จะตายภายใน 3-4 สัปดาห์ ดังนั้นการศึกษากายวิภาคของอนุแรนในอ่างกระจกจึงไม่ได้ผล

สรุปผลและวิจารณ์

จากผลการศึกษาต่อมพิษในผิวหนังของตัวอย่างอนุแรนที่ซื้อมาจากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าไม่มีต่อมพิษในผิวหนังของเขียดอีโมและเขียดจนะ แต่มีต่อมพิษขนาดใหญ่จำนวนมากในอึ่งอ่างบ้านและอึ่งเผ้า รวมทั้งพบปฏิกิริยาทางฮิสโตเคมี (histochemistry) ที่แสดงว่าสารที่ต่อมพิษของอึ่งอ่างบ้านและอึ่งเผ้าสร้างขึ้นมานั้นมีสารประกอบจำพวกคาทีโคลามีนและเซอโร-โทนินประกอบอยู่ด้วย ซึ่งสารดังกล่าวมีความเป็นพิษต่อสัตว์อื่นๆ รวมทั้งมนุษย์ด้วย โดยอาจจะมีผลต่อหัวใจและความดันเลือด หรือต่ออวัยวะอื่นๆ อันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไป ดังนั้นการนำอึ่งอ่างบ้านและอึ่งเผ้ามาประกอบเป็นอาหารรับประทาน จึงควรระมัดระวังให้มาก ทางป้องกันที่พอทำได้ คือ อย่าจับอนุแรนด้วยมือเปล่า และควรลอกหนังออกให้หมดเมื่อนำมาประกอบเป็นอาหารรับประทาน

ส่วนการศึกษาพฤติกรรมของอนุแรนในอ่างกระจกไม่ได้ผลนั้น อาจจะเป็นเนื่องจาก อ่างกระจกมีขนาดเล็กและมีสภาพแวดล้อมไม่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ ทำให้อนุแรนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ ดังนั้น ถ้าหากสามารถทดลองเลี้ยงในบ่อดินขนาดใหญ่ และปรับ


สภาพแวดล้อมให้คล้ายกับธรรมชาติ การศึกษาอาจจะได้ผลกว่าการเลี้ยงในอ่างกระจก

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ทุนวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการวิจัยนี้ และขอขอบคุณ นางสาวคำปน ปาโท ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างและงานในห้องปฏิบัติการ

บรรณานุกรม

1. ปรีชา กลิ่นเกษร. 2514. *Check List of Amphibian in Thailand: Animal Kingdom Class Amphibia*. กรุงเทพฯ.
2. Dapson, R.W. 1970. Histochemistry of mucus in the skin of the frog, *Rana pipiens*. *Anat. Rec.* 166: 615-626.
3. Dapson, R.W., Feldman, A.T. and Wright, O.L. 1973. Histochemistry of granular (poison) secretion in the skin of the frog, *Rana pipiens*. *Anat. Rec.* 177: 549-560.
4. Hostetler, J.R. and Cannon, M.S. 1974. The anatomy of the parotid gland in bufonidae with some histochemical finding, *Bufo marinus*. *J. of Morpho.* 42: 225-240.
5. Humason, G.L. 1972. *Animal Tissue Techniques*. 3rd ed. W.H. Freeman: San Francisco.
6. Suvatti, C. 1967. *Fauna of Thailand*. 2nd ed. Applied Scientific Research Corporation of Thailand: Bangkok.
7. Taylor, E.H. 1962. The Amphibian Fauna of Thailand. *The University of Kansas Science Bulletin*. 43: 265-599.



รูปที่ 1 ผิวหนังของอึ่งอ่างบ้าน กำลังขยาย 200 เท่า

1.1 ลักษณะทั่วไป ย้อมด้วย Hematoxylin-Eosin


1.2 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Alcian blue ต่อมน้ำลาย 3+, ต่อมน้ำพิษ -

1.3 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ PAS, ต่อมน้ำลาย 3+ (ลูกศรชี้), ต่อมน้ำพิษ 2+

1.4 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Ferric ferricyanide, ต่อมน้ำลาย -, ต่อมน้ำพิษ 3+

E = หนังกำพร้า, D = หนังแท้, M = ต่อมน้ำลาย, P = ต่อมน้ำพิษ, - = ไม่มีปฏิกิริยา,

2+ = ปฏิกิริยาปานกลาง, 3+ = ปฏิกิริยามากที่สุด



รูปที่ 3 ผิวหนังของเจี๊ยดอีโม้ กำลังขยาย 400 เท่า

3.1 ลักษณะทั่วไป ย้อมด้วย Hematoxylin-Eosin


3.2 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Alcian blue ต่อมน้ำ 3 +, (ลูกศรชี้)

3.3 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ PAS, ต่อมน้ำ 3 +

3.4 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Ferric ferricyanide, ต่อมน้ำ 1 +, (ลูกศรชี้)

E = หนังกำพร้า, D = หนังแท้, M = ต่อมน้ำ,

- = ไม่มีปฏิกิริยา, 1+ = ปฏิกิริยาน้อยที่สุด, 3+ = ปฏิกิริยามากที่สุด



รูปที่ 3 ผิวหนังของเขียดอีโม้ กำลังขยาย 400 เท่า

3.1 ลักษณะทั่วไป ย้อมด้วย Hematoxylin-Eosin


3.2 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Alcian blue ต่อมน้ำลาย 3 +, (ลูกศรชี้)

3.3 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ PAS, ต่อมน้ำลาย 3 +

3.4 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Ferric ferricyanide, ต่อมน้ำลาย 1 +, (ลูกศรชี้)

E = หนังกำพร้า, D = หนังแท้, M = ต่อมน้ำลาย,

- = ไม่มีปฏิกิริยา, 1 + = ปฏิกิริยาน้อยที่สุด, 3 + = ปฏิกิริยามากที่สุด



รูปที่ 4 ผิวหนังของเขียดตะนา กำลังขยาย 400 เท่า

4.1 ลักษณะทั่วไป ย้อมด้วย Hematoxylin-Eosin

4.2 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Alcian blue ต่อมเมือก 3 +, (ลูกศรชี้)

4.3 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ PAS, ต่อมเมือก 3 + (ลูกศรชี้),

4.4 ปฏิกริยาของสารในต่อมกับ Ferric ferricyanide, ต่อมเมือก 1+ (ลูกศรชี้)

E = หนังกำพร้า, D = หนังแท้, M = ต่อมเมือก,

- = ไม่มีปฏิกิริยา, 1 + = ปฏิกิริยาน้อยที่สุด, 3 + = ปฏิกิริยามากที่สุด

พืชและสัตว์ในเขตอำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

ตอนที่ 1 แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์

*ประนอม จันทโรทัย

*ละออศรี เสนาะเมือง

*พาณี วรรณนิชกุล

บทคัดย่อ

การสำรวจชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์จากแหล่งน้ำ 10 แห่งในเขตอำเภอมืองขอนแก่น พบแพลงก์ตอนพืช 37 ชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 40 ชนิด แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดได้แก่สาหร่ายสีเขียว แต่กลุ่มที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากในแหล่งน้ำที่มีธาตุอาหารมาก (เช่นบึงศรีฐานด้านทิศตะวันตกและบ่อน้ำทิ้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.) และเป็นสาเหตุให้น้ำมีสีเขียวเป็นสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว 3 ชนิดได้แก่ *Arthrospira* sp., *Raphidiopsis* sp. และ *Polycystis* sp.

สมาชิกของแพลงก์ตอนสัตว์ประกอบด้วยโรติเฟอร์ 32 ชนิด แคลดโดเซอแรน 4 ชนิด โคปีปอด 3 ชนิดและ ออสตราคอด 1 ชนิด โรติเฟอร์สกุล *Brachionus* มีสมาชิกถึง 8 ชนิด ชนิด *B. rubens* มักพบว่ามีจำนวนมากในแหล่งน้ำที่มีสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว 3 ชนิดข้างต้น แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดที่พบแพร่กระจายอยู่หลายแหล่งน้ำ ที่ทำการศึกษได้แก่ *Brachionus rubens*, *Brachionus angularis*, *Polyarthra vulgaris*, *Trichocerca pusilla* และ *Mesocyclops leuckarti*

Abstract

Phytoplankton and zooplankton from 10 areas in Khon Kaen were investigated. Thirty-seven species of phytoplankton and 40 species of zooplankton were identified. The major group of phytoplankton communities were green algae (Chlorophyta), but the major components of phytoplankton in eutrophic lakes (Western Sri Than reservoir and University Hospital's sewage pond) were blue-green algae 3 species (*Arthrospira* sp., *Raphidiopsis* sp. and *Polycystis* sp.).

Zooplankton composition comprised rotifer 32 species, cladoceran 4 species, copepod 3 species and ostracod 1 species. Genus *Brachionus* was classified into 8 species. *Brachionus rubens* appeared abundantly within the areas where the 3 species of blue-green algae mentioned above. The species, occurred in several areas of the investigations, were *Brachionus rubens*, *Brachionus angularis*, *Polyarthra vulgaris*, *Trichocerca pusilla*, and *Mesocyclops leuckarti*.

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

● Received 15 May 1989. Accepted 22 May 1989. ●

บทนำ

การศึกษาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิด ความชุกชุมของแพลงก์ตอน ทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของระบบนิเวศ เพราะแพลงก์ตอนเป็นอาหารหลักของกุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ นอกจากนั้นเรายังใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีในการวัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้ด้วย

ปัจจุบันแพลงก์ตอนมีความสำคัญมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการมีอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนหลายชนิด เช่น *Chlorella* sp. และ *Spirulina* sp. โดยนำแพลงก์ตอนเหล่านี้มาอัดเม็ดใช้เป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำรวจเกี่ยวกับชนิดของแพลงก์ตอน ทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

1. การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

ได้ทำการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ระหว่างเดือนมีนาคม 2528 ถึง มีนาคม 2529 โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำ (Schindler Sampler) กรองแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยผ้ากรองขนาดตา 30 μ และ 60 μ ตามลำดับ เก็บรักษาตัวอย่างแพลงก์ตอนในน้ำยาฟอร์มอลิน 4% แหล่งน้ำที่เก็บตัวอย่างมีจำนวน 10 แห่ง เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 แห่ง (หมายเลข 1-6) อยู่ภายในเขตอำเภอเมืองอีก 4 แห่ง (หมายเลข 7-10) ดังนี้

1. บึงศรีฐานด้านทิศตะวันตก
2. บึงศรีฐานด้านทิศตะวันออก
3. บ่อสะพานขาว
4. บ่อลูกวัง
5. บ่อน้ำทิ้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.
6. หนองหัวช้าง
7. บึงแก่นนคร
8. บึงทุ่งสร้าง
9. บ่อน้ำทิ้งใกล้บึงทุ่งสร้าง
10. คลองใกล้ประตูเมืองขอนแก่น

2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง

นำตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์มาจำแนกชนิดและถ่ายรูปในห้องปฏิบัติการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ติดกล้องถ่ายรูปแบบ Olympus Model PM-10AD เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการจำแนกชนิดได้แก่ สมศักดิ์ (2519), Round (1966), Pennak (1978), Pontin (1978), Ruttner-Kolisko (1974), และ Sudzuki (1964).

ผลการวิจัย

จากการจำแนกตัวอย่างแพลงก์ตอนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น 10 แหล่งน้ำ พบว่า

1. แพลงก์ตอนพืชที่พบมีทั้งหมด 5 ดิวิชัน (Division) 37 ชนิด (species) จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว (Division Cyanophyta) 8 ชนิด, Euglenophyta 7 ชนิด ไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellates : Division Pyrrophyta) 1 ชนิด, สาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta) 15 ชนิด และ Chrysophyta 13 ชนิด (ตารางที่ 1)

2. แพลงก์ตอนสัตว์พบทั้งหมด 40 ชนิด จัดอยู่ในไฟลัมโรติเฟอรา (Phylum Rotifera) 32 ชนิด (ตารางที่ 2), ไฟลัมอาร์โธรโปดา (Phylum

Arthropoda) 8 ชนิด (ตารางที่ 3) ซึ่งแบ่งออกเป็น
แคลโดโดเซอแรน (Cladoceran) 4 ชนิด, โคปีปอด
(Copepod) 3 ชนิด และออสตราคอด (Ostracod)
1 ชนิด

ตารางที่ 1, 2 และ 3 แสดงชนิดของ
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจาก
แหล่งน้ำ 10 แห่งในเขตอำเภอมือง ขอนแก่น

ตารางที่ 1 ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบ

แพลงก์ตอนพืช	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Division Cyanophyta										
<i>Anabaena</i> sp.			+		+	+				
<i>Arthrospira</i> sp.	+				+					
<i>Calothrix</i> sp.	+		+							
<i>Nostoc</i> sp.						+				
<i>Oscillatoria</i> sp.	+		+					+	+	+
<i>Polycystis</i> sp.	+			+	+				+	
<i>Raphidiopsis</i> sp.	+				+					
<i>Rivularia</i> sp.		+								
II.Division Euglenophyta										
<i>Euglena</i> sp.	+	+				+	+	+	+	+
<i>Phacus acuminata</i>							+			+
<i>Phacus alata</i>							+			
<i>Phacus longicauda</i>					+		+	+		+
<i>Phacus pleuronectes</i>									+	+
<i>Phacus torta</i>										+
<i>Phacus</i> sp.	+	+	+	+						
III.Division Pyrrophyta										
<i>Ceratium</i> sp.			+			+				
IV.Division Chrysophyta										
<i>Cymbella</i> sp.			+							
<i>Dinobryon</i> sp.						+				
<i>Eunotia</i> sp.			+	+						
<i>Gyrosigma kutzingii</i>						+				
<i>Melosira granulata</i>	+									
<i>Melosira</i> sp.			+							
<i>Navicula confervacea</i>									+	
<i>Navicula radiosa</i>				+						
<i>Navicula rhynchocephala</i>				+						
<i>Navicula</i> sp.			+			+		+		
<i>Pinnularia acrosphaeria</i>										+
<i>Pinnularia</i> sp.				+					+	
<i>Surirella robusta</i>						+				

1. คือบึงศรีฐานด้านทิศตะวันตก, 2. คือบึง
ศรีฐานด้านทิศตะวันออก, 3. คือบ่อสะพานขาว,
4. คือบ่อลูกวัง, 5. คือบ่อน้ำทิ้งของ ร.พ.ศรีนครินทร์
มข., 6. คือนองหัวช้าง, 7. คือบึงแก่นนคร,
8. คือบึงทุ่งสร้าง, 9. คือบ่อน้ำทิ้งใกล้บึงทุ่งสร้าง,
10. คือกคลองใกล้ประตูเมืองขอนแก่น, + หมายถึง
ตรวจพบในแห่งนั้น

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แฟลงก์ตอนพืช	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.Division Chlorophyta										
<i>Closterium ehrenbergii</i>							+			
<i>Closterium</i> sp.		+		+				+		
<i>Cosmarium</i> sp.			+	+						
<i>Oocystis</i> sp.			+	+						
<i>Pandorina</i> sp.			+					+		+
<i>Pediastrum</i> sp.		+	+	+		+		+		
<i>Scenedesmus opoliensis</i>				+						
<i>Scenedesmus quadricauda</i>				+						
<i>Scenedesmus</i> sp.				+	+			+		
<i>Spirogyra</i> sp.			+					+		+
<i>Staurostrum megacanthum</i>				+						
<i>Staurostrum wildemanii</i>				+						
<i>Staurostrum</i> sp.			+	+		+		+		
<i>Treubaria</i> sp.				+	+					
<i>Triploceras</i> sp.			+							

ตารางที่ 2 ชนิดของไรติเฟอร์ที่พบ

ไรติเฟอร์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Anuraeopsis fissa</i>		+	+	+						
<i>Asplanchna priodonta</i>	+			+	+					
<i>Brachionus angularis</i>	+	+		+				+		
<i>Brachionus budapestinensis</i>				+						
<i>Brachionus calyciflorus</i>				+	+					
<i>Brachionus caudatus</i>				+						
<i>Brachionus falcatus</i>				+						
<i>Brachionus forficula</i>	+			+						
<i>Brachionus quadridentatus</i>				+			+		+	
<i>Brachionus rubens</i>	+			+	+		+	+	+	
<i>Cephalodella</i> sp.										
<i>Colurella</i> sp.										+
<i>Collotheca</i> sp.			+							
<i>Filinia longiseta</i>							+	+		
<i>Filinia terminalis</i>				+				+		
<i>Gastropus hytopus</i>									+	
<i>Gastropus</i> sp.						+				
<i>Hexarthra mira</i>			+					+		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

โรติเฟอร์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Keratella cochlearis</i>		+	+							
<i>Keratella cochlearis tecta</i>			+	+		+				
<i>Keratella quadata</i>		+								
<i>Keratella tropica</i>		+		+						
<i>Lecane elasma</i>										+
<i>Lecane luna</i>				+			+			
<i>Lecane lunaris</i>				+						+
<i>Platyias</i> sp.							+			
<i>Polyarthra vulgaris</i>		+	+	+		+		+		
<i>Synchaeta</i> sp.	+								+	
<i>Trichocerca capucina</i>			+							
<i>Trichocerca porcellus</i>										+
<i>Trichocerca pusilla</i>		+	+	+		+		+		
<i>Trichocerca similis</i>				+		+				

ตารางที่ 3 ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบ

แพลงก์ตอนสัตว์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cladoceran										
<i>Alona</i> sp.						+				
<i>Ceriodaphnia</i> sp.				+			+			
<i>Diaphanosoma</i> sp.		+								
<i>Moina macrocopa</i>					+					
Copepod										
<i>Diaptomus</i> sp.	+	+		+						
<i>Mesocyclops leuckarti</i>				+	+	+				+
Unidentified sp. (Family cyclopidae)	+	+	+	+			+	+	+	
Ostracod										
Unidentified sp. (Order Podocopa)			+			+	+			

สรุปผลและวิจารณ์

แพลงก์ตอนพืชที่สำรวจพบในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นจากแหล่งน้ำ 10 แห่งมีจำนวนอย่างน้อย 37 ชนิด ชนิดที่ชุกชุมกล่าวคือมีความหนา-

แน่นมากโดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่มีธาตุอาหารมาก (บึงศรีฐานด้านทิศตะวันตกและบ่อน้ำทิ้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.) และเป็นสาเหตุให้น้ำมีสีเขียว ได้แก่กลุ่มสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว

(Division Cyanophyta) 3 ชนิด คือ *Arthrospira* sp., *Raphidiopsis* sp. และ *Polycystis* sp. สำหรับ *Euglena* sp. และ *Phacus* spp. (Division Euglenophyta) พบว่าอาศัยอยู่เกือบทุกแห่งที่ทำการศึกษ แต่พบเป็นปริมาณค่อนข้างมากในน้ำที่กลิ่นเหม็น เช่นบ่อน้ำทิ้งใกล้บึงทุ่งสร้าง เป็นแหล่งกักต่อน้ำที่พบในน้ำเสีย (กาญจนา, 2524)

แหล่งน้ำบางแห่งไม่พบพวกไดอะตอม (Division Chrysophyta) เลย ได้แก่ บึงศรีฐานด้านทิศตะวันออก บ่อน้ำทิ้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. และบึงแก่นนคร สันนิษฐานว่าแหล่งน้ำดังกล่าวมีธาตุซิลิกาเล็กน้อย

แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellates; Division Pyrrophyta) ที่พบในการศึกษครั้งนี้มีเพียงชนิดเดียวคือ *Ceratium* sp. ซึ่งจากการสำรวจสาหร่ายน้ำจืดในเขตจังหวัดสงขลา โดยพิมพ์พรณและกรรณิกา (2524) พบพวกไดโนแฟลกเจลเลต 2 ชนิด คือ *Gymnodinium* sp. และ *Peridinium* sp.

แพลงก์ตอนพืชที่สำรวจพบมีจำนวนอย่างน้อย 40 ชนิด เป็นโรติเฟอร์ 32 ชนิด แคลโดเซอแรน 4 ชนิด โคปีปอด 3 ชนิด และออสตราคอด 1 ชนิด เนื่องจากแหล่งน้ำที่ทำการศึกษทั้ง 10 แห่งเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ดังนั้นสมาชิกของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบส่วนใหญ่จึงเป็นพวกโรติเฟอร์ สกุลที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ *Brachionus* จากการศึกษครั้งนี้ตรวจพบโรติเฟอร์สกุลนี้ทั้งหมด 8 ชนิด ชนิด *B. rubens* มักพบว่ามีควมหนาแน่นมากในแหล่งน้ำที่มีธาตุอาหารมาก จากการศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอนสัตว์ในสระน้ำ 3 แห่ง ในมหาวิทยาลัยศิลปากร (อรุณี, 2525) พบว่ามี *Brachionus* 2 สกุลคือ *Brachionus falcatus* และ *Brachionus calyciflorus* ชนิดที่พบ


แพร่กระจายอยู่หลายแหล่ง น้ำที่ทำการศึกษได้แก่ *B. rubens*, *B. angularis*, *Polyarthra vulgaris*, *Trichocerca pusilla* และ โคปีปอดชนิด *Mesocyclops leuckarti*

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ และขอขอบคุณ คุณอนุศาสตร์ ภูสินแก่น ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง

บรรณานุกรม

- กาญจนา ชาญสง่าเวช. 2524. วิธีวินิจฉัยชนิดและนับจำนวนแพลงก์ตอนพืช. **วารสารวิทยาศาสตร์** 35(8):588-594.
- พิมพ์พรณ ต้นสกุลและกรรณิกา สรรพนิช. 2524. การสำรวจสาหร่ายน้ำจืดในเขตจังหวัดสงขลา. **วารสารสงขลานครินทร์**, 3(3):183-187.
- สมศักดิ์ แสนสุข. 2519. **ความรู้บางประการเกี่ยวกับสาหร่ายและแนววินิจฉัยสาหร่ายน้ำจืด และน้ำกร่อย** คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 65 หน้า.
- อรุณี สมมณี. 2525. แพลงก์ตอนสัตว์ในสระน้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. **วารสารการประมง**, 35(1):405-408.
- Pennak, R.W. 1978. *Fresh-Water Invertebrates of the United States*. 2nd edition. John Wiley & Sons, New York. 803p.
- Pontin, R.M. 1978. *A Key to British Freshwater Planktonic Rotifera*. Biological Association. Scientific Publication No. 38, 178p.
- Round, F.E. 1966. *The Biology of the Algae*. Edward Arnold Ltd., London. 269p.
- Ruttner-Kolisko, A. 1974. *Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy*; translated by G. Kolisko. E. schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. 146p.
- Sudzuki, M. 1964. New Systematical Approach to the Japanese Planktonic Rotatoria. *Hydrobiologia*. 23(1-2):1-124.



1.1



1.2


รูปที่ 1 1.1 *Phacus longicauda* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบ่อลูกวัง
1.2 *Surirella robusta* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากหนองหัวช้าง



2.1




2.2




2.3

รูปที่ 2 2.1 *Ceratium* sp. , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบ่อสะพานขาว
2.2 *Pediastrum* sp. , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบ่อลูกวัง
2.3 *Closterium ehrenbergii* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบึงแก่นนคร



- รูปที่ 3 3.1 *Anuraeopsis fissa* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบึงศรีฐานด้านตะวันออก
 3.2 *Asplanchna priodonta* , กำลังขยาย 100 เท่า, จากบ่อลูกรัง
 3.3 *Polyarthra vulgaris* , กำลังขยาย 200 เท่า, จากบ่อลูกรัง
 3.4 *Trichocerca pusilla* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบ่อลูกรัง
 3.5 *Filinia longiseta* , กำลังขยาย 200 เท่า, จากบึงทุ่งสร้าง
 3.6 *Filinia terminalis* , กำลังขยาย 200 เท่า, จากบึงทุ่งสร้าง

รูปที่ 4 4.1 *Brachionus angularis*

กำลังขยาย 200 เท่า, จากบ่อลูกกุ้ง

4.2 *Brachionus budapestinensis*

กำลังขยาย 200 เท่า, จากบ่อลูกกุ้ง

4.3 *Brachionus caudatus*

กำลังขยาย 200 เท่า, จากบ่อลูกกุ้ง

4.4 *Brachionus forficula*

กำลังขยาย 200 เท่า, จากบึงศรีฐานด้านทิศตะวันตก

4.5 *Brachionus rubens*

กำลังขยาย 200 เท่า, จากบ่อน้ำทิ้งของ ร.พ.ศรีนครินทร์ มข.

4.6 *Brachionus quadridentatus*


กำลังขยาย 200 เท่า, จากบึงแก่นนคร

4.7 *Brachionus falcatus*


กำลังขยาย 200 เท่า, จากบ่อลูกกุ้ง



5.1



5.2



5.3




5.4


- รูปที่ 5 5.1 *Lecane lunaris* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากคลองไถ่ประตูเมือง
 5.2 *Lecane elasma* , กำลังขยาย 200 เท่า, จากคลองไถ่ประตูเมือง
 5.3 *Lecane luna* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบึงแก่นนคร
 5.4 *Gastropus hyptopus* , กำลังขยาย 400 เท่า, จากบ่อน้ำทิ้งใกล้บึงทุ่งสร้าง



6.1






6.2



6.3

- รูปที่ 6 6.1 *Ceriodaphnia* sp. ; กำลังขยาย 100 เท่า, จากบึงแก่นนคร
 6.2 ไรแดง (*Moina macrocopa*) , กำลังขยาย 40 เท่า, จากบ่อน้ำทิ้ง ร.พ.ศรีนครินทร์ มข.
 6.3 Unidentified ostracod , กำลังขยาย 100 เท่า, จากบึงแก่นนคร



รูปที่ 7 7.1 *Mesocyclops leuckarti* ตัวผู้, จากบ่อน้ำทิ้ง ร.พ.ศรีนครินทร์ กำลังขยาย 100 เท่า

7.2 *Mesocyclops leuckarti* ตัวเมีย, จากบ่อน้ำทิ้ง ร.พ.ศรีนครินทร์ กำลังขยาย 100 เท่า

7.3 ตัวอ่อนระยะ copepodite ของ Copepod , จากบ่อลูกรัง, กำลังขยาย 100 เท่า

เกร็ดความรู้

“ขสยา”

เกร็ดความรู้ เป็นคอลัมน์ที่นำเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นตามปกติ มาอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ สำหรับฉบับนี้ขอนำเรื่องราวของมะพร้าวกะทิ มาเสนอให้ทราบดังนี้

มะพร้าวกะทิ เป็นมะพร้าวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กล่าวคือ จะมีลักษณะภายนอกเหมือนมะพร้าวธรรมดา แต่เมื่อผ่าผลออกจะพบความแตกต่างจากมะพร้าวธรรมดา ตรงที่ส่วนที่เรียกว่า **เนื้อมะพร้าว** จะมีลักษณะอ่อนนุ่ม ฟู ชรุขระ มีความหนามาก (หนาประมาณ 2-3 ซม.) มีรสหวานมัน นอกจากนี้ส่วนที่เรียกว่า **น้ำมะพร้าว** จะมีลักษณะข้นเหนียว และมีปริมาณเพียงเล็กน้อย

มะพร้าวกะทิ จัดเป็นผลไม้พิเศษที่หายาก และมีรสชาติเป็นที่นิยมของคนทั่วไป จึงมีราคาแพงกว่ามะพร้าวธรรมดาหลายเท่า

ผลมะพร้าวกะทิจะเกิดปนอยู่กับผลมะพร้าวธรรมดา โดยจะเกิดกับมะพร้าวเพียงบางผล ของต้นมะพร้าวบางต้นเท่านั้น จึงพบปริมาณน้อยมาก (เคยมีผู้สำรวจและรายงานว่าพบตามธรรมชาติประมาณ 0.15%)

ได้มีการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดผลมะพร้าวกะทิ และสรุปได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นเรื่องของ “พันธุกรรม” กล่าวคือลักษณะมะพร้าว

กะทิถูกควบคุมด้วยยีนส์เพียงคู่เดียว และมียีนส์ 2 สภาวะ (dialleles) โดยลักษณะของความเป็นมะพร้าวกะทิถูกควบคุมด้วยยีนส์ที่เป็นยีนส์ด้อย (recessive genes) ส่วนลักษณะของความเป็นมะพร้าวธรรมดาถูกควบคุมด้วยยีนส์เด่น (dominant genes) และสภาวะความเข้มเป็นความเข้มสมบูรณ์ (complete dominance)

ถ้ากำหนดให้

M = ยีนส์ควบคุมลักษณะมะพร้าวธรรมดา

m = ยีนส์ควบคุมลักษณะมะพร้าวกะทิ


อาจเขียนยีนโนไทป์ (genotype) ของ ต้น และ ผล ของมะพร้าวได้ดังนี้

มะพร้าวธรรมดา = MM และ Mm

มะพร้าวกะทิ = mm

เนื่องจาก **ผลมะพร้าวกะทิ** ไม่สามารถเพาะให้งอกเป็น **ต้นมะพร้าวกะทิ** ได้ เพราะ embryo ของมะพร้าวกะทิไม่สามารถดูดอาหารจาก endosperm (เนื้อ และน้ำมะพร้าว) ได้ จึงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ จึงไม่มีโอกาสพบ ต้น

มะพร้าวกะทิ (mm) โดยธรรมชาติเลย ผลมะพร้าว
กะทิ จึงเกิดจาก ต้นมะพร้าวธรรมดาที่เป็น he-
terozygote (Mm) ผสมตัวเอง ตามแผนผังดังนี้



การที่เนื้อและน้ำมะพร้าวกะทิมีลักษณะ
แตกต่างจากมะพร้าวธรรมดาก็เนื่องจากว่า เนื้อ

และน้ำมะพร้าวเป็น endosperm ซึ่งมีโครโมโซม
3 ชุด (3n) ยีนโนไทป์ของ endosperm ของมะพร้าว-
กะทิจะมียีนส์ด้อยอยู่ด้วยกัน 3 ตัว คือ mmm
ขณะที่ยีนโนไทป์ของ endosperm ของมะพร้าว-
ธรรมดาจะมียีนส์เด่นอยู่ด้วย โดยอาจเป็น MMM
หรือ MMm หรือ Mmm (ทั้ง 3 แบบ จะมีฟีโนไทป์
เหมือนกัน เพราะ M ซ่มอย่างสมบูรณ์ต่อ m)
ตามแผนผังการเกิดมะพร้าวกะทิจากการผสมตัวเอง
ของมะพร้าวธรรมดาที่เป็น heterozygote ดังนี้

♀ \ ♂	M (sperm nucleus)	m (sperm nucleus)
M (egg) MM (polar nuclei)	MM (embryo) MMM (endosperm)	Mm (embryo) MMm (endosperm)
m (egg) mm (polar nuclei)	Mm (embryo) Mmm (endosperm)	mm (embryo) *mmm (endosperm)

*คือลักษณะของเนื้อและน้ำมะพร้าวกะทิ



ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก้าวหน้าไปมาก นักวิทยาศาสตร์สามารถเพาะเลี้ยง **embryo ของมะพร้าวกะทิ (mm)** ด้วยสารอาหารในหลอดแก้ว ให้เจริญเติบโตกลายเป็น **ต้นมะพร้าวกะทิ (mm)** จากนั้นจึงแยกมาปลูกในดิน ทำให้สามารถสร้าง **ต้นมะพร้าวกะทิ (mm)** ได้แล้ว และเมื่อบังคับให้ **ต้นมะพร้าวกะทิ (mm)** ผสมกันเอง ก็จะทำให้ลูกที่เป็น **ผลมะพร้าวกะทิ** ทั้งหมด (แต่ในกรณีที่ปลูกต้นมะพร้าวกะทิรวมอยู่กับต้นมะพร้าวธรรมดา โอกาสที่เกสรตัวผู้

(M) ของต้นมะพร้าวธรรมดา จะข้ามมาผสมกับเกสรตัวเมีย (m) ของต้นมะพร้าวกะทิได้ ซึ่งจะทำให้ลูกที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้กลายเป็นผลมะพร้าวธรรมดา ทำให้ไม่ได้ผลมะพร้าวกะทิทั้งหมด) ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้ปริมาณผลผลิตของมะพร้าวกะทิเพิ่มจำนวนขึ้นได้อีกมากมายจนเพียงพอกับความต้องการบริโภค

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ มะพร้าวกะทิจงจะไม่ใช่ผลไม้พิเศษที่หายาก และมีราคาแพงมาก ๆ ต่อไปอีกแล้ว



คอลัมน์นี้มีรางวัล



....โลหะธาตุกับชีวิต....

ชีวิตเราเกี่ยวข้องกับโลหะธาตุอย่างไร ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดู

1. ในบรรดาโลหะต่อไปนี้ชนิดใดหรือไม่ที่เป็นโลหะที่มีพิษอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ ถ้ามีประมาณมากจนเกินไป
Zn, Mn, Co, Fe, Cu
2. เราจะสูดดมแก๊สพิษชนิดใดต่อไปนี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว? CO, SO₂, O₃
3. วิตามินชนิดเดียวที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบได้แก่ วิตามินอะไร?
4. สัตว์ทะเลชนิดใดที่สะสมโลหะหนักเป็นพิษ (เช่น Cd) ได้สูงสุด
ส่งคำตอบมาภายในเดือนกันยายน 2532 นี้ นะคะ

น.ส. TINA

เฉลย


คิดก่อนกิน ปัญหาคอลัมน์นี้มีรางวัล

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มี.ค. 2532

1. ถ้าเราชอบรับประทานปูนาแดง เราจะเป็นโรคมะเร็ง พยาธิใบไม้ในปอด
2. เมื่อเรารับประทานน้ำพริกปลาหู ปลาหูจะถูกย่อยที่อวัยวะ กระเพาะ, ลำไส้
3. เชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบในอาหารทะเลและก่อให้เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง แต่ไม่ทำอันตรายต่อโรค ได้แก่เชื้อ **Vibrio parahaemolyticus**
4. สารมีพิษในมันสำปะหลังแดงได้แก่สาร **linamarin** (เป็นสารจำพวก **Cyanogenic glucoside**)

บุคคลที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารได้แก่ คุณเรืองนภา ศรีพฤษ์
และคุณวรรณภา พรสุข ทางผู้จัดได้ส่งรางวัลไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ

ดิสกรีพท์มินิฮิล



2001, APRIL 1989

ข้อเสนอแนะ

ในการเขียนบทความลง วารสาร “วิทยาศาสตร์ มข.”



ใบสมัครเป็นสมาชิก

“วารสารวิทยาศาสตร์ มข.”

☐ สมาชิกใหม่

☐ ต่ออายุ

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขสมาชิก

ตั้งแต่ฉบับที่ ปีที่ ถึงฉบับที่ ปีที่ รวม ฉบับ

พร้อมได้ส่งเงินจำนวน บาท มาทาง

อัตราค่าบำรุง

☐ ฐานที่ตั้งจ่าย ป.ท. มข.

☐ เช็คไปรษณีย์

☐ เงินสด

☐ 1 ปี 4 เล่ม 40 บาท

☐ 2 ปี 8 เล่ม 80 บาท

☐ 3 ปี 12 เล่ม 115 บาท

☐ 4 ปี 16 เล่ม 150 บาท

ลายเซ็นผู้สมัคร

หมายเหตุ ส่งเงินทางธนาคารหรือเช็คไปรษณีย์ ในนามของ นางบุญคุ้ม เหลือกลิ่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งจ่าย ป.ท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

ส่งต้นฉบับมาที่

อธิบดีกรมการสำหรับผู้เขียน

1. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับนั้น 2 เล่ม และสำเนาพิมพ์อีก 15 ชุด

: กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อแนะนำ

ในการเขียนบทความลง วารสาร “วิทยาศาสตร์ มข.”



ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. รายงานผลวิจัยและค้นคว้าหรือการสำรวจที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่นมาก่อน
2. บทความปริทัศน์ ได้แก่งานเขียนที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูงานด้านวิชาการระดับต่าง ๆ
3. บทความแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ เรื่องแปล ข่าววิชาการย่อความจากงานวิจัยค้นคว้าหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับ **ต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดปกติ** มีช่วงห่างระยะบรรทัดตามมาตรฐาน พิมพ์ลงในกระดาษขาว A4 (โรเนียวสั้น) โดยใช้กระดาษหน้าเดียว **ความยาวไม่เกิน 10 หน้า** **ส่งต้นฉบับ 2 ชุด**
 2. ต้นฉบับ จะถูกพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ และจะตอบรับเท่านั้นโดยไม่ส่งคืน ผู้เขียนควรจะทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง 1 ฉบับ
 3. ต้นฉบับ จะต้องมีความถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา รวมทั้งมีความสมบูรณ์ในรูปแบบพร้อมที่จะนำลงตีพิมพ์ได้
 4. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ **ไม่ยาวเกินไป** และหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อโดยไม่จำเป็น
 5. ชื่อผู้เขียน เขียนชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพร้อมทั้งบอกสถานที่ทำงานให้ชัดเจน
 6. เนื้อเรื่อง ใช้ได้ทั้งภาษาไทยล้วนหรือภาษาอังกฤษล้วน ถ้าใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่ใช้ปนกับภาษาไทยนั้นให้พยายามแปลเป็นไทยเท่าที่จะทำได้และให้เขียนคำเดิมกำกับในวงเล็บ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งการเขียนตัวสะกดการันต์ในภาษาไทยให้ใช้ตามแบบราชบัณฑิตยสถาน
 7. ในกรณีของบทความวิจัย **ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ** และแบ่งเนื้อหาของบทความเป็นบทนำ วิธีดำเนินการ ผลการวิเคราะห์ บทสรุปและวิจารณ์
 8. เชิงอรรถ (footnote) ใช้เฉพาะที่จำเป็นเพื่อขยายหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก้ไขความเฉพาะตอนในบทความ ข้อความที่จำเป็นจะต้องมีเชิงอรรถให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับท้าย
 9. ตารางและภาพประกอบ คำบรรยายประกอบตารางหรือภาพประกอบควรจะสั้นและชัดเจน ถ้าจะเป็นภาพถ่ายให้ใช้ภาพขาว-ดำ ขนาดโปสเตอร์การ์ด ภาพเขียนลายเส้นควรเขียนด้วยหมึกดำ ภาพที่เขียนต้องชัดเจนและมีขนาดที่เหมาะสม
 10. เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม เขียนตามแบบสากลนิยม
- ส่งต้นฉบับมาที่

อกินันทนาการสำหรับผู้เขียน

1. เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับนั้น 2 เล่ม และสำเนาพิมพ์อีก 15 ชุด

: กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

